


LOUIS DEBACQ
Pharmacie de la ... 250



Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b28757488>

TRAITÉ DE LA PHTHISIE PULMONAIRE,

*Avec la Méthode préservative & curative de cette
Maladie , fondée sur des Observations.*

Par M. RAULIN,

DOCTEUR en Médecine , Agrégé honoraire au Collège Royal des
Médecins de Nancy ; Pensionnaire , Conseiller , Médecin ordinaire
du Roi , Censeur Royal , ancien Inspecteur général des Eaux miné-
rales du Royaume & des Maisons de Santé de Paris ; de la Société
Royale de Londres , des Académies Royales des Belles-Lettres ,
Sciences & Arts de Prusse , de Bordeaux , de Rouen , de Châlons-
sur-Marne , & de celle de Rome.

Morborum quoque te causas & signa docebo.
VIRGIL.



A PARIS,

De l'Imprimerie de VALADE, rue des Noyers ;

Et se trouve

Chez l'AUTEUR , rue de Bourbon-Villeneuve ;

M. DCC. LXXXII.

AVEC APPROBATION ET PRIVILÈGE DU ROI.





A MONSEIGNEUR

JOLY DE FLEURY,

MINISTRE D'ÉTAT ET DES FINANCES,
Commandeur des Ordres du Roi.

*M*ONSEIGNEUR,

LE bien public & l'amour de l'humanité, sont deux objets puissans qui vous dirigent dans l'Administration immense qui vous est confiée. C'est par de pareils motifs que votre Famille s'est

ÉPITRE DÉDICATOIRE.

*toujours distinguée & se distingue encore ,
 dans celle de la Justice. C'est ainsi que ,
 selon le vœu de la Nation , vous servez
 l'État & le Monarque qui nous gou-
 verne avec tant de sagesse. Cet Ouvrage ,
 MONSEIGNEUR , est un tribut qui vous
 est dû à tous ces titres. Vous m'avez
 donné de l'émulation par votre confiance
 & par vos conseils ; vos bontés & votre
 exemple ont souvent ranimé mon cou-
 rage : c'est à votre bienfaisance que je le
 dois ; elle est un attribut précieux des
 sentimens de votre cœur.*

Je suis avec un profond respect ,

MONSEIGNEUR ,

Votre très-humble & très-
obéissant Serviteur ,
RAULIN.



DISCOURS

P R É L I M I N A I R E.

LES maladies de langueur, telles que la Phthisie pulmonaire, ont pris leur principe de la dégénération de l'espece humaine, dont le second âge du monde a commencé le tableau; dès que les passions immodérées se développerent, la façon de vivre prit des modes différens; la différence des intérêts fit naître parmi les hommes, des querelles, des divisions, des besoins, dont les suites furent des guerres qui donnerent lieu à des injustices; celles-ci troublerent de plus en plus l'ordre de la société, le renverserent & partagerent les peuples & les nations; il se forma des Républiques qui étant avides d'étendre leur puissance, ne chercherent entre elles qu'à se détruire, qu'à s'envahir.

Les abus qui concernoient la santé s'établirent parmi ces désordres & firent des progrès au point que vers le tems de la seconde guerre du Péloponnèse, les Philosophes furent obligés de se charger de la connoissance des maladies & de l'art de les guérir.

Hippocrate, près de cinq cents ans avant l'ère chrétienne, recueillit les préceptes & les observations des sçavans qui l'avoient précédé; il y

joignit les connoissances qu'il avoit acquises , par de savantes études , il les rédigea en un corps d'ouvrage qui , dans tous les siècles qui se sont écoulés depuis cet Auteur jusqu'à nos jours , a servi de modèle aux Médecins & a donné à la Médecine des regles qui ont contribué à ses progrès.

C'est dans les ouvrages d'Hippocrate que l'on a pris les premières notions de la Phthisie pulmonaire : ce Législateur de la Médecine les a établies & développées avec une telle sagacité , qu'on ne peut se refuser à la persuasion que cette maladie étoit connue des Philosophes qui l'avoient précédé.

Depuis ce père de la Médecine jusqu'à nos jours , les racines du luxe se sont fortifiées , ses branches se sont étendues , ses fleurs séduisantes & trompeuses se sont épanouies sur toute la surface du globe ; les passions défordonnées en ont pris plus de force , elles se sont multipliées de plus en plus , & des abus en tous genres en sont devenus les effets inévitables.

C'est des abus qu'avoient pris leur principe les maladies de langueur , c'est par eux qu'elles se sont multipliées , & c'est par eux que nous sommes menacés de les voir devenir générales. la Phthisie pulmonaire est déjà parvenue au point d'alarmer l'humanité ; elle s'établit principalement & fait des ravages dans les grandes villes , au centre du luxe & de l'intempérance.

Les maladies endémiques particulières à différens climats, sont devenues générales par les guerres qu'ont suscitées en différens tems, l'ambition des Grands & les besoins des Peuples qui habitoient des contrées stériles & ingrates ; les invasions en furent les suites : ces guerres, ces invasions ont confondu les nations les unes avec les autres, & ont rendu communes & générales parmi elles les vertus, les passions & les maladies.

La découverte des Grandes Indes a mis le comble à ces calamités ; les aromates ou les drogues incendiaires que produit leur climat, & que la nature lui a prodiguées pour lui seul, sont devenues communes à toutes les nations. L'usage de ces drogues salutaires dans cette partie de l'Asie, est d'autant plus dangereux en Europe, qu'il flatte le goût, le séduit, l'enchaîne, & couvre la raison d'un voile qui l'éclipse.

On avoit d'abord adopté ces substances aromatiques comme des remèdes utiles, on en a fait des alimens insidieux qui agacent, irritent, échauffent, enflamment les fibres membraneuses des organes qui servent aux fonctions animales, & causent dans la masse des liquides de dangereuses effervescences. La digestion des alimens en est précipitée, le chyle qui en provient ne peut être que mal conditionné, les sécrétions en deviennent imparfaites & les excréments ir-

régulières ; il ne peut en résulter qu'une source de maladies & de langueurs.

Il est d'autres principes destructeurs qui concourent dans ce siècle à faire dégénérer l'espece humaine , à la mutiler , à la pervertir : une irrégularité outrée dans le régime de vie, & des excès en tous genres , ont renchéri sur les vices de nos peres. Les richesses autrefois étoient le seul principe du luxe , comme elles en étoient le soutien ; aujourd'hui il est devenu contagieux dans la médiocrité ; on l'apperçoit même dans l'indigence. Les besoins qui proviennent de telles causes , ne peuvent que former des sources de tristesse & d'envie ; les fonctions animales en sont dérangées , troublées & perverties ; de-là des langueurs inévitables & des Phthysies toujours dangereuses & souvent mortelles.

Heureux les enfans des peres dont les mœurs ont été assez réglées pour ne pas laisser dans leur postérité des germes héréditaires de maladies de langueur , tels que ceux de la Phthysie pulmonaire ; ces germes redoutables se propagent & se multiplient dans les familles pour y porter des coups funestes , & souvent pour les éteindre.

Heureux les peres dont les enfans ne profitent pas le principe épuré qui leur a donné le jour ; plus heureux encore ceux dont les enfans héritent de leurs vertus & qui n'en souillent

pas la pureté par des taches indélébiles du vice ! On ne voit que trop souvent des familles respectables languir & s'éteindre , parce que des enfans voluptueux ont abusé dans leur jeunesse , ou pour mieux dire dès leur enfance , de la fougue d'un tempérament effréné , souvent altéré par les abus d'une éducation molle & perfide ; quelquefois même , oserai-je dire , par de dangereux exemples.

Telles sont les causes générales de la Phthisie pulmonaire ; il en est de particulieres que je ferai connoître dans le cours de cet Ouvrage , qui est uniquement fondé sur des observations , tant en ce qui concerne la connoissance de cette maladie & son caractère , que les moyens de la prévenir & de la guérir , d'après des indications prises de ses différentes causes & de sa nature.

L'Ouvrage est divisé en deux Parties , chaque Partie en cinq Sections , & chaque Section en plusieurs Chapitres relatifs aux titres des Sections. Dans la premiere Partie je recherche , je discute , j'autorise par des observations tout ce qui a du rapport à la connoissance de la Phthisie pulmonaire. Dans la seconde je donne , en suivant l'ordre des Chapitres de la premiere Partie , les moyens que j'ai cru les plus propres à préserver de cette maladie & à opérer sa guérison. J'y ai ajouté l'extrait d'une Dissertation que j'ai déjà publiée sur l'usage mal-entendu du lait

dans la Pulmonie. C'est une attention que j'ai cru indispensable, par rapport aux abus que l'on commet en prodiguant cette substance alimentaire & médicamenteuse, dans tous les degrés d'une maladie à laquelle elle est presque généralement contraire.

Dans la premiere Section de la premiere Partie, je donne la définition, ou la description de la Phthisie, la description anatomique des poumons; les signes diagnostiques, les pronostics & les phénomènes de cette maladie. Je traite dans la seconde Section de la Phthisie essentielle, de l'héréditaire & de la contagieuse. Dans la troisieme, je fais connoître celle qui vient à la suite de différentes hémoptysies que je distingue les unes des autres. Dans la quatrieme Section, je traite de la Phthisie tuberculeuse, de ses différences, & de celle qui provient des vomiques, d'obstructions des viscères du bas ventre & des maladies aiguës. Dans la cinquieme, j'expose le danger des Phthisies qui sont des suites de métastases à la poitrine, telles que celles du flux hémorrhoidal, des secours périodiques du sexe, des lochies, du lait, des fleurs blanches, du pus des vieux ulcères; des éruptions cutanées, des dartreuses, des psoriques, des croûtes laiteuses des enfans, &c.

Je reprends dans la seconde Partie, comme je viens de l'observer, les différentes causes de la Phthisie dans le même ordre qu'elles sont

distribuées dans la premiere Partie; je propose en même tems les moyens de prévenir cette maladie , de modérer les symptômes & d'y remédier ; le tout d'après un nombre d'observations.

Il ne m'a pas été possible de discuter ces différens objets, sans entrer dans des détails considérables, & sans faire des répétitions utiles qui ennuiroient sans doute ceux qui n'aiment à s'instruire que dans les Dictionnaires , ou dans les tables des Livres ; mais comme je n'écris que pour le bien de l'humanité, j'ai dû n'avoir égard qu'aux devoirs que mon état m'impose.



T A B L E

D E S M A T I E R E S

Contenues dans cet Ouvrage.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

PREMIERE PARTIE.

THÉORIE DE LA PHTHISIE PULMONAIRE.

SECTION PREMIERE.

De la Phthisie pulmonaire en général.

CHAP. I.	<i>Définition de la Pulmonie.</i>	Page 1
	<i>Description des Poumons.</i>	2
CHAP. II.	<i>Causes de la Phthisie pulmonaire.</i>	3
	<i>Disposition héréditaire ,</i>	9
	<i>Défaut de conformation ,</i>	10
	<i>Abus des alimens échauffans ,</i>	ibid.
	<i>Congestion d'humeurs âcres sur les poumons ,</i>	11
	<i>Dégénération de la lymphe ,</i>	ibid.
	<i>Formation des tubercules ,</i>	ibid.
	<i>Suppression des écoulemens naturels , pâles cou-</i> <i>leurs , petites-véroles , rougeoles ; suppression</i> <i>des suppurations habituelles à la peau , des</i> <i>éruptions cutanées ; répercussion des aphtes , des</i> <i>dartres , & autres éruptions cutanées ,</i>	12
	<i>Esquinancies , fluxions de poitrine , fiebres pu-</i> <i>trides , malignes ,</i>	13
	<i>Expectoration pituiteuse & abondante ,</i>	ibid.
	<i>Climat humide & froid ,</i>	14
	<i>Contagion ,</i>	15
	<i>Degré où elle est le plus à craindre ,</i>	ibid.
CHAP. III.	<i>Signes diagnostics de la Pulmonie ,</i>	ibid.
	<i>Signes extérieurs ,</i>	ibid.
	<i>Tous les phthisiques ne crachent pas du pus ,</i>	16
	<i>Signe essentiel du premier degré de la Pulmonie ,</i>	ib.

TABLE DES MATIERES. xiiij

<i>Différence du pouls relative aux divers degrés de Phthisie ,</i>	Page 16
<i>Signes trompeurs de la Pulmonie ,</i>	23
CHAP. IV. Phénomènes relatifs à la Phthisie pulmonaire ,	
<i>Qualités du pus ,</i>	25
<i>Le pus soumis à l'expérience de l'eau ,</i>	27
<i>Métastases du pus porté dans les poumons , de toutes les parties du corps ,</i>	29
CHAP. V. Signes pronostics de la Phthisie pulmonaire ,	32—33
<i>Symptômes de guérison ,</i>	34
<i>Signes fâcheux ,</i>	ibid.
<i>Phthisies au dernier degré guéries par la nature ,</i>	36
SECT. II. De la Phthisie pulmonaire essentielle , de l'héréditaire , de la contagieuse.	
CHAP. I. De la Phthisie essentielle ,	
<i>Difformités , accidens qui menacent de la Phthisie pulmonaire ,</i>	38
<i>Guérison d'un Phthisique au second degré ,</i>	39
<i>Second exemple d'une guérison semblable ,</i>	42
<i>Éducation trop délicate , cause éloignée de la Pulmonie ; exemple.</i>	44
CHAP. II. De la Phthisie pulmonaire héréditaire ,	
<i>Signes de la Pulmonie héréditaire ,</i>	45
<i>L'Art peut en prévenir les effets ,</i>	ibid.
<i>Les vrais principes des Phthisies héréditaires ,</i>	ibid.
<i>Quand se manifestent celles qui dépendent des liquides ,</i>	51
<i>Elles ne sont pas toujours incurables ,</i>	53—54
<i>La Pulmonie accompagne toujours le rachitis , selon un Auteur célèbre ,</i>	55—59
CHAP. III. De la Pulmonie contagieuse ,	
<i>Exemples de cette contagion ,</i>	59
<i>Précautions pour en prévenir les effets ,</i>	ibid.
SECT. III. Phthisie pulmonaire provenant d'hémoptysie , ou d'érosion de la substance des poumons , ou de dilatation des vaisseaux de ce viscere.	

CHAP. I. <i>Hémoptysie</i> ,	Page 61
<i>Définition de l'hémoptysie ; elle a trois causes</i> ,	ibid.
CHAP. II. <i>Hémoptysie provenant de la rupture des vais-</i> <i>seaux : Cause de Pulmonie</i> ,	65
<i>Cause de l'hémoptysie</i> ,	ibid.
<i>Signes</i> ,	66
<i>Comment on distingue d'où part le sang dans l'hé-</i> <i>moptysie</i> ,	67
<i>Malades guéris</i> ,	69—74
<i>Observation rare</i> ,	74
CHAP. III. <i>Hémoptysie provenant de l'érosion des vais-</i> <i>seaux des poumons : Cause de Pulmonie</i> ,	75
<i>Comment on reconnoît si l'hémoptysie vient de rup-</i> <i>ture ou d'érosion</i> ,	ibid.
<i>Toux phthisique, toux catharreufe</i> ,	76
<i>La Phthisie qui vient d'érosion ne s'annonce pas</i> <i>toujours par l'hémoptysie ; erreur de Galien</i> ,	77
<i>Sang extravasé dans la membrane cellulaire des</i> <i>poumons : Cause de Phthisie</i> ,	77
<i>Expectoration abondante de matieres séreuses & bi-</i> <i>lieuses : Cause de Phthisie</i> ,	78
<i>Crachement de chyle pris pour du pus</i> ,	ibid.
<i>Phthisies vénériennes, scorbutiques, scrophuleuses</i> ,	79
<i>Ulcérations de la bouche & autres, nuisibles aux</i> <i>poumons</i> ,	79—80
<i>Leur guérison</i> ,	82
<i>Ulcères de la trachée-artère souvent incurables</i> ,	ibid.
<i>Hémoptysie avec érosion plus dangereuse qu'avec</i> <i>rupture</i> ,	ibid.
<i>Ulcères des poumons susceptibles de guérison</i> ,	ibid.
<i>Guérison de Phthisies désespérées</i> ,	83
<i>Cas où l'usage du lait est pernicieux</i> ,	86
CHAP. IV. <i>Hémoptysie par la dilatation des vaisseaux :</i> <i>Cause de Pulmonie</i> ,	ibid.
<i>Pulmonie rarement produite par cette cause</i> ,	87

Crachement de sang périodique ; sa cessation funeste , Page 91

Hemoptysies quelquefois nécessaires , 91—93

Hémorrhagies par anastomose fréquentes chez les scorbutiques , 93

Suites de l'Hémoptysie toujours à craindre , 94

SECT. IV. *Des Tubercules des Poumons ,*

CHAP. I. *Des tubercules en général ,* 95

Ce qu'on entend par tubercules du poumon , ibid.

CHAP. II. *Des tubercules qui ne suppurent point ,* 96

Pierre rendue par l'expectoration , 98

Symptômes des tubercules crus. Il faut les traiter dans leur principe , 100—102

CHAP. III. *Des tubercules qui suppurent , ou sont propres à suppurer ,* 102

Leur origine , ibid.

Ouverture des corps après la mort causée par des tubercules. Guérisons des tubercules , 109

Signes de la formation des tubercules , 110

CHAP. IV. *Vomiques des poumons. Suppuration à la suite des fluxions de poitrine , d'autres maladies aiguës & chroniques ,* 111

Ce qu'on entend par vomiques des poumons , 112

Pronostic d'Hippocrate , 113

Suppuration des poumons à la suite des maladies aiguës , crise imparfaite : Exceptions , 115--120

CHAP. V. *Obstructions des viscères du bas ventre : Cause de Pulmonie ,* 120

Observation de Lindan , 121

Asthme produit par la collection du pus entre les membranes de l'estomac ; autres observations importantes , 121—125

SECT. V. *Métastases : Causes de Pulmonie.*

CHAP. I. *Métastases en général ,* 126

Définition des Métastases. Leurs crises ; trouble qui les précède : Voies par où elles se font , 126—133

	<i>Communication des vaisseaux sanguins avec les lymphatiques. Observations curieuses,</i>	P. 89—91
CHAP. II.	<i>Sang hémorrhoidal porté à la poitrine, par métastase,</i>	133
	<i>Ce flux modéré & périodique est salutaire,</i>	ibid.
	<i>Il est funeste sans ces conditions,</i>	134
	<i>Guérison d'une Phthisie produite par cette cause,</i>	137
	<i>Hémoptysie hémorrhoidale : Précautions,</i>	138
CHAP. III.	<i>Métastases du sang des Regles,</i>	ibid.
	<i>Les regles ne sont pas essentielles à l'existence des femmes,</i>	ibid.
	<i>Désordres que leurs métastases produisent,</i>	140
	<i>Regles suppléées par différentes évacuations du sang,</i>	142
	<i>Suppression des Regles par du lait bu froid,</i>	143
	<i>Ouverture du cadavre d'une fille morte d'une Pulmonie causée par la suppression des regles,</i>	144
	<i>Guérison d'une suppression des regles qui avoit succédé à une Hémoptysie critique,</i>	145
	<i>Phthisie causée par la suppression des Regles est susceptible de guérison. Dans quels cas elle ne l'est point ?</i>	145
	<i>Phthisies désespérées guéries par des remèdes,</i>	ib.
CHAP. IV.	<i>Métastases des lochies à la poitrine,</i>	146
	<i>Définition des lochies,</i>	ibid.
	<i>Leurs différentes Métastases. Causes & signes de ces Métastases,</i>	148
	<i>Causes du dérangement des lochies. Témérité de ceux qui gouvernent les femmes en couche sans connoissance de leurs maladies,</i>	149—150
	<i>Crises salutaires dans la suppression des lochies,</i>	151
CHAP. V.	<i>Métastase du lait à la poitrine,</i>	152
	<i>Ce qu'on entend par dépôt laiteux,</i>	ibid.
	<i>Effets des Métastases du lait sur la poitrine,</i>	153
	<i>Métastases par le tissu cellulaire,</i>	ibid.
	<i>Causes</i>	

Causes & effets des métastases laiteuses, p. 154-155

*Phthisie produite par le lait répandu ; double cause
essentielle à distinguer*, 156

Exemples des suites funestes d'un lait étouffé,
157—159

CHAP. VI. *Métastases des fleurs blanches sur la poitrine*,
159

Définition des fleurs blanches, ibid.

*Effets des fleurs blanches excessives , diminuées ,
supprimées , invétérées*, 160

CHAP. VII. *Métastases sur les poumons , du pus des
ulceres & de la matiere des tumeurs*, 164

*Tumeurs , ulceres spontanés , répercutés ; leurs
effets. Exemple*, ibid.

*Métastases plus dangereuses quand les tumeurs
& les ulceres ont une cause interne. Exemples*,
165—171

CHAP. VIII. *Métastases sur le poumon , & des éruptions
cutanées*, 172

Trois especes d'éruptions. Taches ou efflorescences,
174—176

CHAP. IX. *Métastases de l'humeur des croûtes laiteuses
& de la teigne des enfans*, 176

Origine des croûtes laiteuses, ibid.

Comment on les distingue de la teigne, 178

Attention sur l'application des remedes, ibid.

CHAP. X. *Métastases dartreuses dans la poitrine*, 179

Nature & distinction des dartres, ibid.

Danger de leur répercussion, 181

CHAP. XI. *Métastases de la gale dans la poitrine*, 184

Deux especes de gale, ibid.

Humeur psorique , fixée sur les poumons, 185

Métastases de la matiere des vieux ulceres, 188

Métastase d'humeurs vagues, gouteuses, rhumatismales, scorbutiques, vénériennes, Page 188

SECONDE PARTIE.

Méthode préservative & curative de la Phthisie pulmonaire.

SECT. I. *Généralités sur la Méthode préservative & curative de la Pulmonie.*

CHAP. I. *Etat des poumons après la mort des Phthiques, Page 189*

CHAP. II. *On guérit de la Phthisie pulmonaire, & on la prévient, 191*

Abus dans l'éducation, source de Phthisie, 192

Phthisies incurables par la négligence des malades, 194

CHAP. III. *Récapitulation des causes de la Pulmonie, 198*

CHAP. IV. *Regles générales pour la méthode curative de la Phthisie pulmonaire, 201*

CHAP. V. *Usage des six choses non naturelles dans la méthode curative de la Pulmonie, 208*

ART. I. *Diète convenable, ibid.*

ART. II. *Air propre aux Phthiques, 209*

ART. III. *Alimens, Boisson, relatifs au degré de Phthisie, 212*

Emploi des substances farineuses. Danger des consommés, ibid.

Analyse chymique des bouillons de limaçons, 214

Précepte d'Hippocrate sur le régime des phthiques, 215

Observation de Cardan, 216

Lait dangereux dans la Phthisie, 217

Boisson des Anciens dans la Pulmonie, ibid.

ART. IV. *Le Mouvement & le Repos, 219*

ART. V. *Le Sommeil & la Veille, 220*

ART. VI. <i>Ordre nécessaire des évacuations,</i>	pag. 222
ART. VI. <i>Les passions de l'ame ,</i>	224
CHAP. VI. <i>Abus du lait dans la Pulmonie ,</i>	225
ART. I. <i>Abus du lait en général dans la Pulmonie ; ses effets ,</i>	ibid.
ART. II. <i>Abus du lait au premier degré de Phthisie ,</i>	229
<i>Observations anatomiques ,</i>	234
ART. III. <i>Abus du lait au second degré de Pulmonie ,</i>	235
<i>Exemples ,</i>	239--240
<i>Comment on doit entendre Hippocrate , lorsqu'il dit que le lait convient aux phthisiques ,</i>	241
SECT. II. <i>Méthode préservative & curative de la Phthisie héréditaire & de la contagieuse.</i>	
CHAP. I. <i>Méthode préservative & curative de la Phthisie essentielle des enfans ,</i>	245
<i>Caractere de cette Phthisie : Ses premiers symp- tômes. Lait mêlé avec d'autres alimens nuisible ,</i>	246
<i>Symptômes de cette Phthisie ; ses causes ,</i>	250
<i>Syrop de Calabre ; maniere de le prendre ,</i>	253
<i>Difficulté de guérir ; les tubercules qui ne suppurent point ;</i>	254
<i>Phthisie des enfans avec ulcere aux poudrons ; ma- niere de la traiter ,</i>	ibid.
<i>Les rhumes longs conduisent à la Pulmonie. Com- ment la prévenir. Guérisons opérées par l'Auteur ,</i>	258
<i>Diminution & suppression des éruptions cutanées des enfans menent à la Phthisie. Comment on doit se conduire ,</i>	261
<i>Maniere de garantir de la Pulmonie les bossus & les rachitiques ,</i>	263
<i>Danger des corps de baleine pour les enfans ,</i>	264

Traitement des enfans phthifiques au premier degré,
Page 266

CHAP. II. *Méthode préservative & curative de la Phthisie
essentielle des adultes,*

ART. I. *Quand elle est au premier degré,* ibid.

Cause ordinaire de la Phthisie des adultes, ibid.

*Signes & traitement de l'engorgement des poumons
après un mauvais régime de vie,* 267

Eaux minérales ; leur usage , leurs propriétés , 270

Des Eaux de Châtel-Guion en particulier , 273

*C'est un abus d'ajouter des sels étrangers aux eaux
minérales ,* 278

Traitement des rhumes catharreux , 280

*Observations sur l'usage de différentes eaux mi-
nérales ,* 282

ART. II. *Méthode curative de la Pulmonie quand elle
est au second degré ,* 286

Usage mal-entendu du quinquina dans ce degré , 290

*Plantes appropriées aux divers degrés de Pulmo-
nie ,* 294

*Complication du caractère scorbutique ; signe & trai-
tement ,* 296—302

Traitement de la toux , 298

*Moyens de garantir la substance pulmonaire de
la contagion ulcéreuse ,* 299

Inflammation , suppuration des tubercules , 303

Formation de nouveaux tubercules , 305

Traitement des tubercules scrophuleux , 306

*Comment on distingue ceux qui ne sont pas de nature
à suppurer ,* 307

*Infidélité des vapeurs médicamenteuses pour déter-
ger les ulcères du poumon ,* 308

ART. III. *Quand la Phthisie est au troisième degré ,*
311

Exposition & remèdes dans cet état , 312

*Effets surprenans d'une racine pour guérir les cours
de ventre lyentériques & colliquatifs ,* 315

ART. IV. <i>Signes de convalescence de la Phthisie.</i>	
<i>Moyens de la perfectionner ,</i>	Page 316
ART. V. <i>Observations sur la guérison des Phthysies</i>	
<i>essentielles ,</i>	319
<i>Exposition de plusieurs cures ,</i>	ibid.
CHAP. II <i>Méthode préservative de la Phthisie pulmo-</i>	
<i>naire héréditaire ,</i>	331
<i>Guérisons de plusieurs de ces phthysiques ,</i>	332
<i>Des maladies héréditaires ,</i>	336
CHAP. III. <i>Méthode préservative de la Phthisie prise</i>	
<i>par contagion ,</i>	337
<i>Moyens d'écarter cette contagion , & de neutraliser</i>	
<i>l'air infecté des salles des Hôpitaux ,</i>	338
<i>Nécessité des anti-septiques internes , pendant</i>	
<i>l'usage des moyens précédens ,</i>	339
<i>Ce qu'il faut faire si des exhalaisons sceptiques</i>	
<i>font impression sur les poumons ,</i>	340
<i>Guérisons des Phthysies prises par contagion ,</i>	341
SECT. III. <i>Méthode préservative & curative de la</i>	
<i>Phthisie pulmonaire provenant d'hémoptysie ,</i>	345
CHAP. I. <i>Méthode curative de la Phthisie provenant de</i>	
<i>la rupture des vaisseaux des poumons ,</i>	ibid.
<i>Danger des astringens. Preuves.</i>	348
<i>De l'Hémorrhagie qui vient à la suite d'un accident</i>	
<i>violent , danger des grumeaux de sang qui se</i>	
<i>forment dans les poumons ,</i>	351
<i>Observations sur ces Phthysies</i>	352
<i>Observation sur une maladie assez extraordinaire ,</i>	
<i>dont la cause immédiate paroît avoir été un</i>	
<i>ulcere formé dans la membrane intérieure des</i>	
<i>côtes ,</i>	356
CHAP. II. <i>Méthode préservative & curative de l'hémop-</i>	
<i>tysie & des ulcères provenant d'érosion des vais-</i>	
<i>seaux des poumons : Cause de Phthisie ,</i>	358

<i>Différentes sources de cette érosion ,</i>	Page 358
<i>Cures opérées par de célèbres Médecins.,</i>	360—366
<i>Cures opérées par l'Auteur ,</i>	362—364
CHAP. III. <i>Méthode préservative & curative de la Phthisie qui provient de l'hémoptysie occasionnée par la dilatation des vaisseaux ,</i>	367
<i>Attention que ce cas exige ,</i>	370 & suiv.
<i>Hémoptysie scorbutique , comment la traiter ,</i>	372
SECT. IV. <i>méthode préservative & curative de la Phthisie pulmonaire , , qui provient de tubercules aux poumons , & d'obstructions des viscères du bas ventre ,</i>	373
CHAP. I. <i>Méthode préservative & curative de la Phthisie qui provient de tubercules qui ne sont pas de nature à suppurer ,</i>	ibid.
<i>Signes qui indiquent cette espece de pulmonie ,</i>	375
CHAP. II. <i>Méthode préservative & curative de la Phthisie pulmonaire provenant de tubercules qui suppurent ou qui sont propres à suppurer ,</i>	377
<i>Comment se conduire quand la Phthisie symptomatique est compliquée. Observations sur plusieurs guérisons ,</i>	381
CHAP. III. <i>Méthode préservative & curative de la vomique des poumons & de la suppuration de ce viscere à la suite des maladies aiguës ,</i>	385
<i>Observations importantes sur cette maladie ,</i>	ibid.
CHAP. IV. <i>Méthode préservative & curative de la Phthisie pulmonaire occasionnée par obstructions des viscères du bas ventre ,</i>	391
<i>Différentes sources de cette Phthisie. Cure ,</i>	ibid
<i>& suiv.</i>	
<i>Plantes reconnues pour remédier à la densité de la bile ,</i>	395
SECT. V. <i>Méthode préservative & curative de la Phthisie pulmonaire occasionnée par des métastases.</i>	

CHAP. I. *Méthode générale , préservative & curative de la pulmonie qui provient des métastases*, p. 398

Ce qu'il est essentiel d'observer dans ces circonstances,
ibid.

CHAP. II. *Méthode préservative & curative de la Phthisie pulmonaire occasionnée par la diminution ou suppression de l'écoulement des hémorrhoides*, 403

Cas où la complication des symptômes est pres- que sans exemple, ibid.

Guérison d'un jeune homme, 405

Autre guérison, 407

Troisième guérison d'un Chirurgien, 408

CHAP. III. *Méthode préservative & curative de la pulmonie occasionnée par la métastase des secours périodiques du sexe*, 410

Exposition des différentes causes de cette pul- monie, ibid. & suiv.

CHAP. IV. *Méthode préservative & curative de la pulmonie occasionnée par la métastase des lo- chies dans les poudrons*, 417

Les causes les plus ordinaires de ces accidens : symptômes des lochies supprimées , & ce qui caractérise leur métastase, 418

Ce qu'il faut faire dès qu'il se déclare à la poitrine quelque symptôme de cette métastase, 419

Cure d'une métastase de cette espèce, 422

CHAP. V. *Méthode curative & préservative de la pulmo- nie provenant des métastases du lait dans les viscères de la poitrine*, 424

Exemples funestes de ces métastases, 425

Cures de ces métastases, 426—428

CHAP. VI. *Méthode préservative & curative de la pul-*

<i>monie causée par la métastase des fleurs blanches dans les poudrons ,</i>	429
<i>Signes de cette métastase fixée dans les poudrons : Secours dans des cas semblables ,</i>	431
	& suiv.
CHAP. VII. <i>Méthode préservative & curative de la pulmonie occasionnée par la métastase du pus des ulcères & de la matiere des tumeurs ,</i>	434
<i>Observations : exemples ,</i>	435
	& suiv.
<i>Comment on prévient les métastases qui se font de l'extérieur du corps vers l'intérieur ,</i>	435
CHAP. VIII. <i>Méthode préservative & curative de la pulmonie occasionnée par la métastase des éruptions cutanées , dans les poudrons ,</i>	440
<i>Trois différentes especes d'éruptions cutanées ,</i>	441
<i>La maniere de les traiter ,</i>	442
CHAP. IX. <i>Méthode préservative & curative de la pulmonie , occasionnée par la métastase des croûtes laiteuses des enfans , dans la substance des poudrons ,</i>	445
<i>Cas où ces croûtes sont dangereuses ,</i>	446
<i>Traitement de ces enfans ,</i>	448
<i>D'où provient la lepre qui est la suite des croûtes laiteuses de mauvais caractère. Cure ,</i>	449
<i>Comment rappeler l'humeur qui forme les croûtes à la peau ,</i>	450
CHAP. X. <i>Méthode préservative & curative de la Phthisie pulmonaire occasionnée par des dartres répercutées ,</i>	450
<i>L'application des topiques astringens pour les éruptions dartreuses , est souvent mortelle ,</i>	451
<i>Comment on les guérit lorsqu'elles proviennent d'une simple âcreté de la lympe ,</i>	ibid.
<i>Et quand les dartres répercutées se fixent dans les poudrons , comment les traiter ? Exemples ,</i>	452
	& suiv.
CHAP. XI.	

CHAP. XI. Méthode préservative & curative de la Phthi-	
sie occasionnée par la métastase de la gale dans	
les poumons ,	455
La gale reconnoît plusieurs causes ,	456
Moyens les plus propres pour la rappeler à la	
superficie ,	457
Comment on prévient les effets de la métastase	
de l'humeur qui forme les pustules ,	457
Guérison des éruptions psoriques ,	458

Fin de la Table des Matieres.



E R R A T A.

- P** AGE 29 ligne 28, page 10 ligne 12, mucueux, *lisez*, muqueux.
P. 65 lig. 20 hémophthisie, *lisez*, hémoptysie ; cette faute s'est glissée dans plusieurs endroits de cet Ouvrage.
p. 159 au titre du Chapitre, dans le *viscere*, *lisez*, dans les viscères.
p. 170 lig. 10 1738, *lisez*, 1768.
p. 187 lig. 23 1726, *lisez*, 1626.
p. 217 lig. 23 torrifient, *lisez*, torréfient.
p. 220 lig. 20 concourreroient, *lisez*, concourroient.
p. 273 lig. 20 fievres, *lisez*, fibres.
p. 159 lig. 22 looch, *ajoutez* blanc.
p. 297 lig. 14 dépôt, *lisez*, pot.
p. 367 CHAPITRE IV. ; *lisez*, CHAPITRE III.
p. 398 lig. 20 avec lesquelles, *lisez*, vers lesquelles.
p. 399, du sang de la lymphe, *lisez*, & de la lymphe.
p. 406 racine, *lisez*, racines.
p. 451 li g. 5 sieu, *lisez*, mais.



TR A I T É

D E

LA P H T H I S I E P U L M O N A I R E.



PREMIERE PARTIE.

THÉORIE DE LA P H T H I S I E P U L M O N A I R E.

SECTION PREMIERE.

De la Phthisie pulmonaire en général.

CHAPITRE PREMIER.

Définition de la Pulmonie : Description succincte des Poumons.

LA PULMONIE ou Phthisie pulmonaire , est un amaigrissement général de tout le corps , avec fièvre lente , provenant de rupture ou d'érosion des vaisseaux des poumons , de tubercules , d'ulceres , & le

plus souvent d'une humeur purulente , qui en corrodant insensiblement la substance de ce viscere , fait dégénérer la masse des liquides , la pervertit , détruit le systême des solides , & forme des uns & des autres une source meurtrière de souffrances & de langueurs.

Les poudons sont essentiels à la vie & à la conservation de l'homme ; ils sont l'un des principaux organes des fonctions vitales ; c'est par leur mécanisme qu'elles se font & se soutiennent. Le libre concours que ce viscere entretient entre les liquides , les solides , & l'air de l'atmosphère , est une condition nécessaire à la vie : pour peu que ce concours soit altéré , l'homme est en souffrance ; s'il est suspendu pendant quelques instans , son existence est menacée , elle périclité ; s'il se supprime , le même moment termine ses jours.

Description des Poudons.

Les poudons sont deux corps spongieux , situés dans la poitrine , séparés l'un de l'autre par le médiastin & par le cœur. Chaque poudon est divisé en lobes ; on en observe ordinairement trois dans le droit , & deux dans le gauche ; ces lobes sont partagés en d'autres plus petits , qu'on appelle *lobules*.

La substance des poudons est membraneuse & composée , pour ainsi dire , d'une infinité de vésicules qui sont des expansions , des membranes , des bronches auxquelles elles sont suspendues , comme les grappes de raisin le sont à leurs pédicules.

Les bronches sont des divisions de la trachée-artère ; celle-ci est le canal cartilagineux qui commence à la gorge ou au larynx, & s'étend jusqu'aux poumons. Lorsqu'il est parvenu vers la troisième vertèbre du dos, il se divise en deux branches, dont la droite s'insère dans le poumon droit, & la gauche dans le poumon gauche ; ces branches s'y divisent en une infinité de canaux qui se distribuent dans toute la substance des poumons & forment les bronches, ou les vaisseaux de l'air qui servent à l'inspiration & à l'expiration. Les vésicules qui proviennent des bronches & qui forment les lobules, sont entassées par paquets ; elles ont une exacte communication entre elles, sans en avoir d'immédiate avec les paquets voisins. Si l'on souffle un poumon bien nettoyé & blanchi par l'écoulement du sang, on apperçoit dans tout son tissu desséché, cette immense quantité de cellules qui servent à l'action mécanique de l'air de l'atmosphère, d'où dépendent l'existence & la conservation de l'espèce humaine. Des Calculateurs ont prétendu qu'une inspiration ordinaire qu'on n'apperçoit que lorsqu'on regarde attentivement la poitrine, attire dans les poumons neuf ou dix pouces cubiques d'air ; ce qui prouve sensiblement que les vésicules bronchiques doivent être extrêmement multipliées.

Les lobules des poumons sont environnés d'une substance cellulaire qui en fait la séparation ; entre tous ces lobules, serpentent les nerfs, les ramifications de l'artère & de la veine pulmonaires, de

même que celles de l'artere & de la veine bronchiques qui servent à nourrir les poumons. Les ramifications de ces nerfs & de ces vaisseaux, qui se distribuent de même que les bronches, les suivent dans toutes leurs divisions, & forment par leurs ramifications autour des cellules le réseau admirable dont Malpigi a fait la découverte. Ces nerfs & ces vaisseaux sont encore entourés d'un tissu cellulaire qu'on apperçoit distinctement. Il est sensible que dans les poumons, les arteres forment un réseau avec les veines ; *Bergerus* en a conclu que les veines sont une continuation des arteres : on ne sauroit prouver par le témoignage des sens qu'il y ait un intervalle qui ne soit pas vasculaire entre les arteres & les veines.

Les poumons ont encore des vaisseaux lymphatiques, ils sont sensibles à la surface de ce viscere ; on y découvre aussi une infinité de points glanduleux & de glandes, sur-tout à chaque division des bronches. Depuis la premiere de ces divisions, jusqu'à celles qui sont les plus éloignées, on les nomme *Bronchiques*. Il est de ces glandes qui sont considérables ; le diametre des plus grosses approche de celui d'une noisette, les autres ne sont guere plus grosses que des pois.

Les poumons sont recouverts d'une membrane que l'on regarde comme une production de la plevre, & que l'on peut partager en deux lames, l'une externe qui est mince, lisse & nerveuse ; l'autre interne, qui est épaisse & plus inégale. La plupart

des Anatomistes prétendent , avec raison , que cette membrane a une infinité de pores tellement disposés , qu'ils absorbent aisément les humeurs qui se répandent dans la cavité de la poitrine. Les pores absorbans sont sans doute des tuyaux qui communiquent immédiatement avec les veines ; ce qui paroît démontré , en ce que quelquefois ils reçoivent , par l'absorption , l'eau qui , dans l'hydropisie , est épanchée dans la capacité de la poitrine. Lorsque , dans la vraie pleurésie , la plevre seule est affectée dans des parties qui ne sont pas adhérentes aux poumons , on crache le sang & le pus. D'ailleurs , il est des Phthysies pulmonaires qui proviennent d'ulcères à la membrane qui recouvre intérieurement les côtes , & dont les malades rendent le pus par l'expectoration. On en a souvent des exemples dans nos provinces méridionales , où les vraies pleurésies ne sont pas moins fréquentes que les fluxions de poitrine le sont dans les septentrionales. Aretée a observé que le pus qui se forme dans quelque partie que ce soit de l'intérieur de la poitrine , s'évacue aisément par les poumons ; cet Auteur ajoute qu'il s'en forme souvent une si grande quantité dans la membrane qui recouvre intérieurement les côtes , qu'on doit regarder comme un miracle , qu'étant aussi mince qu'elle l'est , elle puisse le contenir. Alexandre de Trales a également observé que le pus qui se forme entre les côtes & les poumons , s'évacue par l'expectoration. J'ai vu cracher du pus provenant d'ulcères dans les organes de la génération , sans que les poumons en

fulsent affectés ; je rapporterai dans cet Ouvrage des observations qui le confirment.

Il conſte , par les expériences d'Haller , que les liqueurs qu'on injecte par la trachée-artere , paſſent aiſément dans les veines ; que celles qu'on injecte dans les veines des poumons , pénètrent dans la trachée-artere , dans les bronches , dans les véſicules , & qu'elles ſuintent à la ſuperficie de ce viſcere : cet Auteur conclut, d'après des expériences multipliées , que les pores abſorbans^b ſ'abouchent avec les veines.

La délicateſſe des poumons , provient de leur admirable ſtructure ; mais ce qu'il y a de bien extraordinaire , c'eſt que , quoiqu'ils ſoient parſemés de filets nerveux provenant de la huitieme paire , ils n'ont preſque pas de ſenſibilité. Il ſ'y forme des abcès conſidérables , & parmi les phthiſiques , il en eſt qui crachent le pus ſans éprouver dans la poitrine le moindre ſentiment de douleur : ce n'eſt que lorsſque les membranes extérieures de ce viſcere ſont affectées , qu'ils ſe plaignent d'une ſenſation d'erraillement , ſous le ſternum ou dans quelque'autre partie membraneuſe , de la capacité du thorax , ce qui provient preſque autant des concuſſions de la toux , que d'un vice dans les poumons.

L'inſpiration & l'expiration ſont des effets alternatifs & continuels de l'entrée de l'air de l'atmoſphere dans la ſubſtance des poumons par la trachée-artere : ce fluide , dans l'inſpiration , pénètre

avec force dans ce viscere par son propre poids, s'échauffe & se dilate dans les bronches & dans les vésicules, par l'effet de la chaleur animale qu'il y contracte. Sa densité étant ainsi diminuée, il est chassé des poumons par le poids de l'air extérieur; celui-ci en est chassé à son tour, par le poids de l'air qui lui succede. D'ailleurs les membranes des vaisseaux de l'air étant dilatées, se resserrent par leur propre ressort & concourent à chasser celui qui gêne leur élasticité. L'air raréfié reflue par la trachée-artère & donne la liberté à celui de l'atmosphère de pénétrer dans les bronches. C'est ainsi que se perpétue ce flux & reflux alternatif de l'air dans la substance des poumons : L'élévation des côtes, leur abaissement & l'action alternative des muscles torachiques contribuent également à cet admirable mécanisme, d'où dépend la vie de tous les êtres vivans qui existent sur la surface du Globe.

Le sang est porté par un mouvement rapide du ventricule droit du cœur dans l'artère pulmonaire; il se distribue par les divisions infinies de cette artère, dans toute la substance des poumons; il est repris par la veine pulmonaire dont les divisions sont également très-nombreuses, & conduit au ventricule gauche, d'où il passe dans l'aorte pour se distribuer dans toutes les parties du corps, & dans tous les viscères. Tout le sang qui aboutit au cœur par les veines passe par les poumons avant de se distribuer dans le reste du corps.

Le sang qui circule dans les divisions de l'artere & de la veine pulmonaires doit , dans l'ordre de la nature , donner au chyle son premier degré de perfection , pour être assimilé à la masse générale des liquides , & pour former un suc nourricier propre à réparer leurs pertes & celles des solides.

L'artere & la veine bronchiales distribuent dans les poumons un sang perfectionné , propre à les nourrir ; c'est une circulation différente de celle de l'air & du sang de l'artere & de la veine pulmonaires. Les poumons sont donc l'organe de trois directions de mouvemens particuliers , opposés pour ainsi dire les uns aux autres , qui cependant doivent former un concours respectif , pour favoriser les fonctions de ce viscere dans l'ordre de la nature. Pour peu que ces fonctions deviennent irrégulieres par le dérangement de quelqu'une de ces causes , ou par toute autre , il en jaillit une source féconde d'incommodités ou de langueurs qui le plus souvent sont des principes de Phthisie pulmonaire.

CHAPITRE II.

Causes de la Phthisie pulmonaire.

LA délicatesse de l'organisation des poumons , les différentes tendances des mouvemens généraux qui ont lieu dans ce viscere ; leurs directions concou-

rant les unes avec les autres ; la mollesse de sa substance , l'extrême irritabilité de son tissu membraneux , peuvent être considérées comme autant de causes éloignées de toutes les maladies dont il est susceptible , & principalement de la Phthisie pulmonaire. L'abondance du sang qui , comme un torrent , se répand dans sa substance , dans des tems sur-tout , où il est surchargé d'un chyle crû , y dépose une matiere transpirable très-abondante , dont l'air se charge dans l'expiration. C'est un excrément dont le séjour dans les poumons ne sauroit être que pernicieux ; il y est retenu par les passions de l'ame , sur-tout par celles qui portent à la tristesse , par les veilles , par les excès en tous genres , par un régime de vie mal entendu , & sur-tout par un air froid , par les variations de l'atmosphère , principalement quand on s'y expose mal-à-propos ; il en survient des fluxions , des toux , des rhumes , des catharres , qui sont autant de sources fécondes de Phthisies pulmonaires , qu'on doit regarder , en grande partie , comme essentielles , ou comme dépendantes de la constitution du sujet qui les contracte.

Il est confirmé par un nombre d'observations que cette maladie est souvent héréditaire , parce que les enfans tiennent presque toujours du tempérament de leurs peres , ce qui fait qu'ils conservent une telle disposition à la Phthisie pulmonaire , qu'à la moindre occasion , ils contractent cette maladie que les anciens Médecins ont regardée comme inévitable , & toujours mortelle , mais mal-à-propos ;

je rapporterai des observations convaincantes qu'on s'en préserve & qu'on en guérit.

Une disposition du corps contre l'ordre de la nature , telle que celle des Boffus , est une cause de pulmonie , lorsqu'ils sont conformés de façon que les poumons soient gênés dans la capacité du thorax au point que les fonctions de ce viscere ne puissent pas se faire avec une liberté constante. Il se forme alors dans leur substance des congestions d'humeurs qui produisent des ruptures des vaisseaux , source ordinaire d'hémorragies , de tubercules , d'ulceres , de suppurations , &c.

Les vaisseaux capillaires qui se répandent dans les poumons , par des divisions infinies , ne sont pas en état de supporter la violence ; de vives passions , des exercices immodérés , précipitent le mouvement systaltique du cœur & des arteres ; le sang alors passe dans ce viscere comme un torrent , il engorge les vaisseaux & les dilate , force leurs calibres ; les veines perdent leur peu de ressort , le sang ne s'y introduit que par une force irréguliere , tout s'oppose à son exacte distribution , il force les bouts capillaires de ses vaisseaux , ils s'entrouvrent à leurs anastomoses , ou il en rompt les membranes ; ce sont autant de causes d'hémorragies dont les suites sont des Phthisies pulmonaires.

Les abus dans l'usage des alimens échauffans , des boissons fortes & des liqueurs spiritueuses , causent des hémorragies , ordinairement suivies d'ulceres & de suppurations , qui conduisent souvent

à des Phthifies pulmonaires; ces accidens sont fréquents chez les jeunes gens, chez ceux sur-tout qui sont d'un tempérament *sanguineo-bilieux*, & qui s'abandonnent au dangereux penchant où les entraînent les passions ordinaires dans l'adolescence.

Des humeurs âcres, catharreuses, scorbutiques, scrophuleuses, dartreuses, psoriques érétypellateuses, ou vénériennes, qui séjournent dans les poumons, soit par répercussion ou par toute autre cause, irritent les membranes de ce viscere, causent des toux violentes, y forment des érosions, des ulceres & de mortelles suppurations.

Une lymphe trop dense qui a dégénéré de son caractère, engorge les glandes & les points glanduleux qui sont très-multipliés dans les poumons; il en résulte des abcès, des tubercules qui s'enflamment successivement, forment des ulceres dont le pus réorbé en partie dans la masse des liquides la met dans le désordre, la pervertit & produit un marasme général qui bientôt débilité toutes les fonctions & les éteint.

Lorsqu'une lymphe moins mal conditionnée s'arrête dans les vaisseaux, & séjourne dans les vésicules bronchiques, elle s'y durcit & forme des tubercules crus, qui, lorsqu'on les rend par l'expectoration, ressemblent quelquefois à des portions d'arteres & de veines. On ne doit pas s'y tromper; ce ne sont, selon Ruisch, que des concrétions polypeuses; cet Auteur a observé qu'elles n'ont point de cavité, & que leur substance n'est qu'une lymphe

épaisse , durcie par son séjour dans les vésicules , & par la chaleur animale. Ces concrétions polypeuses , lorsqu'elles sont très-multipliées , conduisent à la Phthisie pulmonaire , par les obstacles qu'elles opposent à la liberté des fonctions des poumons , à l'égalité de la distribution des liquides , à ce que le chyle se perfectionne , &c. Ceux qui ont le malheur d'en être affligés , s'éteignent sans éprouver de fièvre ni de suppuration. J'ai vu des concrétions polypeuses de cette nature , former des corps durs considérables , expulsés par l'expectoration.

La suppression de l'écoulement d'un sang hémorroïdal , des règles , des fleurs blanches , des lochies , donne souvent lieu à des métastases qui portent le désordre dans la substance des poumons , y causent des inflammations , des suppurations qui , lorsqu'elles ne sont pas mortelles dans les premiers tems , dégèrent en des Phthisies pulmonaires , ordinairement fatales.

Les pâles couleurs sont aussi quelquefois des causes de Phthisies pulmonaires , occasionnées par le relâchement des fibres , des vaisseaux & des glandes des poumons , qui dans cet état sont très-propres à favoriser des congestions , des obstructions & des suppurations.

Il n'est pas rare qu'il survienne des Phthisies pulmonaires à la suite de petites véroles & des rougeoles négligées ou mal-traitées ; il s'ensuit des toux seches d'une assez longue durée , des impressions douloureuses à la poitrine , des difficultés de

respirer , suivies d'abcès , de fièvre , d'ulcères , de phthisie , &c. Ce sont des effets d'humeurs âcres ; provenant de ces maladies qui n'ont pas été jugées.

On éprouve de pareils accidens & aussi meurtriers , après la suppression des suppurations habituelles à la peau , & après la répercution des aphtes , ou des ulcères à la bouche , à la gorge , & des éruptions cutanées , principalement lorsqu'ils dépendent d'un vice quelconque de la masse des liquides.

Des aphtes invétérées à la bouche , qui proviennent de quelque vice scorbutique , scrophuleux , vénérien , ou de toute autre nature , se propagent jusqu'au larynx & au pharynx ; elles ulcerent la trachée-artère & l'œsophage ; les malades crachent un pus fétide , dans lequel on distingue souvent de petits pelotons durcis. Ces aphtes donnent toujours du dégoût pour les alimens & des inappétences ; elles causent une maigreur générale qui ne diffère pas de celles des Phthisies pulmonaires.

Les suppurations qui s'établissent dans les poumons à la suite des esquinancies , des fluxions de poitrine ; des fièvres putrides ou malignes , dégénèrent en Phthisie pulmonaire lorsqu'elles ne sont pas terminées en quarante jours : il n'en est pas exactement de même de tous les abcès & des vomiques , j'en ai vu suppurer pendant bien plus long-tems , & guérir radicalement. Je rapporterai des observations qui le confirment.

Les abondantes expectorations pituiteuses , habituelles & anciennes deviennent quelquefois purulen-

tes, & dégénèrent en Phthisies pulmonaires, sur-tout après des abus commis dans le régime de vie, ou lorsque la masse des liquides a contracté quelque vice qui en ait fait dégénérer le caractère.

On voit cependant tous les jours des asthmatiques & d'autres gens à un âge très-avancé, qui crachent abondamment depuis plusieurs années, sans que leur santé en soit altérée; une expectoration de cette nature, est plutôt salutaire que nuisible; sa diminution à un certain point deviendroit dangereuse, & sa suppression seroit mortelle.

Une atmosphère froide & humide relâche les fibres & débilite les vaisseaux des poumons; lorsque cette qualité de l'air est de durée, il en survient des phthisies, sur-tout chez les hommes d'un tempérament pituiteux, dont la fibre est lâche; c'est à une telle constitution de l'atmosphère qu'on doit attribuer la cause des fréquentes phthisies des habitants des pays marécageux, tels que la Hollande, &c.

La contagion est la cause la plus redoutable de la Phthisie pulmonaire; il est cruel que des émanations des entrailles des hommes infectent celles de leurs semblables, & y fassent des impressions mortelles. La vapeur fétide qui s'exhale des poumons des Phthiques, par la respiration, est tellement divisée, multipliée & infectée par les matières méphitiques qui croupissent dans ce borbier de corruption, qu'elle s'insinue, par une espèce d'analogie animale, dans les poumons sains de ceux qui séjournent dans l'atmosphère des malades, & y forment

des plaies fatales. Toutes les communications avec les Phthifiques sont également dangereuses ; une Servante, dit Riviere , devintphthifique pour avoir servi sa Maîtresse morte de cette maladie ; une femme la devint aussi , selon les observations de cet Auteur , pour avoir donné le sein à un enfant phthifique. Un Médecin, selon *Skenkius* , contracta cette maladie pour avoir flairé les crachats d'un phthifique. J'ai vu un Prêtre très-robuste , qui cracha du pus peu de tems après la mort d'une Dame pulmonique , âgée de soixante quelques années. Il avoit contracté cette contagion , en faisant tous les jours une partie de jeu avec cette malade , sur une petite table , où ils étoient placés vis-à-vis l'un de l'autre ; ce malade guérit : j'en rapporterai l'observation.

Il n'y a pas apparencé qu'on contracte la contagion de la pulmonie , lorsqu'elle n'est qu'au premier degré ; au second elle est à craindre ; elle est redoutable au troisieme.

C H A P I T R E I I I .

Signes diagnostiques de la Pulmonie.

LA SEULE VUE d'un pulmonique suffit aux gens de l'Art pour porter un jugement non-équivoque sur cette maladie : la toux , les crachats , la débilité des membres , la pâleur du teint , la maigreur qui fait des progrès sensibles , sont des signes qui la caractérisent.

La plupart des pulmoniques crachent du pus, mais il en est qui n'en crachent point ; ce sont ceux dont les poudons sont farcis de tubercules crus qui sont de nature à ne pas suppurer : ceux qui sont affligés de cette maladie éprouvent une toux sèche, fréquente, quelquefois violente, mais qui n'est pas suivie d'expectoration ; ils deviennent également maigres & exténués ; les fonctions de leurs poudons dégénèrent insensiblement, se dépravent, se pervertissent & enfin se détruisent totalement. La fièvre, de même que dans les phthysies nerveuses, ne se manifeste sensiblement, dans cette espèce de phthysie, que dans son dernier degré, lorsque les malades approchent d'une extinction totale.

Le signe principal qui caractérise une phthysie pulmonaire, purulente au premier degré, est, quand elle provient de tubercules propres à suppurer, une toux sèche différente des toux catharreuses, en ce qu'il n'y a pas comme dans celle-ci d'écoulement d'humeurs âcres & féreuses par les narines & à la gorge ; car la toux catharreuse qui devient phthysique, est ordinairement humide dès le commencement

Chaque degré de Phthysie pulmonaire est marqué par des différences dans le pouls ; au premier degré, il est petit, mou, languissant, un peu fréquent ; au second degré, il est petit, dur, obscur & fréquent ; au troisième degré, il est embarrassé, dur, fréquent, inégal & quelquefois intermittent,

intermittent , sur-tout dans les exacerbations de la fièvre , les malades sont alors accablés d'une chaleur âcre & mordante , principalement dans la capacité du thorax , au visage & aux extrémités inférieures.

La toux phthistique purulente , provient de tubercules glanduleux , qui se forment insensiblement dans les poumons & à la tunique glanduleuse de la trachée-artère , & qui viennent en suppuration en approchant du second degré : quand cette toux est catharreuse , elle est l'effet d'humeurs âcres & féreuses qui se portent dans la trachée-artère , dans les bronches , sur les membranes , & les glandes pulmonaires.

Dans ces deux états de la phthisie pulmonaire , les malades ressentent dans la poitrine une douleur fourde & une pesanteur qui gênent la respiration ; ces symptômes sont plus sensibles , lorsqu'ils sont occasionnés par des érosions catharreuses , que quand ils proviennent de tubercules.

La durée du premier degré de pulmonie est plus ou moins longue , selon le caractère des tubercules & des humeurs qui donnent lieu à la suppuration ; quelquefois elle est de plusieurs mois , d'autres fois elle est de plus d'une année ; il est rare qu'elle le soit de deux. La suppuration se forme assez promptement lorsqu'elle provient d'humeurs âcres , catharreuses , de fièvres putrides , de fièvres malignes , ou d'autres maladies aiguës qui affectent la poitrine , telles que les péripleumonies , les petites véroles , les rougeoles , &c.

Les vomiques crevent souvent sans qu'on ait fait attention aux signes qui les annoncent, cependant ceux qui en sont affligés, ont ordinairement des toux incommodes, leur corps est lourd & pesant, leur haleine est forte, & quelquefois, plusieurs jours avant qu'elles ne percent, il leur vient du sang à la bouche. Lorsqu'elles crevent, l'abondance du pus obstrue quelquefois tellement les bronches, que les malades étouffent en peu de momens ; si l'on expectore le pus, il reste une suppuration, dont on guérit ordinairement par le secours de l'Art : j'en rapporterai des observations.

La toux sèche dans le premier degré de pulmonie devient humide, quelque tems avant que le second degré ne s'établisse ; les malades crachent alors des humeurs pituiteuses qui sont des annonces certaines de crachats purulens.

Lorsque la pulmonie est occasionnée par la rupture des vaisseaux, elle est précédée par l'hémorragie, alors l'inflammation & la fièvre en font le premier degré ; la fièvre est assez forte dans les premiers jours, elle diminue avec l'inflammation, bientôt elle se modere, l'ulcère se forme, & commence le second degré de pulmonie.

Les hémorragies par anastomose ne sont pas d'abord suivies de pulmonies, on peut cracher le sang par cette voie, pendant plusieurs années, sans devenir Phthisique ; je l'ai déjà observé. Si cependant le crachement de sang provenant de cette cause étoit trop fréquent ou trop abondant,

il pourroit se faire, & il se fait souvent, des déchirures dans les bouts des vaisseaux *anastomosés*, suivis de phlogose, d'inflammation, d'ulceres & de phthisie annoncée déjà par ce symptôme.

Les pulmonies qui prennent naissance de maladies chroniques, sont décidées plus ou moins promptement, vers leur second degré, selon la différence de la cause & du caractère de ces maladies.

Toutes ces especes de Phthisies, quand elles sont parvenues au second degré, sont caractérisées à-peu-près par les mêmes signes & par les mêmes symptômes. On a cependant remarqué que la fièvre dans la Phthisie scorbutique & dans celle des pituiteux, paroît plus modérée que celles qui proviennent de toute autre cause. En général les signes de la Phthisie, vers la fin du premier, & dans tous les tems du second degré, sont une fièvre lente, avec des exacerbations, tous les jours ou de deux jours l'un. Ces exacerbations sont marquées par de légers frissons qui sont le prélude d'exacerbations, & non pas de fièvres intermittentes, comme on l'a cru mal-à-propos; car dès qu'une fièvre lente phthistique est établie dans le premier degré, elle fait des progrès, jusqu'à la convalescence des malades, lorsqu'elle a lieu: sa cause subsistant toujours, ses effets doivent toujours être les mêmes. Les exacerbations des fièvres des Pulmoniques, commencent ordinairement dans le tems de la digestion, lorsque le chyle encore cru & mal conditionné par l'effet de la maladie, passe en abondance dans les dernières

divisions de l'artere pulmonaire. Ces signes de la Phthisie pulmonaire continuent à se manifester par des toux plus fréquentes , par des crachats plus purulens & plus variés ; par des anxiétés & des amaigrissemens de plus en plus sensibles.

La suppuration des ulceres formés par l'érosion devient bientôt contagieuse dans le viscere où elle est établie , car les ulceres s'y multiplient à l'infini ; on en a une preuve bien sensible à l'ouverture des corps morts de cette maladie ; leurs poumons sont parsemés de points en suppuration & d'ulceres suppurans , qui ont été formés par la contagion du premier ulcere qui a établi l'état de Phthisie. Ces ulceres se trouvent quelquefois bornés dans le poumon qui a été le premier affecté , sans que dans l'autre , il paroisse d'altération ; souvent ils le sont tous les deux ; mais celui dans lequel la maladie s'est déclarée est toujours plus maltraité que l'autre.

On remarque souvent , en faisant l'ouverture des corps des pulmoniques , que l'un des poumons est farci d'une matiere purulente , sans qu'il y ait dans sa substance la moindre marque de suppuration , alors cette matiere purulente provient de la suppuration du poumon ulcéré. Comme vers la fin du dernier degré de pulmonie , les malades ne crachent que très-difficilement , leurs crachats étant parvenus à la trachée-artere , les forces manquent pour en accomplir l'expectoration ; ils tombent par leur propre poids indifféremment dans les deux branches de la trachée-artere , pénètrent dans les bronches

de l'un & de l'autre lobe , & en remplissent les vésicules.

Les tubercules sont également contagieux , principalement dans le poumon qu'ils affectent le premier, ils se multiplient à l'infini : comme ils ne se forment qu'en différens tems , ils n'entrent en suppuration que les uns après les autres ; la suppuration de chaque tubercule est précédée d'une phlogose & d'une inflammation péripneumonique , cela fait que la fièvre dans les pulmonies de cette espece & les autres symptômes ont plus de variations que dans les pulmonies qui ont commencé par des ulcères.

Lorsque la suppuration est multipliée dans la substance des poumons , il se fait des adhérences de ce viscere , avec la plevre , avec les côtes ; les fonctions en sont de plus en plus gênées , de plus en plus détruites. Dans ce désordre , les symptômes de la pulmonie deviennent plus graves, & se multiplient ; la sanguification se déprave de plus en plus , toute la masse des liquides dégénere par une contagion successive du pus des ulcères qui passe dans les vaisseaux du sang & de la lymphe par les voies de la résorption.

C'est là où commence le dernier degré de la Phthisie pulmonaire ; la fièvre devient plus considérable , la toux plus fréquente , l'expectoration plus abondante , le pus plus fétide ; la voix est rauque , il est des momens où elle paroît s'éteindre ; il survient ordinairement une inappétence générale , la masse du sang se décompose totalement , la

lymphe & le suc nourricier s'échappent par les pores de la peau & par toutes les voies des excré-tions; ils s'établissent des sueurs nocturnes colliquatives, ou des diarrhées du même caractère. De-là une exténuation totale, un marasme général : les os ne sont plus recouverts que par une peau desséchée, les ongles se courbent & deviennent crochus, parce que les chairs qui les soutenoient sont détruites ; la respiration devient de plus en plus difficile & pénible, parce que les bronches ont perdu leur ressort, & qu'elles sont engorgées d'une humeur purulente & putride qui détruit ce qui leur reste d'élasticité, & forme des obstacles à l'introduction de l'air de l'atmosphère : les joues deviennent livides & décharnées, elles paroissent collées aux dents. Les cheveux tombent, les pieds sont œdémateux, il s'engendre des poux, & la force de la vie est éteinte par une entière corruption. Il seroit superflu d'ajouter d'autres signes à ce triste état des pulmoniques, le tableau en est assez frappant pour pouvoir me dispenser d'en augmenter l'expression.

Il est des Phrthiques qui mangent avec un appétit décidé, & qui digèrent en apparence, on doit regarder cet appétit comme un symptôme extraordinaire de la maladie, puisqu'ils maigrissent de plus en plus, perdent leurs forces, & tombent dans un marasme absolu, qui, à ce degré, est suivi d'une mort certaine. Alors le chyle déjà corrompu dans les premières voies, ne recevant aucun degré de perfection dans les poumons, doit participer à leur corruption, par les

émanations du pus & des ulcères qui lui sont contagieuses.

Il est essentiel de savoir que dans certaines maladies de poitrine, il se manifeste quelquefois des symptômes que l'on prend mal-à-propos pour des signes de pulmonie. Riviere a observé qu'un catharre long & violent dépose dans les glandes du larynx, dans celles de la trachée-artère & dans les bronches, une humeur âcre qui produit des symptômes semblables à ceux des Phthiques ; c'est l'effet d'une pituite purulente qu'on prendroit pour du vrai pus, & avec d'autant plus de vraisemblance, que les crachats de ces malades paroissent semblables à ceux des Pulmoniques ; cependant ilsURNAGENT totalement à l'eau, ce qui est une preuve non équivoque qu'ils ne contiennent pas du pus.

J'ai vu des malades affectés, en apparence, après des fièvres de longue durée, de tous les symptômes d'une pulmonie au second degré, sans qu'ils fussent pulmoniques. Leur toux étoit vive & fréquente, & leurs crachats purulens, tantôt de couleur de cendre, tantôt verdâtres, & toujours moins blancs que des crachats simplement pituiteux ; quand je les mettois à l'épreuve de l'eau, ils tomboient en partie au fond des vases, & une autre partieURNAGEoit. Ces fausses pulmonies sont fréquentes chez les enfans, elles le sont moins à un âge plus avancé ; cependant on y est sujet à tous les âges, comme il paroît par l'observation suivante ; mais on les guérit par les secours de l'Art placés à propos.

Un Officier sexagénaire avoit effuyé pendant l'hiver dernier une fièvre putride ; à la suite de cette fièvre, il lui resta une toux sèche très-importune ; il fut pris environ un mois après de quelques accès de fièvre tierce, la toux devint humide, & il parut bientôt des crachats purulens dont une partie tomboit au fond d'un vase à demi plein d'eau tiède, comme dans l'observation précédente. Le malade maigrissoit à vue, & ses forces diminuoient sensiblement. Toute sa maison étoit dans des sollicitudes continuelles sur cette fausse convalescence, & je n'étois pas tranquille sur l'état de la poitrine. J'avois déjà soupçonné, depuis environ un mois qu'il étoit arrivé à Paris, quelque tems avant sa dernière fièvre, que sa première maladie n'avoit pas été parfaitement jugée, puisque la toux avoit toujours continué avec une espèce d'embarras à la tête, principalement au front & vers les sinus frontaux, & que d'ailleurs il paroissoit une espèce de relâchement phlogosé au fond du voile du palais, à la luette & aux amigdales. Je regardai enfin cette maladie comme un reste de *bronchus* ; j'en inférai qu'elle provenoit d'engorgemens purulens de différens sinus de la tête & des différentes glandes, principalement de celles de la gorge. Je m'occupai uniquement de cet objet ; je traitai la maladie en conséquence, tous ces symptômes se dissipèrent, & la santé du malade se rétablit parfaitement : il en éprouve aujourd'hui les avantages dans le sein de sa famille.

CHAPITRE IV.

Phénomènes relatifs à la Phthisie pulmonaire.

LA PHTHISIE pulmonaire est de tous les âges, elle n'épargne ni les enfans ni les vieillards ; ceux-ci en reviennent rarement , mais souvent les autres en guérissent.

Les jeunes gens sont très-exposés à cette fâcheuse maladie , depuis la dix-huitième année de leur âge , jusqu'à la trente-sixième. Lorsque la puberté se développe , le ton organique des solides se rehausse , le sang entre aisément en effervescence ; une seve féconde accomplit , en l'homme , l'ordre de la nature. Cet ordre établi pour faire le principe & le soutien de son existence est souvent altéré par des abus , par des excès qui le renversent , qui le détruisent.

J'ai déjà observé que le sang pénètre dans les poumons comme un torrent ; il y parcourt d'abord par les vaisseaux artériels , des labyrinthes dont les détours sont infinis ; il se perd & se décompose pour ainsi dire dans les divisions qui le conduisent aux orifices des veines qui se refusent à nos sens.

Cette admirable organisation des poumons ralentit la force & l'activité de la circulation du sang , dans leur substance , elle le met au niveau de l'élasticité des solides ; les uns & les autres , par un concours réciproque de force & de résistance ,

forment un équilibre , absolument essentiel à l'importance de leurs fonctions.

Les passions de l'ame , presque toujours immodérées dans la jeunesse , les abus , les excès , de quelque nature qu'ils soient , augmentent la force du mouvement systaltique du cœur & des arteres , le sang est porté dans les poumons avec une abondante rapidité, les arteres de ce viscere en sont engorgées, & leurs calibres en sont excessivement dilatés.

Dans cet état des vaisseaux artériels & veineux , le sang ne peut pénétrer dans ceux-ci , qu'avec une dangereuse lenteur ; les membranes des calibres des autres sont forcées par la quantité du sang qui y aboutit continuellement ; elles se rompent , ou les arteres capillaires s'anastomosent ; il en résulte des hémorragies plus ou moins considérables , selon les calibres des vaisseaux ouverts ou trop dilatés. De-là des inflammations , des suppurations , & des phthísies , lorsqu'on n'a pas le bonheur de les prévenir.

Les abus & les excès dans l'usage des fix choses non naturelles , sont très-propres à causer les mêmes accidens ; s'ils ne sont pas suivis d'hémorragies , ils altèrent les principes des humeurs récrémentielles elles en acquierent trop de densité , ou en contractent de l'âcreté & forment dans les glandes ou dans les vaisseaux des poumons , des tubercules , des érosions , des suppurations , &c.

Il est rare qu'après un crachement de sang considérable provenant de la rupture des vaisseaux , la plaie se cicatrise sans suppuration ; il en est comme

des plaies des parties extérieures, dont les bords se réunissent à la faveur d'un bon pus, d'une suppuration louable; une telle suppuration des poumons doit être terminée en peu de tems, le plus tard au quarantieme jour; autrement la plaie augmente, la fièvre devient hectique & le malade tombe dans le marasme: il en est de même de toutes les suppurations des poumons, quelle qu'en soit la cause: cependant cette loi générale n'est pas sans exception; je l'ai déjà observé.

Le bon pus doit être sans odeur, léger, égal & uniforme. Le mauvais pus dégénere totalement de ces qualités; on doit regarder comme de très-bon augure, si ce dernier reprend insensiblement les qualités de l'autre; c'est une marque que l'ulcere est susceptible de guérison.

Plus le pus séjourne dans les poumons, plus son âcreté augmente & cause des érosions; les ulcères alors font des progrès rapides, & tous les symptômes de la pulmonie deviennent de plus en plus graves.

Le pus qui séjourne dans les poumons devient dense & se durcit par la chaleur de ce viscere; il forme des engorgemens, des tubercules crus, ou des concrétions polipeuses, qu'il est essentiel de prévenir en provoquant l'expectoration. Hippocrate a observé que la suppression des crachats précède presque toujours la mort des Phthitiques.

Le pus ne se forme pas dans les vaisseaux; le sang se durcit dans ceux qui lui sont propres; sa

partie rouge ne paroît pas se changer en pus, selon l'observation de *Wan Swieten* ; ce ne sont que les parties des humeurs les plus fines & les plus divisées, qui, en se séparant du sang par les pores qui aboutissent aux ulcères dont les embouchures sont corrodées & détruites, se corrompent par la contagion du pus qui y séjourne. Tandis qu'une plaie est sanguinolente, il n'y paroît pas de pus ; mais lorsqu'elle cesse de l'être, on aperçoit l'humeur fereuse qui s'y putréfie. Cette humeur doit être très-abondante dans les poumons ulcérés par rapport à la grande quantité de sang & de chyle encore cru & mal conditionné, qui se distribue irrégulièrement dans leur substance.

Lorsque le pus des pulmoniques passe aisément dans les bronches & qu'on le crache en totalité, on vit long-tems dans un état de pulmonie. Il en est de même lorsque les ulcères sont calleux, & lorsqu'ils forment des adhérences ; alors le pus n'est pas réorbé par les pores des vaisseaux sanguins. *Willis* a observé que les ulcères calleux faisoient dans les poumons l'effet d'un cautère, & préservoient le sang de la corruption, en le garantissant d'une communication dangereuse avec le pus des ulcères. *Wan Swieten* suivit pendant quatre années un homme qui crachoit tous les jours quelques onces de pus ; ce malade lui protestoît que depuis trente ans il en crachoit de même & en même quantité. *Skenkius* & d'autres Observateurs rapportent des cas semblables ; j'en ai vu de pareils, & j'en vois encore tous les jours.

Le pus qui n'a pas contracté de mauvaises qualités est infiniment moins dangereux, & menace moins les jours de ceux qui sont affligés d'ulceres aux poumons, que celui qui est d'un mauvais caractère.

Plus le pus dégénere de la qualité d'un bon pus, moins on doit concevoir d'espérance de guérison ; il dégénere lorsqu'il est retenu trop long-tems dans la cavité des ulceres, & lorsqu'on ne le crache pas avec aisance, à mesure qu'il se forme : il est à craindre pour ses effets lorsqu'il prend des couleurs différentes de la couleur blanche qui caractérise un bon pus : il est redoutable lorsqu'il paroît avoir pris la qualité d'une humeur ichoreuse qui est toujours âcre, corrosive & propre à détruire de plus en plus la substance des poumons.

En général le pus est toujours de mauvaise nature, lorsque les ulceres proviennent de quelque vice dans la masse des liquides ; cependant il peut prendre la qualité d'un bon pus, s'il est possible de remédier à la cause qui l'a fait dégénérer ; on peut alors concevoir des espérances de guérison.

Hippocrate est le premier des Médecins qui ait soumis le pus à l'expérience de l'eau : cet auteur faisoit cracher les pulmoniques dans un vase à demi plein d'eau de la mer ; si les crachats surnageoient, il les regardoit comme mucueux ; s'ils tomboient au fond du vase, ils étoient du vrai pus : quelquefois une partie des crachats surnageoit, & l'autre

tomboit au fond du vase : la partie furnagente étoit une mucosité & l'autre une purulence.

Cette ingénieuse expérience s'est soutenue jusqu'à nos jours. Dans les pays éloignés de la mer, on se servoit d'eau salée qui produisoit à-peu-près le même effet ; on se sert aujourd'hui indifféremment d'eau commune simple, tantôt froide, tantôt tiède, selon l'idée de ceux qui font l'expérience : c'est ainsi que des connoissances utiles dégénèrent, lorsqu'elles sont dans les mains du public.

L'eau de la mer est plus dense que l'eau commune, elle retient mieux que celle-ci sur la surface de l'eau les crachats qui ne sont que mucueux. La membrane intérieure de la trachée - artère est toujours enduite d'une mucosité écumeuse, qui contient une quantité considérable de bulles d'air qui la rendent plus légère que l'eau, & la font furnager, au lieu que le pus n'en contient que bien peu, ou n'en contient pas ; ce qui fait qu'il tombe au fond de l'eau.

Le pus des crachats est quelquefois tellement mêlé avec le mucus qu'il ne s'en sépare pas d'abord dans l'eau ; dans ce cas on laisse les crachats dans l'eau pendant quelques heures, le pus se dissout insensiblement, se sépare de la mucosité avec laquelle il étoit confondu & tombe au fond du vase. Ne doit-on pas inférer de cette observation, que l'eau salée est plus propre pour cette expérience que l'eau commune ? Le sel dont la première est imbuë la rend très-résolutive, au lieu que l'eau

commune n'est que délayante , qualité qu'elle conserve également lorsqu'elle est salée.

Les premiers crachats que les pulmoniques expectorent le matin , après le sommeil , à la faveur d'une toux très-légère , sont ordinairement du vrai pus , sans mélange avec le mucus de la trachée-artère ; c'est là le moment de les soumettre à l'expérience , & le moyen de la rendre plus lumineuse.

La meilleure qualité du pus est, selon Hippocrate, d'être sans odeur ; celui qui a de l'odeur , est sensé dégénérer de la qualité d'un pus louable. Les différents degrés de fétidité qu'il acquiert , sont autant de signes qu'il dégénère de plus en plus au préjudice de la masse du sang , & du système des solides. Cependant on a vu des pulmoniques cracher du pus fétide & vivre plusieurs années, ce qui est très-extraordinaire ; une loi générale est toujours susceptible de quelque exception ; les opinions des hommes ne prescrivent pas des bornes aux ressources de la nature.

On est dans l'usage de répandre sur des charbons ardents , ou sur une pele rougie au feu , les crachats purulens des pulmoniques , pour juger de leur qualité par l'odeur qu'ils rendent ; plus l'odeur en paroît mauvaise , dans cette expérience , plus on désespere des malades , parce qu'on fait marcher la corruption des liquides d'un pas égal avec la fétidité du pus. Il est bon d'observer que tous les crachats que l'on brûle exhalent une mauvaise odeur ; il est cependant très-vraisemblable que la fétidité de ceux

des pulmoniques doit être de plus en plus rehauffée selon les différens degrés de la maladie. Hippocrate la place parmi les signes de mort, sur-tout lorsqu'elle est jointe à la chute des cheveux.

Wan Swieten observe que le pus de toutes les parties du corps peut être porté dans les poumons, par métastase, & y occasionner des vomiques; on voit souvent des observations semblables, il seroit superflu de chercher à étayer celle de cet auteur par d'autres autorités.

On peut aussi cracher du pus provenant d'ulceres en d'autres parties du corps que des poumons, sans que ce viscere en souffre de lésion sensible. Un Seigneur, en montant à cheval, se blessa au *scrotum*, il y survint un abcès, il en résulta une ulcere dont la suppuration devint très-abondante & générale dans toute cette partie; il arrivoit de tems en tems que la quantité du pus diminuoit dans l'ulcere; dès le premier moment de la diminution de cet écoulement, il survenoit une toux fréquente & importune, avec des crachats abondans, d'un pus très-caractérisé. L'écoulement de pus étant rétabli dans la partie malade, par les secours de l'art, la toux cessoit & les crachats n'avoient plus lieu: cette alternative dura environ deux mois, la gangrene survint à la plaie, le malade mourut, malgré les secours de l'art dirigés par les plus grands maîtres. J'avois suivi exactement cette maladie en qualité de médecin ordinaire; je fus présent à l'ouverture du corps, les poumons étoient sains & sans aucune tâche qui pût

pût indiquer des marques de suppuration. Il se fait aussi des métastases des poumons en d'autres parties, comme il conſte par l'obſervation ſuivante.

Un jeune homme de qualité ſouffroit d'un rhume conſidérable, au commencement du printems de l'année 1780 ; malgré la violence de ce rhume, il ſe livra à des excès avec des femmes, il y perſiſta pendant deux mois. Il entreprit enſuite un voyage de deux jours, dans un tems extrêmement chaud. Etant arrivé au lieu de ſa deſtination, il ſe trouva ſans toux, il ſe crut guéri. Le lendemain de ſon arrivée, il prit un bain & il fut ſaiſi tout-à-coup d'une douleur violente à la poitrine, avec une groſſe fièvre. Comme les ſecours ordinaires ne lui procuroient pas de ſoulagement, on lui appliqua ſur la partie douloureuſe un emplâtre véſicatoire. A peine cet emplâtre avoit-il irrité la peau que la douleur de poitrine ſe diſſipa totalement & ſe porta ſur le bras droit, où dans quelques heures il ſe forma un abcès dont la ſuppuration fut ſi prompte & ſi abondante, qu'on fut obligé de l'ouvrir dès le commencement du troiſieme jour ; on fut très-surpris de ce qu'il en ſortit, près de deux-livres de pus de mauvaſe qualité. Depuis ce moment, de nouveaux abcès ſe ſont ſuccédés aux extrémités tant ſupérieures qu'inférieures ; il a toujours des plaies ouvertes & des ſuppurations abondantes.

CHAPITRE V.

Signes pronostics de la Phthisie pulmonaire.

UNE maladie aussi grave que la Phthisie pulmonaire, porte, avec le nom qui la désigne, un pronostic alarmant ; dès qu'elle commence elle est regardée comme dangereuse, lorsqu'elle a fait des progrès elle l'est plus encore, & en général elle doit être considérée comme incurable lorsqu'elle est au troisieme degré. Cependant on est parvenu, par une longue suite de recherches, à la rendre moins généralement mortelle : on s'en convaincra d'après les observations répandues dans le cours de cet Ouvrage.

Lorsque la cause de la pulmonie est de nature à être susceptible de guérison, la pulmonie l'est aussi, pourvu qu'on la prenne dans ses commencemens.

Si dans la Phthisie les viscères du bas ventre ne sont point affectés, si l'abdomen n'est pas météorisé, si les malades n'ont pas le teint jaune, s'ils n'éprouvent pas des battemens extraordinaires des arteres de la région épygastrique, on a lieu de concevoir des espérances de guérison.

On peut se flatter de pareilles espérances, lorsque les malades sont d'un tempérament robuste, surtout lorsque le pus qu'ils expectorent est inodore, blanc, égal, d'une seule couleur, pourvu qu'ils le crachent avec facilité en même tems qu'il se forme dans les ulcères.

Lorsque le pus a contracté un caractère suspect & qu'il reprend ensuite les qualités d'un bon pus, on peut espérer, que, si les malades ne commettent pas d'imprudence, la maladie se terminera heureusement. Si dans cet état les malades n'ont pas des dispositions héréditaires à la pulmonie qui aient été trop négligées; si leur poitrine est large & robuste, si l'appétit & les forces se soutiennent, si les digestions sont bonnes, si l'altération n'est pas considérable, si la chaleur du corps ne diffère pas ou ne diffère que peu de la chaleur naturelle, si les excrétiions répondent à la quantité des alimens, & si la respiration n'est pas gênée, on peut s'attendre à une entière guérison, pourvu qu'on ne néglige pas de seconder la nature par les secours de l'art.

Arétée a observé dans les pulmonies des signes de convalescence qui sont avoués des gens de l'art. Ces signes sont une toux plus développée & plus rare, des crachats sanieux & plus humides, des garderobes plus naturelles & des urines abondantes; une voix plus forte & plus claire, un sommeil plus long, des entrailles souples, la diminution de la douleur entre les omoplates, une respiration plus aisée sans âpreté de la voix.

La pulmonie parvenue au dernier degré, je l'ai déjà observé, a toujours été regardée comme incurable, on la considère encore de même; je rapporterai cependant des observations qui constatent qu'on a guéri des pulmoniques qu'on regardoit comme désespérés. Ce sont, il est vrai, des

cas rares qui ne peuvent tout au plus que donner des espérances.

On est toujours en danger dans la Phthisie pulmonaire, lorsque la chaleur & la fièvre étiq̃ue font des progrès, lorsque la maigreur augmente à mesure que les forces déclinent. La cause essentielle de ces symptômes provient ordinairement de ce que l'expectoration n'est pas suffisante pour évacuer tout le pus qui se forme dans les poumons ; ce pus, par son séjour dans les ulcères, devient de plus en plus âcre & fétide ; il augmente la corrosion des ulcères, & les rend enfin inaccessibles aux ressources de la nature & aux secours de l'art.

Les pustules semblables à des brûlures qui quelquefois s'élèvent à la peau des pulmoniques, sont des signes que la maladie est consommée. Les ulcères à la bouche & à la gorge qui font des progrès dans la trachée-artère, rendent la pulmonie incurable ; des fluxions aux gencives avec une fièvre considérable, produisent le même effet.

Les filles & les femmes qui deviennent phthisiques à la suite de la suppression de leurs secours périodiques, peuvent guérir si ces évacuations se rétablissent au gré de la nature ; celles au contraire qui perdent leurs règles lorsque la Phthisie est confirmée sont dans le plus grand danger.

Les phthisiques qui ont contracté cette maladie par des obstructions au foie, ne guérissent pas pendant que ces obstructions subsistent.

Le météorisme de l'abdomen qui survient dans la

Phthisie est un signe mortel. Les démangeaisons à la peau, après la suppression des cours de ventre sont un symptôme plein de danger : si les cours de ventre ont été supprimés par des remèdes donnés mal à propos, les démangeaisons deviennent générales & incurables.

Le danger est imminent s'il survient des oppressions, des foiblesses, des syncopes ; si l'haleine est fétide, si les gros excréments & les urines ont une odeur cadavéreuse ; si la voix est rauque & comme éteinte ; si avec des sueurs, ou des dyarrhées colliquatives, il survient des engorgemens aux extrémités inférieures, si les cheveux tombent, si les crachats se suppriment, &c.

Les symptômes de la Phthisie pulmonaire sont toujours plus graves en automne qu'en toute autre saison : Hyppocrate l'avoit déjà remarqué ; c'est l'effet des vicissitudes de l'atmosphère. Il n'est pas surprenant que le corps humain supporte plus difficilement cette saison que toute autre, puisque les plantes & les arbres perdent leurs feuilles, se dessèchent, pour ainsi dire, faute d'un suc nourricier & d'une qualité de l'air propres à entretenir leur sève & leur verdure.

Ces signes pronostics de la Phthisie pulmonaire sont établis d'après des observations générales, mais ces observations ne sont pas des loix absolues : on a vu la nature & on la voit souvent guérir des Phthisies au dernier degré. Ceux qui ont le malheur d'être affligés de cette maladie, ne doivent pas désespérer.

d'obtenir les mêmes avantages, sur-tout si la nature est secondée à propos par les secours de l'art ; c'est sans doute pour cette raison qu'Hippocrate & d'autres grands Médecins ont dit qu'il seroit cruel d'abandonner des phthifiques désespérés.

SECTION SECONDE.

*De la Phthisie pulmonaire essentielle ,
de l'héréditaire & de la contagieuse.*

CHAPITRE PREMIER.

De la Phthisie essentielle.

LA PHTHISIE pulmonaire essentielle est celle qui provient d'une mauvaise disposition, ou de vices particuliers qui n'ont pas été précédés de maladies qui aient pu les occasionner.

Les enfans ne naissent pas tous avec des tempéramens assez robustes pour les garantir des incommodités & des maladies auxquelles ils sont exposés. Ces maladies sont des effets ordinaires de leur éducation physique, principalement de leur première nourriture, quand elle est mal conditionnée, excédente, ou mal dirigée ; elle est alors plus propre à altérer les fonctions animales qu'à les rendre fermes & constantes. Si les enfans résistent d'abord aux

accidens qui menacent leurs jours , ou la sérénité de leur jeunesse , il leur en reste ordinairement dans les organes & sur-tout dans les viscères une délicatesse qui les rend susceptibles des moindres abus , des moindres excès. Ces dispositions prises dans l'enfance , se conservent chez les adultes & passent souvent à tous les âges , sur-tout quand elles ont eu pour principale cause une vie déréglée de ceux qui leur ont donné le jour.

On est également exposé à tous les âges à de pareilles maladies , lorsqu'on abuse de son tempérament , que l'on se livre à des abus dans le régime de vie & à des excès qui font violence à la nature & à ses fonctions ; ce qu'il y a encore de plus malheureux , c'est que ces maladies deviennent héréditaires & se perpétuent pendant plusieurs générations.

Les bossus , ceux qui ont la poitrine étroite , enfoncée , les omoplates saillantes comme des aîles , les côtes élevées , le cou long ; les personnes fluettes , délicates , d'une haute stature , sont sujettes à des hémophthísies , à des catharres , à des congestions sanguines , lymphatiques , bilieuses à la poitrine , à la gorge & à la trachée-artère ; ce sont des difformités des accidens qui menacent de Phthisie pulmonaire.

La Phthisie qui provient de quelque-une de ces causes est annoncée par une toux sèche , par une petite fièvre , par des frissonnemens au dos , suivis d'une chaleur plus forte que la chaleur animale , d'une rougeur aux joues & aux levres qui augmente pendant la digestion , lorsque le chyle passe par les poumons ; par

des sueurs nocturnes, par une débilité des membres, par une difficulté de respirer, qui augmente au moindre exercice, quelque modéré qu'il soit.

J'ai déjà donné une idée de la structure des poumons, de leur sensibilité, de leur irritabilité; de la rapidité & de l'abondance du sang que leur fournit dans tous les instans l'oreillette droite du cœur, quantité sensiblement plus grande dans un tems égal que celle qui passe dans toute autre partie, dans toute autre viscere. On a vu aussi que les poumons sont les principaux organes de la sanguification, & qu'en cette qualité le chyle doit acquérir dans leur substance son premier degré de perfection, & le sang presque tous ceux dont il est susceptible.

D'après ces connoissances on ne doit pas être surpris qu'il survienne de hémorragies lorsque le sang trouve dans les poumons des obstacles qui ralentissent & qui retardent le libre cours de sa circulation, ou qui lui opposent de trop grandes résistances; que des humeurs âcres qui engorgent les membranes & les glandes de ce viscere y forment des tubercules suppurans, des abcès, des vomiques; y entretiennent des érosions, y causent des inflammations & des ulcères; qu'une lymphe déjà trop dense se durcisse par son séjour dans les vesicules & y forme des tubercules crus, des concrétions polypeuses, des corps durs, &c.

Ces accidens ou ces vices locaux établis en partie dans la substance des poumons, sont très-propres à renverser l'ordre des fonctions, à faire dégénérer &

pervertir la masse des liquides , & à détruire insensiblement le système des solides. Combien ne doit-on pas être attentif à prévenir ces désordres & à y remédier ? On verra par les observations suivantes qu'il n'est pas toujours impossible de remplir ces objets importants.

Parmi les jeunes gens qui ont des dispositions à la Phthisie pulmonaire , il en est ordinairement qui ont un esprit vif & précoce ; il semble que la nature veuille les dédommager par cet avantage du danger qui les menace. Cicéron étoit dans ce cas alarmant, lorsqu'il se dispoit à rendre Rome de plus en plus célèbre par son éloquence ; il nous apprend lui-même qu'il étoit alors très-maigre & très-débile, que son cou étoit mince & allongé, & qu'il étoit en danger de perdre la vie s'il se livroit aux travaux du cabinet & aux exercices pénibles du barreau ; cependant il étoit séduit par son émulation, elle étouffoit ses craintes légitimes. Les médecins & ses amis ne cessent de l'exhorter à préférer sa conservation à son penchant. Il céda enfin , il partit pour l'Asie , il voyagea pendant deux ans dans cette belle partie du monde , & il revint à Rome rétabli de sa maigreur & de toutes les infirmités qui, avant son départ, le menaçoient d'une Phthisie inévitable s'il n'avoit pas eu le courage de la prévenir. Cicéron, de retour dans sa patrie , commença bientôt à établir les fondemens de sa gloire par la force de son éloquence & par l'étendue de ses talens pour le gouvernement ; elle étoit portée à son comble lorsque l'envie, l'inté-

rêt , l'injustice & la cruauté éguiferent le glaive qui trancha ses jours.

M. de la Sourd... fut pris d'un rhume , ou d'une toux fréquente pendant le mois de Septembre de l'année 1767 ; il étoit alors âgé de cinquante-quatre ans ; il regardoit cette incommodité comme étant sans conséquence , il la négligea : cependant la toux augmentoit de plus en plus , & ses crachats devenoient de jour en jour plus abondans ; on en prit des alarmes , on m'appella à son secours le vingt-six de Novembre de la même année , je le trouvai avec une fièvre lente très - caractérisée ; les crachats étoient du vrai pus d'assez mauvaise qualité , de couleur grifâtre & fanguinolens ; ces deux symptômes annonçoient sans équivoque une Phthisie pulmonaire au second degré. Le malade avoit perdu pendant les deux années précédentes , de pareilles maladies , deux de ses freres qui étoient ses aînés , ce qui ne me rassuroit pas sur les conséquences que j'avois à tirer de son état. Je demandai une consultation qui confirma mon sentiment sur cette maladie , & on désespéra de sa guérison. Malgré les raisons très - vraisemblables de ce pronostic , j'employai les remèdes que je crus les plus indiqués ; M. de la Sourd... en continua l'usage pendant quatre mois avec la plus scrupuleuse exactitude ; il en obtint une guérison si parfaite , qu'il jouit encore aujourd'hui (1781) de la santé la plus heureuse & la plus constante.

Cette maladie ne peut pas être regardée comme héréditaire, malgré le soupçon que pourroit en donner la mort de ses deux freres ; l'âge auquel ils en ont été atteints seroit suffisant pour lever ce doute ; d'ailleurs leur pere étoit mort âgé de quatre-vingt-quatre ans, & leur mere succomba à une fluxion de poitrine après la soixante-dixieme année de son âge : pas un de ses ayeux n'avoit été affligé de Phthisie pulmonaire.

On avoit fait l'ouverture du corps du dernier mort des freres de M. de la Sourd... ; on avoit trouvé, selon la relation qui m'en a été remise, le poumon droit particulièrement affecté ; ses deux lobes fortement adhérens les uns aux autres ; leur extrémité supérieure couverte de tubercules suppurés ; il y avoit encore des tubercules en d'autres parties de ce viscere. Quand à l'intérieur des poumons, ils étoient pénétrés à des distances inégales de plusieurs sinuosités de divers diametres & profondeurs, remplies d'un pus fétide.

Harderus a donné l'observation suivante. Un Gentilhomme avoit trois enfans d'un légitime mariage, l'aîné étoit âgé de plus de trente ans, le second de vingt-huit, & le troisième de vingt-quatre, qui moururent phthifiques dans la même année. Ce qui rend cette fatalité d'autant plus surprenante, dit l'Auteur, c'est qu'aucun des parens ne pouvoit être soupçonné de pulmonie ; d'ailleurs ces trois freres étoient d'une constitution différente ; l'aîné étoit mélancolique & naturellement maigre ; le

second étoit gras & d'un tempérament sanguin & phlegmatique ; le dernier étoit robuste & bien constitué. *Harderus* témoigne son extrême surprise, à la fin de son observation, de ce que les trois freres de différens tempéramens & d'une façon de vivre différente étoient morts en même tems de la même maladie, sans qu'on pût la soupçonner héréditaire.

Un Apothicaire du Roi, âgé de cinquante-cinq ans, d'un très-bon tempérament, qui n'étoit sujet à aucune incommodité habituelle, fut pris au mois d'Août de l'année 1771 d'une toux sèche qui devint plus forte & plus fréquente ; au mois d'Avril elle étoit convulsive sans crachats, elle augmenta au mois de Mai ; il survint quelques crachats visqueux un peu sanguinolens, & des frissonnemens au dos ; la toux & l'expectoration continuerent de même. Au mois de Juin il rendit deux crachats sanguinolens ; les frissonnemens devinrent généraux dans tout le corps. Quinze jours après, crachement de sang qui dura toute la journée, la fièvre se déclara, elle se modéra au quatrieme jour & dégénéra en fièvre lente. Huit jours après, nouveau crachement de sang qui dura quatre jours ; les crachats étoient rouillés ; il survint des hémorroïdes qui, quoiqu'elles fluassent, la toux en devint convulsive, les crachats étoient d'un roux sale ; les sangsues appliquées au fondement soulagerent les douleurs, mais les crachats resterent les mêmes, & de tems en tems sanguinolens : après le quinze d'Aôut ils ne parurent plus que sous la forme d'un pus fétide ; la fièvre

avoit tous les soirs des exacerbations très-marquées ; la maigreur faisoit des progrès , & tous les symptômes de la maladie empiroient sensiblement.

Ce fut vers le quinze du mois d'Août que je vis le malade pour la première fois ; sa maladie étoit regardée comme désespérée ; je lui donnai des soins aussi assidus que mes affaires & l'éloignement de Paris à Versailles purent me le permettre. J'eus le bonheur de diminuer en peu de tems la violence des symptômes , insensiblement ils se dissipèrent ; la poitrine se rétablit dans son état naturel , & au point que le malade s'est porté jusqu'aujourd'hui & se porte encore mieux qu'avant sa maladie , dans sa meilleure santé. La toux, par où commença cette maladie , étoit une vraie toux phthisique , & la phthisie ne pouvoit être qu'essentielle ; jamais dans la famille du malade il n'avoit été question d'aucune maladie de ce caractère.

Madame la Comtesse de B... âgée de vingt-deux ans fut prise d'une toux considérable vers le milieu de l'année 1762 ; il survint un crachement de sang qui dura vingt-quatre heures , & une expectoration lymphatique , souvent sanguinolente. A la moindre agitation elle étoit oppressée. Elle éprouvoit la nuit & le jour des inquiétudes dans tous ses membres ; elles étoient plus insupportables la nuit qu'elles ne l'étoient pendant le jour. La violence de la toux diminua , mais son caractère resta le même. Les crachats étoient de temps en temps sanguinolens , & on jugeoit à la seule vue , qu'ils étoient

purulens. Dès sa première jeunesse Madame souffroit assez fréquemment de douleurs à la poitrine vers la partie inférieure du sternum qui se faisoient ressentir entre les omoplates. Outre ce symptôme dont la source étoit dans la poitrine, il existoit vraisemblablement des embarras dans les viscères du bas ventre ; ils étoient indiqués par des gonflemens fréquens de la région épigastrique & par un météorisme sensible de tout l'abdomen. Madame éprouvoit encore tous ces accidens lorsqu'elle me consulta, le onze du mois de Juillet de l'année 1763.

Comme la maladie étoit alarmante par la nature & par la durée de ses symptômes, & que la malade avoit d'autant plus de raison d'en craindre les suites, que depuis peu de tems il étoit mort une de ses sœurs d'une Phthisie pulmonaire, elle vint à Paris avec M. son époux, pour commencer sous mes yeux les remèdes que je lui avois conseillé dans ma consultation.

Après quelque tems de séjour à Paris, Madame la Comtesse de B... fut obligée de retourner dans sa patrie, où son mari étoit rappelé pour des affaires de conséquence ; avant son départ les symptômes de la maladie étoient tellement mitigés, qu'elle avoit conçu avec raison des espérances d'une prompte & entière guérison. Elle continua exactement ses remèdes, & M. le Comte de B... m'écrivit le 24 du mois de Décembre de la même année, pour m'annoncer le parfait rétablissement d'une épouse dont la santé feroit le bonheur de ses jours. L'année

après Madame accoucha heureusement d'un garçon très-sain & très-robuste ; elle n'avoit pas eu d'enfant avant sa Maladie. La malade & madame sa sœur qui étoit morte pulmonique avoient été élevées en même tems dans le sein d'une famille riche , avec une délicatesse surprenante ; on ne doit pas attribuer à d'autre cause leur disposition à la Phthisie pulmonaire.

Je fus appelé le 5 du mois de Juillet de l'année 1771 pour Madame de M... rue Boucherat au Marais , âgée d'environ vingt-six ans ; je la trouvai affectée d'une Phthisie pulmonaire au second degré. Je la priai de me donner quelque instruction sur le commencement & les progrès de sa maladie ; elle me dit que depuis huit ans , elle étoit très-sujette à des rhumes fréquens & à des douleurs de poitrine ; que dans plusieurs de ces rhumes elle avoit eu de la fièvre , des douleurs de poitrine & des crachemens de sang , que ses regles étoient irrégulières & que depuis un an elles avoient diminué en quantité ; que depuis ce tems-là il lui survenoit souvent des éruptions cutanées. Elle m'avoua qu'elle s'étoit toujours très-mal ménagée , & qu'elle n'avoit jamais voulu qu'on lui fît de saignée : que ses rhumes avoient eu des intervalles considérables , mais qu'ils avoient toujours repris avec violence , & qu'alors les douleurs de poitrine se renouvelloient & se faisoient sentir jusqu'aux omoplates ; que dans ces attaques elle avoit toujours de la fièvre & des crachats sanguinolens ; que depuis un mois elle avoit craché du

sang ; qu'enfin elle crachoit du pus , que la fièvre ne la quittoit pas , & qu'elle étoit d'une foiblesse extrême : qu'étant enfin réduite à ce triste état, elle s'étoit déterminée à m'appeler à son secours , & à faire usage des remèdes que je croirois lui être nécessaires.

Madame de M... tint sa parole pour quelque tems, elle observa un régime de vie convenable, & fit usage avec assez d'exactitude des remèdes que je lui prescrivis, ils la délivrèrent totalement des symptômes de la poitrine. Elle jouit ensuite pendant cinq à six ans d'une bonne santé ; mais ayant repris son premier régime de vie & lui étant survenu des chagrins propres à affecter une ame sensible, elle tomba dans une langueur à la suite de laquelle elle perdit la vie sans qu'il se manifestât aucune affection particulière à la poitrine. Madame de M... m'avoua plusieurs fois pendant sa maladie qu'elle avoit mérité depuis son adolescence de tomber dans le triste état où elle étoit réduite.

Un Officier de la Cour, âgé d'environ trente-six ans, vint à Paris vers la fin du mois de Mars de l'année 1776 ; il m'appela, je le trouvai dans son lit avec une douleur de poitrine inquiétante, accablé d'une fièvre lente & fatigué d'une toux fréquente avec des crachats dans lesquels on distinguoit sensiblement un pus blanc qui heureusement n'étoit pas fétide. Dans deux mois de tems, il fut en état d'aller à Versailles reprendre ses fonctions. Il a joui d'une santé parfaite depuis la guérison de cette maladie.

Au commencement de l'année 1766 je fus appelé pour un Domestique de Mademoiselle Quin... du Louvre, âgé d'environ trente-deux ans ; je le trouvai accablé d'une langueur singulière, avec une toux fréquente, une fièvre lente très-caractérisée & un crachement de pus abondant & fétide. Il y avoit déjà du tems que la toux avoit commencé ; il l'avoit toujours négligée, selon la pernicieuse habitude où l'on est presque généralement de négliger les toux de cette espece. Il maigrissoit à vue, la Phthisie étoit si avancée, que je prévins sa respectable Maîtresse du danger où il étoit. Cependant ce malade fut si docile & suivit mes conseils avec tant d'exactitude, qu'il fut guéri radicalement, en moins de trois mois. Il se maria quelque tems après hors de Paris ; il vint me voir six ans après son mariage ; il jouissoit d'une santé parfaite ; j'ai appris depuis peu de jours qu'il est encore dans cette heureuse situation.

Un Domestique de Madame Den..., rue neuve St. Eustache, touffoit, crachoit & languissoit depuis bien du tems ; on m'appella dans l'automne de l'année 1779 ; je le trouvai avec la fièvre & tous les autres symptômes d'une pulmonie confirmée à la fin du second degré. Il crachoit chaque jour au moins six ou sept onces d'un pus fétide & souvent sangui-nolent ; il étoit si mal qu'on désespéroit de sa guérison ; cependant il l'obtint après trois mois d'un usage constant de régime & de remèdes : il est aujourd'hui gras, frais & il se porte pour le moins aussi bien qu'il se portoit dans sa première jeunesse.

Il seroit superflu de multiplier ces observations ; j'en ai déjà donné plusieurs dans mon livre d'observations de médecine, & j'en répandrai d'autres dans le cours de cet Ouvrage, en traitant des pulmonies qui proviennent de différentes causes.

CHAPITRE II.

De la Phthisie pulmonaire héréditaire.

LA Phthisie pulmonaire est regardée comme héréditaire lorsqu'elle provient de pareille maladie dont les parens ou les nourrices ont été affligés. C'est une doctrine que nous tenons d'Hippocrate ; elle a été confirmée par des observations multipliées pendant le nombre des siècles qui se sont écoulés depuis cet auteur jusqu'à nos jours. C'est d'après cette certitude que les anciens médecins ont considéré la pulmonie héréditaire comme incurable, & que souvent ils ont abandonné à leur sort des malades qui avoient le malheur d'en être affligés. Depuis que la science de la médecine a fait des progrès pour le bonheur de l'humanité, les ressources de l'art mettent quelquefois la nature à portée de prévenir les effets de cette triste portion de l'héritage de nos peres, & il n'est pas rare qu'elle guérisse les maladies qui en proviennent.

On ne peut se dissimuler que la pulmonie héréditaire ne soit une maladie des plus cruelles & des plus funestes ; elle fait la désolation des familles, &

quelquefois on l'a vue les détruire successivement. Peut-être que les anciens médecins étoient trop attachés au préjugé sur le danger de cette maladie, & qu'ils ne s'opposoient pas assez efficacement à ses ravages, faute, sans doute, d'en connoître les véritables causes.

Un autre préjugé sur la Phthisie héréditaire peut avoir retardé les progrès de l'art, dans les moyens de la guérir. Quelques observateurs ont établi trop généralement que cette succession héréditaire dépend de la disposition des parties organiques, qui manquent d'un ton & d'une élasticité suffisans pour accomplir le système de la circulation des liquides dans les labyrinthes infinis que forment les vaisseaux des poumons. On pourroit inférer de ces principes que la pulmonie héréditaire dépend uniquement de la disposition des organes à contracter cette maladie. Elle provient souvent de la disposition des organes, il est vrai, mais les vices des liquides en sont une des principales causes.

La semence & le lait sont les vrais principes, ou les premières causes des maladies héréditaires, selon Hyppocrate; la semence & le lait sont des fluides: on doit donc leur donner quelque part dans le principe de ces maladies. Les parties solides de nos corps sont formées de la semence, du lait, du suc nourricier; peut-on avec quelque vraisemblance dépouiller ces liquides des propriétés que les solides n'ont acquises que parce qu'ils sont formés & accrus de leur propre substance?

Le système des œufs dans la génération, qui est le seul que la raison adopte, ne sauroit donner la moindre apparence d'exclusion à cette vérité. Les œufs dans les ovaires sont formés d'un fluide ; c'est de ce fluide que proviennent les parties membraneuses qui en font la forme. Ces parties membraneuses ne sont elles-mêmes qu'un fluide qui se condense. Si l'on comprime légèrement entre deux doigts un œuf de femme qui ne soit pas fécondé, il n'en résulte qu'une simple humeur aqueuse, dans laquelle on ne distingue pas même des linéamens de parties solides.

On fait que les œufs ne sont fécondés que par la partie la plus volatile de la semence qui est le seul agent de la fécondation. Si c'est par cette partie volatile que se communiquent les maladies héréditaires, comment pourroit-on attribuer les effets de cette communication à la simple disposition des parties solides ? Ce qui provient d'un principe en retient toujours le caractère.

Les fluides qui concourent au développement & à la croissance des viscères & des autres parties du corps, ne changent pas les qualités de la semence, au contraire ils les contractent eux-mêmes, comme il est démontré par la propagation des maladies héréditaires.

Les difformités du corps quand elles sont héréditaires, donnent occasion à des Phthysies pulmonaires lorsqu'elles gênent les fonctions des poumons au point de donner lieu à ces maladies ; dans ce cas

elles dépendent de ces infirmités & ne peuvent être considérées comme Phthifies héréditaires.

J'ai observé , dans mon traité d'observations de médecine , que les maladies héréditaires qui dépendent des liquides , ne se manifestent ordinairement qu'après la diminution de la seve primordiale qui fait l'accroissement des viscères & des parties de nos corps. Dans l'enfance tout est pénétré de cette seve : c'est un suc mucilagineux confondu avec les principes les plus fins, les plus divisés de la masse des liquides , qui enduit les linéamens les plus insensibles des solides, les nourrit, les accroit & les conduit à leur perfection.

Lorsque toutes les parties du corps & les viscères sont parvenus à leur croissance naturelle, que leurs vaisseaux sont développés , que les solides ont pris un ton affermi, l'ouvrage de la nature est parfait ; il faut alors moins de nourriture, moins de substance mucilagineuse pour les entretenir, qu'il n'en falloit pour les accroître & les nourrir.

C'est principalement à cette époque, à l'âge de dix-huit ans, à la fleur de la jeunesse que le vice héréditaire commence à se développer & que par une espece de contagion qui lui est propre , il accomplit insensiblement le développement de sa qualité primitive dans la masse des liquides & dans le système des solides. Ce sont autant de sources de goutte chez les uns, de calcul ou d'écrouelles chez les autres ; de scorbut ou de vérole chez ceux-ci, chez ceux-là de Phthifies pulmonaires, &c.

On ne doit prendre ce que je viens d'observer que comme une règle générale susceptible d'exceptions ; il est des enfans au berceau qui périssent par une suite des vices de leurs peres ; on en voit dans l'adolescence qui subissent le même sort, & d'autres qui en éludent les effets dans tous les âges.

On doit encore observer que les vices héréditaires se portent selon leur nature sur les mêmes parties ; sur les mêmes viscères , ou qu'ils affectent généralement tout le corps ; la goutte , par exemple , se fixe principalement aux articulations ; la pulmonie aux poumons ; les écrouelles , le scorbut , la vérole intéressent généralement la masse des liquides & le système des solides : ces maladies , chacune dans son genre , sont toujours chez les enfans qui en sont affligés , telles qu'elles étoient chez leurs peres. Cependant les vices héréditaires s'éteignent avec l'âge , ou ils dégèrent. Je connois une contrée qui étoit habitée par une cour galante , il y a près de deux siècles. La plupart des descendans des familles qui existoient alors dans cette contrée , sont encore aujourd'hui affectés de vices scrophuleux qui ont succédé à des vices vénériens. On a vu au contraire , les pulmonies s'éteindre totalement dans les familles , & ordinairement parmi les enfans des mêmes peres , il en est qui n'en sont point affectés.

Lorsque les pulmonies sont primitivement accidentelles , elles ne peuvent pas établir des sources

héréditaires pour les enfans qui sont nés avant l'accident qui les a occasionnées ; ceux qui viennent pendant la maladie en courent le danger.

Les pulmonies héréditaires ne sont pas toujours incurables ; il en est que l'on peut prévenir , & d'autres qui sont susceptibles de guérison. Boerrahaave conserva un héritier unique d'une famille noble dans laquelle cette maladie étoit héréditaire. Wan Swieten a eu sous ses yeux un pareil exemple. Une mere de quatre enfans , dont les freres & les sœurs étoient morts pulmoniques , en perdit trois de la même maladie ; le quatrième évita le sort funeste par les précautions qu'il prit ; il épousa une femme très-robuste ; il en eut plusieurs enfans , il en mourut quelques-uns de maladies ordinaires dans l'enfance , & une fille à la suite de couches après la trentième année de son âge. Il en restoit encore deux très-robustes qui avoient plus de quarante ans lorsque Swieten écrivoit cette observation.

Mlle. de L. S. âgée de 18 ans, dont la mere étoit morte pulmonique , fut prise dans le mois de Juin de l'année 1764 d'une toux sèche avec une sensation d'érailllement à la poitrine , vers les parties moyenne & supérieure du *sternum* ; la toux devint humide vers la fin du mois d'Août de la même année. Peu de tems après on s'aperçut que les crachats étoient purullens. La malade vint à Paris , elle m'appella , je la trouvai avec la fièvre , & avec des signes essentiels d'une Phthisie pulmonaire. Elle commença de faire des re-

medes utiles qui bornerent dans un mois le progrès de la maladie ; tous les symptômes diminuerent & se dissipèrent insensiblement. Mlle. de L. S. jouit depuis ce tems-là d'une santé aussi parfaite que peut le permettre la délicatesse de son tempérament.

Burnet a donné, d'après Cardan, l'observation suivante.

Une jeune fille dont le pere étoit mort d'une Phthisie pulmonaire , fut prise d'un crachement de sang si considérable qu'on désespéroit de sa guérison ; elle avoit une fièvre violente, une grande toux, elle crachoit beaucoup de pus ; cependant elle guérit par les secours de Cardan, qui dit en avoir guéri d'autres par les mêmes moyens.

Un étudiant en médecine d'un tempérament sanguineo-bilieux, naturellement impatient & colere, né d'un pere phthisique, étoit sujet à des toux & des enrouemens, sur-tout pendant les printems & les automnes ; de tems en tems il rendoit par l'expectoration du pus sanguinolent. Il se maria, les symptômes de ses incommodités devinrent plus graves & l'expectoration du pus plus fréquente & plus abondante ; il maigrissoit à vue ; cependant il guérit, ou du moins il fut conservé très-heureusement ; ce sont les termes d'Hoffman qui a donné cette observation.

Hoffman a vu plusieurs exemples de jeunes gens qui étoient nés de parens phthisiques & d'autres qui ne l'étoient point, & qui avec les mêmes dispositions vivoient très-long-tems. Un Médecin

de Silésie , phthisique , se conserva pendant plusieurs années par le moyen d'un régime de vie exact & des remèdes propres à son état. Un Théologien avoit assuré cet auteur que depuis près de trente ans il crachoit tous les jours du pus blanc & fétide , sans que la respiration en fût gênée ; qu'il s'étoit garanti de tout autre accident en observant des précautions nécessaires pour le prévenir.

Une Demoiselle , âgée de 22 ans , dont la sœur étoit morte pulmonique , fut prise , dans l'année 1747 , d'une toux sèche , avec une douleur fixe sous le *sternum* vers le cartillage xiphoïde ; la toux augmenta , elle devint humide , dans deux mois , & la douleur de poitrine portoit entre les omoplates , la fièvre se déclara , les secours périodiques diminuèrent considérablement ; la couleur en étoit changée ; la malade craignoit déjà de subir le sort de sa sœur qui n'étoit pas la seule de sa famille qui eût été atteinte de cette maladie. Elle m'appella à son secours , & elle guérit radicalement ; elle se maria & fit des enfans ; je la vis huit ans après , elle jouissoit d'une santé parfaite. J'ai rapporté cette maladie dans mon traité d'observations ; j'ai donné dans le même ouvrage l'observation de la parfaite guérison D'une dame âgée de 22 ans affligée d'une pulmonie vénérienne très-caractérisée ; j'ai appris depuis l'impression de cet ouvrage que son pere étoit mort avec tous les symptômes d'une Phthisie pulmonaire du même caractère. La dame eut des enfans après sa guérison , elle se porta parfaitement

pendant plusieurs années. Elle mourut d'une fluxion de poitrine occasionnée par une transpiration interceptée à la suite d'un bal où elle avoit passé la nuit : ses enfans occupent aujourd'hui des places distinguées dans le service militaire.

Thomas Maoore anglois eut trois enfans qui moururent de la même maladie , la première année de leur âge ; ils paroissoient d'abord robustes & bien constitués. Ils commençoient à languir dès le premier tems de la dentition ; il leur survenoit une toux & une difficulté de respirer qui faisoient des progrès de jour en jour , leurs têtes grossissoient , leurs extrémités devenoient molles & flasques , les épiphyses des mains & des pieds grossissoient & s'élevoient ; il se formoit des nœuds dans les cartilages des côtes , le ventre se météorisoit , la poitrine , devenoit maigre , & tout le corps tomboit dans l'atrophie : c'étoit un vrai *rachitis*.

Les parens de ces enfans , au désespoir de ne pouvoir pas les conserver , firent ouvrir le dernier mort ; Lassius fut chargé de cette opération.

Cet Auteur trouva le foie & d'autres viscères de l'abdomen plus volumineux qu'ils ne le sont dans l'état naturel. Cependant ils n'étoient pas mal colorés. Les intestins étoient très-dilatés & pleins de vents. Les poumons étoient livides & flétris ; la membrane qui les couvre étoit rude , inégale & parsemée presque dans toute son étendue de tubercules semblables à des verrues. Ces tubercules étoient formés d'une espèce de tartre plâtreux ,

friable comme de la chaux & répandu dans toute la substance des poumons : le cerveau paroissoit infiltré de sérosités.

Ces connoissances des causes de la maladie des trois enfans furent heureuses pour les parens ; ils en eurent plusieurs autres qu'ils préservèrent d'accident funeste ; ils jouirent d'une santé ferme & constante.

C'est sans doute après de pareilles observations qu'un Auteur célèbre a dit , que la pulmonie étoit la compagne fidelle du rachitis ; de sorte que , selon lui , la pulmonie des enfans de peres rachitiques peut être regardée comme héréditaire.

Trois enfans de *Gadius* étoient morts de la même maladie ; Cardan fit l'ouverture du troisieme ; il trouva des pustules , dans le foie , blanches & rondes semblables à des pois chiches ; il en trouva aussi dans les poumons qui en partie étoient oblongues , livides & noirâtres. Avec ces connoissances , on conserva les enfans qui restoient à *Gadius* , par le moyen des remedes adoucissans & humectans. Cardan rapporte cette observation.

CHAPITRE III.

De la Pulmonie contagieuse.

LES maladies contagieuses sont d'une nature propre à se communiquer d'un sujet malade à un sujet sain : cette communication se fait par le moyen des exhalaisons excrémentitielles qui , du corps du

premier , passent dans le corps de l'autre. Ce sont des miasmes qui s'exhalent des malades , par la transpiration , qui se dispersent dans l'atmosphère , s'introduisent par les pores de la peau, ou par l'inspiration de l'air qui en est imbu. Les maladies de cette espèce sont la lepre , la gale , la petite vérole , la rougeole , les maladies vénériennes , les ulcères anciens & sordides , la peste , les charbons , la dysenterie , la Phthisie pulmonaire , &c.

Aristote & Galien sont les premiers qui ont placé la Phthisie dans la classe des maladies contagieuses. La Phthisie pulmonaire , dit Hoffman , est de nature à se multiplier par contagion , comme étant formée par une matière *ulcéreuse* & corrompue. Galien regardoit comme très-dangereux d'habiter avec les Phthisiques , parce que leur respiration putride est inspirée avec l'air & portée dans les poumons des personnes saines qui en contractent la maladie. On prend aussi cette contagion par les chemises , par les habits , par les linges , par les lits qui ont servi aux malades ; mille exemples le confirment. Manger a donné l'observation suivante.

La femme d'un Sénateur mourut d'une Phthisie pulmonaire ; le mari , qui étoit un homme savant , ordonna que l'on mît à part , ses habits , ses linges , ses lits , & tout ce qui lui avoit servi dans sa maladie. Ce Sénateur passa à un second mariage ; il défendit expressément que sa nouvelle épouse se servît de quelque chose que ce fût qui eût appartenu à la première. Malgré cette sage prévoyance , la nouvelle

mariée fut tentée par une espee particuliere de gants qui étoient couverts d'une peau très-riche ; elle s'en para sans faire attention aux inconvénients qui pourroient en résulter , parce que la chose lui plaisoit ; le Sénateur fut du même avis , sans doute par complaisance. Peu de tems après, la Dame commença à tousser , & il s'établit bientôt une Phthisie pulmonaire qui la conduisit au tombeau malgré tous les secours de l'Art.

Il est peu de contrées où la contagion de la pulmonie soit autant redoutée qu'elle l'est en Provence. Dès qu'un Pulmonique est reconnu pour tel , on lui marque son lit , ses draps , le linge de table , le couvert , & tout ce qui est d'un service habituel , dont tout autre que lui ne se sert jamais. Dès qu'il est mort , on demeuille sa chambre , on en gratte les murs & les cloisons , on les crépit à neuf , on lave les pavés & les parquets ; on ne se sert plus de ses lits & de ses linges : souvent on les brûle , ou on les vend après les avoir lessivés plusieurs fois. Si la chambre étoit meublée de tapisseries , on les expose au grand air pendant une année entière. En général on ne se sert de ce qui a servi à l'usage d'un Pulmonique , quelque précaution que l'on ait prise , qu'avec la plus grande répugnance.

Schenkius rapporte l'observation d'un Médecin qui devint phthisique pour avoir flairé les crachats d'un Phthisique. *Riviere* a donné les deux suivantes.

La femme d'un Conseiller à la Cour des Aides mourut phthisique dans le mois de Mai de l'année

1635. Une Garde-malade qui ne la quittoit pas, se trouva incômodée quelque-tems après sa mort, elle tomba dans une fièvre lente, avec une toux sèche qui ne lui permettoit pas de repos; elle étoit déjà très-maigre.

On voit par ces symptômes que cette femme étoit au second degré de pulmonie; cependant elle eut le bonheur de guérir par les secours de l'Art.

Une nourrice, âgée de vingt-deux ans, très-bien constituée, donna le sein à un Abbé phthistique qui mourut de cette maladie; elle devint phthistique & subit le même sort. Une de ses sœurs, âgée de quinze ans, contracta avec elle cette funeste maladie, dont elle eut le bonheur de guérir par les soins de son Médecin.

Chefneau fut appelé par un Gentilhomme âgé de vingt-cinq ans, dont la femme étoit morte pulmonique. Il avoit déjà craché du sang quelque-tems auparavant; cette hémorragie avoit cédé à une saignée; elle n'avoit pas eu des suites sensibles. Cependant, à la première visite du Médecin, il rouffoit, il avoit maigri & son visage étoit pâle. C'étoit une Phthisie au commencement du second degré, prise par contagion, que Chefneau guérit radicalement.

J'étois le Médecin, il y a environ quinze ans, d'une Dame du premier rang, parmi la Noblesse, âgée d'environ soixante ans, qui mourut pulmonique à la suite d'un rhume catharreux, long & rebelle. Un Abbé, âgé d'environ 40 ans, faisoit

tous les jours avec elle quelque partie de piquet, sur une petite table très-étroite, où ils étoient vis-à-vis l'un de l'autre. Peu de tems après la mort de la Dame, l'Abbé fut pris d'une toux sèche qui, dans peu de tems, devint humide & purulente; la fièvre se déclara avec le caractère de fièvre étiq̃ue; la maigreur faisoit des progrès à vue. Je fus appelé, le malade guérit en moins de trois mois.

Malgré la guérison de cette maladie dont il n'existoit plus de symptômes, la poitrine resta toujours délicate; elle l'étoit naturellement dès sa jeunesse; tous les hivers il essuyoit quelque rhume considérable. Sept à huit ans après la guérison de la Phthisie pulmonaire, il devint asthmatique; je le perdis alors de vue; il se retira en Province, où il est mort depuis quelque-tems: je n'ai pas eu occasion de m'informer de la maladie qui a terminé ses jours.

Je publiai un livre d'observations de Médecine, l'année 1771; il y en a principalement sur les Phthisies contagieuses qui ont été guéries, & sur d'autres qui ont éludé les secours de l'Art; il seroit inutile de grossir cet Ouvrage de répétitions, & superflu de les multiplier.

SECTION TROISIEME.

Phthisie pulmonaire provenant d'Hémoptysie ou Crachement de sang, ou bien d'Érosion de la substance des poumons, ou de la dilatation des vaisseaux de ce viscere.

CHAPIRE PREMIER.

Hémoptysie.

L'HÉMOPTYSIE est un crachement de sang qui vient des poumons ou de la trachée-artère; elle a trois causes ou trois sources différentes: l'une est la rupture des vaisseaux sanguins, l'autre l'érosion de ces vaisseaux, la troisième leur dilatation ou anastomose.

La rupture des vaisseaux a toujours quelque cause violente, comme la pléthore sanguine ou quelque accident. L'érosion provient des matières âcres ou caustiques qui détruisent insensiblement les membranes des vaisseaux, les percent & donnent lieu à l'hémorragie. La troisième est occasionnée par la dilatation des vaisseaux lymphatiques dans leurs anastomoses avec les vaisseaux sanguins: ceux-ci étant dilatés par la quantité ou par la raréfaction du sang, ce liquide force le calibre des autres, s'y introduit

introduit & les parcourt jusqu'à ce qu'étant parvenu à leurs extrémités qui aboutissent aux bronches ou à leurs vésicules , il s'y répand & en est rejeté par l'expectoration. Je reprends dans les chapitres suivans ces différens crachemens de sang & leurs effets concernant la Phthisie pulmonaire.

CHAPITRE II.

*Crachement de sang provenant de la rupture des vaisseaux :
Cause de Pulmonie.*

J'AI déjà fait connoître le danger auquel les poumons sont exposés par la grande quantité de sang qu'ils reçoivent de l'oreillette droite du cœur & par l'action alternative & perpétuelle de l'air sur leur substance délicate & susceptible des moindres impressions. D'après ces connoissances , on ne sera pas surpris que ce viscere soit souvent affecté d'incommodités & de maladies toujours dangereuses & souvent mortelles.

L'hémophthisie qui provient de la rupture des vaisseaux menace toujours de Phthisie pulmonaire : on connoît combien cette maladie est fréquente & redoutable. Une pléthore sanguine , une raréfaction considérable du sang , des coups reçus sur la poitrine , des chûtes , des fardeaux trop pesans , des courses rapides , des toux violentes , des ris immodérés , des excès dans l'exercice de la voix , dans la déclamation , dans le chant , des cris forts , le jeu

des instrumens à vent par le moyen du soufflé , des engorgemens dans les viscères du bas ventre , des suppressions d'évacuations naturelles ou habituelles , telles que celles des hémorrhoides , des secours périodiques des femmes , des vuidanges , des vieux ulcères , des obstacles de quelque nature qu'ils soient , qui gênent , qui retardent ou qui suspendent la circulation du sang dans quelqu'un des vaisseaux de poumons , donnent lieu à l'hémophthisie. C'est-là le commencement d'une Phthisie pulmonaire , si l'on n'emploie à propos des moyens efficaces pour la prévenir.

L'hémophthisie est presque toujours précédée de signes qui l'annoncent ; ce sont une gêne dans la respiration , un sentiment d'ardeur & d'érailllement dans quelque partie de la poitrine , une toux plus ou moins forte , selon la conséquence de l'engorgement des vaisseaux pulmonaires.

Si le crachement de sang est produit par la rupture de quelque vaisseau considérable , il peut se répandre une si grande quantité de ce liquide dans les bronches & dans leurs cellules , que l'air ne pouvant plus y pénétrer , le jeu de la respiration diminue ou s'éteint ; le malade est en danger ou il meurt subitement. S'il a le bonheur de survivre à cet accident , il court le risque d'une pulmonie souvent incurable. Si le sang provient du déchirement de quelques vaisseaux capillaires , il y a lieu de craindre que leurs plaies ne dégénèrent en de petits ulcères & qu'il ne s'en suive une Phthisie pulmonaire , toujours dangereuse & souvent mortelle.

Le sang dans l'hémophthisie, provient de la trachée-artère, des poumons ou de l'intérieur du thorax ; il est toujours précédé de la toux. Lorsqu'il vient de la trachée-artère, il est clair, un peu écumeux, la toux est très-légère ; on ressent dans ce canal une douleur fourde, peu incommode. Celui qui vient des vésicules orbiculaires des poumons est divisé, plus écumeux & d'une couleur vermeille ; on l'expectore tout de suite & sans douleur : celui de l'intérieur des poumons est plus abondant, moins écumeux & moins coloré que celui qui part des vésicules : la toux qui précède l'expectoration est assez forte, quelquefois violente, & les malades ressentent une impression qui n'est point douloureuse, vers la partie d'où partent les crachats. Si le sang provient de l'intérieur du thorax, il est livide, noirâtre & très-altéré : la toux est fréquente & très-forte, on ressent alors une douleur dans l'intérieur de la poitrine.

La rupture des artères fournit un sang plus abondant, plus vis & plus clair que ne l'est celui des veines, qui est toujours plus dense & d'une couleur plus foncée que celui des artères.

Le crachement de sang qui provient de la rupture des vaisseaux, laisse toujours une plaie après lui. Cette plaie s'enflamme ordinairement, l'inflammation donne la fièvre, la plaie suppure enfin & forme un ulcère qui s'accroît insensiblement & devient la source des symptômes d'une Phthisie pulmonaire qui parcourt tous ses degrés & devient funeste, plutôt ou plus tard, selon ses progrès. C'est la

marche ordinaire de cette maladie , principalement lorsqu'elle provient d'une hémophthisie considérable. Cependant si par les secours de l'art on est assez heureux de prévenir ou de modérer l'inflammation des vaisseaux déchirés , la plaie guérit , sans qu'il s'y forme d'ulcere. S'il s'y en forme , il faut observer la qualité du pus , s'il est louable & en petite quantité , l'ulcere se cicatrise ordinairement , pourvu qu'on seconde la nature à propos & qu'on ne commette pas d'imprudencce avant une entiere guérison. Si au contraire le pus est de mauvaise qualité , on est autorisé à soupçonner un vice étranger dans la masse des liquides , auquel il est essentiel de remédier en même temps que l'on s'occupe de la guérison de l'ulcere , sans quoi l'on ne sauroit déterger celui-ci , ni par conséquent le cicatrifer.

Lorsque l'hémorrhagie provient de la déchirure de petits vaisseaux , elle est moins considérable , les symptômes en sont moins alarmans , & l'on trouve moins de difficulté à y remédier. Si l'on ne peut éviter que la plaie dégénere en ulcere , il restera toujours des espérances de guérison , pourvu que le sang ne soit pas altéré de quelque vice étranger. C'est un cas , je l'avoue toujours alarmant ; cependant si ce vice est susceptible de guérison , on peut tout espérer des ressources de la nature & de celles de l'art ; celles-ci y sont toujours essentielles ; car dans de telles circonstances , celles de la nature ne sont jamais assez énergiques pour y remédier efficacement.

Il arrive quelquefois qu'à la fin d'une hémophthi-

sie , il reste du sang grumelé entre les levres de la plaie ; il s'y corrompt , y fait des erosions , des inflammations , y forme des ulceres & décide la Phthisie. Un sang grumelé retenu dans les bronches , peut être suivi des mêmes accidens ; ce fluide se corrompt aisément quand il est extravasé dans un lieu chaud & humide , sur-tout si l'air de l'atmosphère peut y pénétrer.

La fièvre diminue ou cesse à mesure que la phlogose ou l'inflammation se dissipent ; le malade se croit guéri ; dans cette confiance , il reprend sa façon de vivre ordinaire ; quelquefois il commet des abus ou se livre à des excès dont souvent il est la victime. Il survient une petite toux , qui d'abord ne paroît pas de conséquence ; elle fait cependant des progrès , les malades ressentent une impression douloureuse vers l'endroit de la poitrine où est le vice local : La toux devient plus fréquente & plus forte , on apperçoit du pus mêlé avec les crachats , il s'établit une fièvre étique , avec tous les symptômes qui caractérisent une Phthisie pulmonaire.

Les hémophthísies qui proviennent d'accidens extérieurs , de coups , de chûtes , d'efforts , &c. sont moins à craindre que celles qui dépendent de causes internes ; il est assez ordinaire que les premières n'aient pas de suites fâcheuses , quand on a l'attention d'en prévenir le danger , par des secours donnés à propos.

Ingrassias guérit une femme qui étoit devenue phthisique à la suite d'un crachement de sang consi-

dérable; elle avoit déjà maigri, elle crachoit du pus fétide & en expectoroit de suite tous les quinze jours, environ quatre livres. Cette observation est rapportée par Burnet.

Une femme âgée de vingt-deux ans fut prise d'un crachement de sang, à la suite d'une fatigue excessive; on fit cesser, sans doute, cette hémophthisie, dit Hoffman, avec des remèdes astringens. Il succéda au crachement de sang une grande oppression, & un extrême abattement des forces. La malade étoit accablée d'ailleurs d'une toux continuelle suivie de crachats purulens, mucueux & sanguinolens. Elle avoit un dégoût général pour les alimens; la chaleur fébrile faisoit des progrès, & la fréquence du pouls augmentoit aux heures de la digestion. La malade étoit dans cet état déplorable, lorsqu'elle eut recours à Hoffman, qui a donné cette observation; ce médecin lui prescrivit des remèdes si à propos, que quelque tems après elle lui écrivit pour le remercier du succès heureux qu'elle en avoit obtenu.

Un jeune homme fut pris tout à coup d'un crachement de sang, on mit en usage les remèdes convenables à sa guérison; il n'étoit plus question de cet accident, le malade se croyoit lui-même à l'abri de rechûte, lorsqu'il se trouva pris d'une Phthisie pulmonaire qui le conduisit au tombeau.

Une femme-de-chambre, âgée d'environ vingt-cinq ans, essuya une hémorrhagie considérable dans le mois de Décembre de l'année 1767; il lui en resta une toux humide pendant l'hiver; ses crachats,

disoit-elle , n'étoient purulens que de loin en loin. Je la vis pour la premiere fois dans le mois de Mars de l'année 1768. Elle rendoit tous les matins des crachats mucueux , mêlés d'un pus fétide ; de tems en tems , ils étoient sanguinolens. Elle avoit tous les symptômes d'une fièvre lente , elle maigrissoit & se plaignoit d'une sensation d'érailllement dans la poitrine vers la partie moyenne du sternum. Elle n'avoit encore ni diarrhée , ni sueurs colliquatives. Je lui donnai , pour la tranquilliser , des espérances sur son état , qui furent confirmées par une guérison parfaite. Elle se maria trois ans après qu'elle fut rétablie de sa maladie ; elle jouit encore aujourd'hui des avantages d'une santé constante.

Mademoiselle de L... âgée d'environ quarante ans , d'un tempérament robuste , & qui avoit toujours joui d'une bonne santé , fut prise tout à coup , dans le mois de Décembre de l'année 1780 , d'un crachement de sang très-considérable , qui fut suivi d'une fièvre continue qui ne céda que vers le quinzième jour de la maladie. A l'hémorrhagie succéda une toux vive & fréquente qui ne diminua pas , même avec la fièvre ; les crachats étoient rouillés & purulens ; la malade avoit perdu le sommeil.

Ces symptômes se modérèrent dans le mois de Janvier suivant ; cependant la toux continuoit toujours & les crachats étoient rouillés , pour ne pas dire purulens ; il lui survenoit de tems en tems des hémophthies qui lui donnoient de vives alarmes. Je fus appelé le six du mois de Février de l'année 1781.

Je la trouvai avec une fièvre lente, une toux fréquente & importune, une voix rauque & cassée, elle rendoit du vrai pus dans ses crachats, & sa maigreur augmentoit de plus en plus. Je la rassurai, elle devint moins alarmée sur son état; elle suivit scrupuleusement le régime de vie que je lui prescrivis, & fit usage avec exactitude des remèdes que je lui conseillai; elle parvint enfin à ne plus tousser & à ne plus cracher du pus; il ne fut plus question de fièvre lente, & sa voix se rétablit telle qu'elle étoit dans sa meilleure santé.

Un homme de confiance de la maison de M. de Mar..., d'un tempérament très-délicat, me consulta dans le mois de Septembre de l'année 1779, il avoit déjà craché du sang deux ou trois fois en différens tems; la dernière fois il y avoit près de trois semaines, la fièvre avoit succédé à l'hémorrhagie; depuis ce moment, ses crachats étoient toujours rouillés & il maigrissoit à vue: c'est le narré que le malade me fit de sa maladie. Je lui trouvai de la fièvre, la toux n'étoit point vive, mais fréquente, les crachats étoient purulens sur-tout ceux de la nuit & du matin. Je suivis cette maladie avec exactitude: après deux mois d'usage de remèdes, tous les symptômes se modérèrent; ils se dissipèrent enfin, & sa santé se rétablit totalement au commencement de l'année 1780; il en a joui jusques aujourd'hui sans interruption.

Madame S... de Grenoble, âgée de trente-quatre ans, qui avoit joui jusqu'à cette époque des avan-

rages d'un excellent tempérament, fut affectée d'un grand chagrin dans le mois de Janvier de l'année 1762, auquel succéda une toux sèche & une fièvre avec un point au côté droit de la poitrine, qui l'empêcha pendant six semaines de se coucher sur pas un des côtés. La fièvre ne céda que vers le trente-sixième jour de la maladie ; il lui succéda un dépôt à l'avant bras du même côté, qui ne s'ouvrit que long-tems après ; il suppurait encore lorsqu'on me consulta au mois de Mai 1764. Les regles n'avoient pas paru dans leur tems ; elles ne parurent pas le mois ensuite ; il survint un crachement de sang abondant qui dura quatre jours, durée ordinaire des regles ; le crachement de sang suppléa à celles-ci pendant cinq mois. Ce sang provenoit vraisemblablement de la partie supérieure droite de la poitrine, vers la troisième des vraies côtes près du sternum, où la malade ressentoit une douleur ou un point qu'on auroit couvert avec un liard & que le tact sembloit augmenter. La toux subsistoit toujours, mais elle étoit plus fréquente & plus forte dans les intervalles des hémophthies.

Après cinq mois d'une suspension totale, les regles reparurent, mais peu abondantes ; le crachement de sang diminuoit dans les tems périodiques à proportion que l'écoulement des regles se rapprochoit de la quantité ordinaire. La toux devint plus fréquente & plus forte dans les intervalles des périodes, les crachats étoient purulens, la maigreur étoit déjà considérable & faisoit des progrès. La

douleur de la poitrine avoit diminué , mais à la diminution près , elle restoit toujours la même ; la malade avoit peu de sommeil & ressentoit des douleurs sourdes dans tous ses membres.

Tel étoit l'état de la malade lorsqu'elle me consulta par écrit , pour la première fois. Elle fit exactement usage des remèdes que je lui proposai dans ma consultation , que le médecin ordinaire dirigea avec prudence ; ils eurent tout le succès que raisonnablement on pouvoit en désirer. M^{de}. de S. fut en état de faire le voyage de Paris vers la fin du printemps de l'année 1765 ; elle crachoit encore du pus ; elle continua l'usage des remèdes ; il s'établit un flux hémorroïdal très-moderé , qui eut lieu deux fois pendant son séjour dans la capitale ; cet écoulement diminua tout ce qu'il restoit des symptômes de la maladie , au point que la malade se retira dans sa patrie, très-satisfaite de la situation où elle se trouvoit, qui lui donnoit des espérances non équivoques d'un parfait rétablissement , qu'elle obtint peu de temps après selon son attente.

La qualité du sang rendu par les voies de l'expectoration , dont la couleur étoit d'un rouge brun foncé, d'une consistance plus dense que la consistance ordinaire de ce fluide ; la douleur circonscrite , vers la troisième des vraies côtes ; la sensation que M^{de}. de S. y éprouvoit par le tact, &c. m'autoriserent à soupçonner & même à établir que le vice local existoit dans la membrane intérieure des côtes. De telles maladies sont très-rares ; sur plus de quatre-

vingt-dix ouvertures de corps de pulmoniques que Burnet a faites, il avoue qu'il n'en a trouvé qu'une seule de cette espèce, c'est-à-dire, qui provient d'ulceres à la membrane intérieure des côtes.

C H A P I T R E I I I.

Crachement de sang & Ulceres provenant d'Érosions des vaisseaux des poumons : Cause de pulmonie

LES érosions des poumons d'où vient l'hémophthisie sont de légères solutions de continuité des parties de ce viscere, formées par des humeurs âcres & corrosives; la suppuration de ces érosions, établit des ulceres, commence & accomplit la Phthisie pulmonaire. Le crachement de sang qui en provient, est moins abondant, & se fait plus lentement, que celui des vaisseaux rompus; c'est par cette différence que l'on connoît si l'hémophthisie est l'effet de la rupture ou de l'érosion des vaisseaux.

Les ulceres des poumons sont précédés par la toux; cette toux differe de la catharreuse, en ce qu'elle est sèche dans son premier tems & que quelquefois elle reste telle pendant des années, avant qu'il se manifeste d'autres symptômes de pulmonie.

La toux phthisque est l'effet d'une humeur lymphatique, ou d'une lymphe mal saine, âcre, irritante, fournie par la masse du sang aux parties glanduleuses des poumons, où elle fait des érosions

qui irritent les bronches & provoquent la toux par des titillations continuelles. Les ulcères se forment à la suite de la corrosion des glandes & des vaisseaux, le sang s'échape & passe dans les bronches, il est rejeté par l'expectoration; les ulcères s'accroissent insensiblement & la Phthisie s'accomplit.

La toux catharreuse est humide dès le commencement de la maladie; elle est terminée dans quelques jours, ou dans quelques semaines: elle commence souvent par des chatouillemens à la gorge, des siffemens & par une gêne à la respiration. Il s'écoule par les narines une lymphe âcre, & ensuite, par la toux des crachats qui, par leur couleur, leur consistance & par d'autres signes, ressemblent à du pus. Malgré ces symptômes, si les malades ne maigrissent point, ils ne peuvent être regardés comme Phthisiques. Cependant si l'humeur est toujours âcre, si elle dure long-tems; si la toux est forte & fréquente, les poumons en sont fatigués, il s'y fait des érosions, il s'y forme des ulcères & il en survient des hémophthisies; de sorte que, cette toux, de catharreuse qu'elle étoit, devient enfin pulmonaire & phthistique.

On a toujours regardé les catharres comme très-propres à causer la phthisie, lorsqu'ils intéressent la substance des poumons; les humeurs âcres qui dans le rhume, se portent dans ce viscère & y séjournent, le corrodent insensiblement, d'autant mieux que ses glandes & ses membranes délicates, sont très-susceptibles d'érosions.

En général, on crache du sang au commencement de la Phthisie qui provient d'érosions des vaisseaux; cependant Galien a observé qu'il meurt quelquefois des Phthisiques sans en avoir craché. Cette observation de Galien est confirmée par l'expérience de tous les jours : ces malades, ajoute Galien, crachent d'abord des matieres jaunâtres qui ne sont point âcres, ensuite du pus & des *particules* des poumons. Galien s'est trompé dans cette particularité, de même que ceux de ses sectateurs qui ont cru que ces prétendues particules étoient des portions de vaisseaux. Ruisch a démontré que ce ne sont au contraire que des concrétions polypeuses, & non pas des portions de vaisseaux, ce qui ne sauroit être, puisqu'on n'y découvre ni calibres, ni cavités. Ces concrétions polypeuses en se multipliant, gênent, retardent ou suspendent la distribution de la lymphe, déchirent les vaisseaux, sans intéresser assez particulièrement ceux du sang pour causer des hémoptysies. Ruisch conservoit dans son cabinet une portion de poumon, où il y avoit un gros calcul & d'autres plus petits. Il n'y a de différence entre les concrétions polypeuses & ces calculs, qu'en leur dureté, qui est un effet du plus ou du moins de séjour de ces concrétions dans la substance pulmonaire : j'en donnerai d'autres exemples en traitant des tubercules.

Quelquefois dans l'hémoptysie, il s'épanche du sang dans la membrane cellulaire des poumons qui est intermédiaire entre les vésicules bronchiques.

Ce sang extravasé dans un lieu chaud & humide se corrompt promptement & se convertit en une sanie âcre qui corrode les parties voisines, les enflamme, forme des ulceres & établit la suppuration. C'est une nouvelle cause de Phthisie pulmonaire qui peut avoir également lieu à la suite de la rupture des vaisseaux & de leur érosion. Dans ce cas on peut mourir Phthisique sans avoir craché du sang ni du pus, parce que des humeurs extravasées dans la membrane cellulaire ne sauroient pénétrer dans le calibre des bronches que par l'érosion de leurs membranes qui souvent n'a pas lieu dans cette espece de suppuration.

On voit quelquefois, en différens sujets, des expectorations longues & copieuses de matieres féreuses & bilieuses, qui finissent par des Phthisies pulmonaires; on n'est exposé à ces accidens, pour l'ordinaire, que lorsqu'il s'y joint des rhumes catharreux, ou que l'expectoration habituelle diminue ou se supprime; dans les deux premiers cas, la maladie est dangereuse; dans le troisieme, elle est mortelle.

J'ai vu des malades d'un âge avancé qui étoient sujets à des expectorations abondantes & habituelles, cracher, sur-tout pendant la fièvre, du chyle que l'on prenoit mal-à-propos pour du pus. Le chyle passe dans les poumons sans être décomposé ou purifié: ce viscere, après de longues & abondantes expectorations, ne peut être que dans une espece d'épuisement; ses pores, ou les extrémités de ses vaisseaux capil-

lares lymphatiques , en sont relâchés ; il n'est pas surprenant que le chyle pénètre dans les bronches avec les crachats , & qu'il donne l'idée d'une fausse suppuration : il est permis au peuple de prendre pour du pus cette prétendue suppuration ; mais les Médecins ne doivent pas s'y tromper.

Il est des Phthysies qui proviennent de différentes maladies dont elles ne sont que des symptômes ; telles sont celles qui surviennent à des sujets atteints de vices vénériens , scorbutiques , scrophuleux , &c. Il en est d'autres qui prennent leur origine de ces causes compliquées : ces Phthysies sont susceptibles de guérison , si l'on remédie à propos aux maladies principales desquelles elles dérivent.

Hippocrate a observé que toutes les ulcérations peuvent devenir nuisibles aux poumons , sur-tout les aphthes qui surviennent à la bouche & à la trachée-artère. Ces aphthes ont chacune au milieu une tache blanche ou jaunâtre ; la circonférence en est enflammée , avec rougeur & douleur. Lorsqu'elles sont simples & qu'elles ne proviennent pas d'un vice des liquides , elles guérissent aisément ; si au contraire elles en dépendent , elles dégénèrent en ulcères rongeurs , qui rendent une odeur fétide & se communiquent à la substance des poumons. Dans cet état , il survient une fièvre lente ; on ressent une douleur au milieu de la poitrine , & des démangeaisons à la peau : on rend des crachats liquides , divisés & de mauvaise odeur ; on maigrit , sur-tout de la poitrine , des extrémités supérieures ,

& successivement de tout le corps; on éprouve enfin tous les symptômes du dernier degré de Phthisie.

Lorsque des aphthes de cette nature infectent la bouche, elle est toujours pleine de salive; la voix devient rauque & la déglutition difficile. Celle-ci se supprime & l'autre s'éteint par degrés, à mesure que les ulcères font des progrès, dans les muscles de la gorge, dans le canal de la trachée-artère & vers la substance des poumons.

Je fus appelé, il y a environ douze ans, par une Dame respectable, d'une famille distinguée, âgée de soixante ans; je la trouvai avec une fièvre lente, & des aphthes à la bouche qui me parurent d'abord d'une mauvaise nature. Comme elles éluoient les secours de l'Art, je lui demandai quelques jours après, s'il n'y auroit pas quelque cause étrangère qui pût concourir à leur progrès, & à augmenter leur fétidité? La malade m'avoua que depuis huit ans elle portoit un cancer à l'un des seins, qui s'étoit ouvert depuis environ trois mois. J'examinai ce cancer, il avoit déjà rongé le sein jusqu'aux côtes; il y avoit d'ailleurs sur le même côté de la poitrine un nombre de petites glandes cancéreuses qui s'étendoient jusques aux maxillaires. Il en auroit fallu bien moins pour désespérer de la guérison des ulcères de la bouche; aussi firent-ils des progrès si rapides qu'à, dans quinze jours, la malade perdit la parole & la possibilité de la déglutition.

Un Officier des Troupes du Roi, âgé de 55 ans, me consulta dans le mois de Mai de l'année 1780,
pour

pour un ulcère à la partie latérale gauche de la langue, de la longueur d'environ un pouce, & de la largeur de cinq à six lignes. Après avoir reconnu cet ulcère, j'examinai le voile du palais, les amigdales, la luette & l'arrière-gorge ; toutes ces parties étoient parsemées d'aphthes qui rendoient la voix rauque & gênoient la déglutition. Les gencives étoient pâles, gonflées & presque toujours saignantes ; le sang qui en sortoit étoit noirâtre & fétide ; le pouls étoit misérable, & la foiblesse extrême.

Selon le narré que le malade m'avoit fait de sa maladie & de ce qui l'avoit précédée, je n'appercevois qu'une affection scorbutique, ou un véritable scorbut, d'autant mieux qu'il avoit beaucoup voyagé sur mer, & séjourné pendant quelques années en Amérique dans un climat mal-sain.

Quelque-tems après, il m'avoua qu'il avoit essuyé depuis quinze ans, plusieurs maladies vénériennes, dont il avoit été mal traité, sur-tout lorsqu'il avoit été obligé de faire usage de mercure. Que depuis ce tems-là il avoit toujours eu quelque incommodité, & sur-tout des dartres & d'autres éruptions à la peau. Je soupçonnai alors une double cause de ces ulcères ; je fis allier les remèdes antivénériens avec les antiscorbutiques, dont, depuis quelques jours, il avoit commencé l'usage. Il étoit trop tard, peu de tems après, la voix s'éteignit totalement & la déglutition se supprima. Ce malade respectable par ses connoissances & ses vertus militaires, succomba à une maladie compliquée, dont il auroit

obtenu la guérison , s'il s'étoit procuré à tems des secours utiles.

Galien, Aétius & d'autres observateurs parmi les anciens Médecins , ont guéri des aphthes & des ulcères à la bouche , au larynx & à la trachée-artère ; il en est aussi parmi les modernes qui ont eu les mêmes succès. J'en ai guéri un nombre de malades , quand les aphthes & les ulcères ont été simples , mais moins quand ils ont été compliqués , parce que la plupart ne m'ont appelé que dans un état désespéré.

Avicene & Sennert observent que les ulcères extérieurs de la trachée-artère guérissent , sur-tout quand ils sont placés entre les anneaux cartilagineux de ce canal , & qu'ils sont très-difficiles à guérir lorsqu'ils sont dans l'intérieur. Les remèdes alors coulent dans le canal sans s'arrêter sur les ulcères , & on ne peut expectorer le pus qu'ils rendent qu'à la faveur de la toux qui les déchire de plus en plus & met par-là des obstacles à ce qu'ils se cicatrisent. La guérison de ces ulcères intérieurs est au-dessus des ressources de l'art , lorsqu'ils sont profonds & qu'ils dépendent de causes compliquées.

L'hémophthisie qui est un effet de l'érosion des vaisseaux est plus dangereuse & plus difficile à guérir que celle qui provient de leur rupture ; dans celle-ci les levres de la plaie se touchent , leur réunion n'est pas difficile lorsqu'il n'y a pas d'obstacle qui s'y oppose ; dans l'autre au contraire il y a une solution de continuité , à laquelle la seule nature peut remédier par la régénération des chairs qui sont détruites :

D'ailleurs de tels ulcères sont presque toujours des effets d'un vice de la masse des liquides, auquel il faut remédier avant qu'il soit permis d'espérer qu'ils puissent se cicatrifer.

On doit porter un même jugement sur les ulcères des poumons : quand ils ne proviennent pas d'un vice de la masse des liquides on les guérit ; quand ils en proviennent, on les guérit souvent, pourvu que ce vice soit susceptible de guérison & qu'on s'y prenne assez à tems pour y remédier, autrement on ne les guérit pas.

Une femme souffroit depuis quelques années d'une espèce d'humeur catharreuse, qui fatiguoit sa poitrine ; des Médecins de réputation lui firent des remèdes sans succès : elle s'adressa à des empiriques qui échouèrent également dans la cure de cette maladie, qu'on regarda enfin comme désespérée. La malade rendoit par les voies de l'expectoration beaucoup de pus & de sang ; elle étoit exténuée, étique & d'une foiblesse extrême. *Hildan* fut appelé à son secours ; il la guérit à la grande surprise de ceux qui la connoissoient. Elle se rétablit si parfaitement de sa maladie, qu'elle fit ensuite plusieurs enfans ; elle n'en avoit pas eu auparavant. *Burnet* rapporte cette observation.

Riviere a guéri des phthysies désespérées ; il fait mention de plusieurs Médecins célèbres qui en ont guéri avant lui, *Montanus*, par exemple, *Valeriola*, *Forestus*, *Tralian*, *Cardan*, *Arceus*, *Ingrassias*, *Fracastor*, *Eraslus*, *Avensoar*, *Valescus de Tarente*, &c.

Une Demoiselle âgée de vingt-cinq ans , d'un tempérament bilieux , souffroit depuis quelques mois d'un rhume considérable qui provenoit d'une humeur qui se portoit sur les poumons ; elle touffoit nuit & jour , au point de lui causer des douleurs de poitrine & des insomniés presque continuelles ; elle étoit d'une maigreur générale entretenue par une fièvre lente , &c. Cette maladie étoit regardée comme incurable , on croyoit même que la fin en étoit prochaine ; cependant Riviere la guérit.

Un célèbre Marchand de Londres éprouvoit tous les symptômes d'un ulcere au poumon gauche ; cet ulcere étoit une suite d'érosions de la partie de la trachée-artère qui s'insere dans ce lobe ; ces vices du poumon & de la trachée-artère provenoient d'humeurs âcres qui avoient fait des érosions dans ces parties délicates ; ils faisoient tous les jours des progrès sensibles : le malade en guérit par le moyen de vapeurs qu'on lui fit inspirer.

Lorsque ce Marchand fut assuré de sa guérison , il partit pour l'Espagne ; sa santé s'y soutint pendant six ans. Comme il revenoit en Angleterre pendant l'automne , il se forma un abcès dans la poitrine dont le pus se répandit dans tout le lobe qui étoit adhérent aux côtes ; les bronches en furent engorgées au point que l'air ne pouvant plus y pénétrer , le malade expira.

On fit l'ouverture du corps ; on trouva une cicatrice variqueuse à la partie de la trachée-artère , qui avoit été corrodée ; la partie qui étoit adhérente au

lobe étoit calleuse & le reste du poumon corrompu. Bonnet a donné cette observation.

Une femme âgée de quarante-six ans, d'un tempérament robuste, fut prise d'un gros rhume pendant l'hiver de l'année 1745 ; un mois après elle perdit le sommeil, les crachats devinrent jaunâtres, la toux augmenta, il survint une douleur à la poitrine, elle cracha du sang, la fièvre se mit de la partie ; les crachats devinrent purulens, il s'établissoit déjà des sueurs nocturnes. Outre ces symptômes, la malade souffroit tous les matins d'un poids considérable à la poitrine, qui ne cessoit qu'après avoir expectoré beaucoup de pus & environ une livre de lymphe écumeuse. J'inférai de ces symptômes qu'il s'étoit fait dans les poumons une perte de substance, causée par des ulcères qui en détruisant les cellules bronchiques, avoient formé une espece de lac ; que le pus & cette grande quantité de sérosités provenoient des bouts ouverts des vaisseaux lymphatiques qui aboutissoient à cette cavité extraordinaire. Malgré le danger que présentoient tous ces symptômes, la malade guérit parfaitement. J'ai rapporté cette maladie & plusieurs autres de la même classe dans mon livre d'observations sur la phthisie, & principalement sur la pulmonaire.

Un jeune homme, d'une maison distinguée, âgé de seize ans, d'un tempérament précoce, vif & emporté, s'étoit livré depuis deux ans à des abus si excessifs qu'il lui en survint une toux phthisique qu'on regarda d'abord comme un simple rhume.

La toux fit des progrès ; six semaines après la date de ce prétendu rhume , le malade commença à cracher du pus ; tous les symptômes ordinaires d'une Phthisie pulmonaire , se déclarerent très-rapidement. Le Médecin de la maison suivit cette maladie pendant environ six mois , il devint malade lui-même & le jeune homme me fut confié.

A la premiere visite , dans le mois de Mai 1773 , je le trouvai d'une grande maigreur , ses crachats étoient du vrai pus & sanguinolens ; la fièvre lente étoit très-caractérisée , avec des exacerbations tous les jours dans l'après-midi. La peau étoit sèche & brûlante pendant le jour & humide pendant la nuit ; le malade dépérissoit à vue , & l'on désespéroit de sa guérison. Je changeai sa façon de vivre , je fis cesser l'usage du lait auquel on donnoit une entière confiance , & que j'ai toujours regardé comme pernicieux dans la pulmonie , avec fièvre & suppuration. Ce malade guérit enfin si parfaitement , qu'il jouit encore aujourd'hui d'une santé parfaite.

CHAPITRE IV.

*Crachement de Sang par la dilatation des vaisseaux :
Cause de Pulmonie.*

IL est rare qu'il survienne de pulmonie à la suite d'une hémophthisie occasionnée par une simple dilatation des vaisseaux ; cependant comme un crachement de sang de cette nature peut y donner lieu , &

que d'ailleurs il est quelquefois l'effet de phénomènes particuliers, très-intéressans, il est essentiel de le faire connoître.

Les vaisseaux qui servent à la circulation de la masse des liquides tant dans les poumons que dans les autres viscères & dans toutes les parties du corps se divisent & se subdivisent en une infinité de ramifications. Les calibres des artères diminuent à mesure que leurs branches se multiplient ; le sang rouge coule dans celles-ci, autant que leurs calibres peuvent l'admettre ; comme il est dense de sa nature il ne peut s'insinuer naturellement dans les calibres dont le diamètre est trop étroit pour le recevoir ; à peine sont-ils alors sensibles au microscope. La lymphe qui est la partie la plus séreuse, la plus divisée de ce liquide, se sépare de sa masse pour établir une circulation particulière, par des vaisseaux qui lui sont propres ; ce sont les lymphatiques. Ce genre de vaisseaux étoit inconnu aux anciens : trois médecins fameux en firent en même tems la découverte, en trois royaumes différens, vers l'année 1652, Bartolin en Danemarck, Rudbec en Suede & Joliffe en Angleterre. Vers la fin du même siècle, Ruisch observa des valvules dans ces vaisseaux ; bientôt après il s'aperçut, à la faveur des injections, qu'ils étoient artériels & veineux, il le démontra en public & en particulier, au microscope & sans microscope ; ce qui fut ensuite confirmé par Vieussens : Je l'ai déjà observé dans le traité des fleurs blanches.

La découverte des arteres lymphatiques ne semble-t-elle pas démontrer qu'elles sont une continuation des dernieres divisions des arteres sanguines, & que c'est de celles-ci qu'elles tiennent leur foible ressort & leurs qualités artérielles ? On ne sauroit ailleurs en trouver le principe. Si l'on injecte des liquides dans l'artere pulmonaire, on apperçoit aisément que la liqueur injectée dilate les petits vaisseaux de tous genres qui se distribuent à la superficie des vésicules bronchiques : il en est de même dans toute la substance pulmonaire. J'ai déjà observé que les liqueurs qu'on injecte par la trachée-artere, passent aisément dans les vaisseaux des poumons, que celles qu'on injecte dans les vaisseaux de ce viscere pénètrent dans la trachée-artere, dans les bronches, dans leurs vésicules, & qu'elles suintent à la superficie.

Haller conclut, d'après ces expériences, que les pores absorbans s'abouchent avec les veines ; ne peut-on pas aussi en inférer que les pores exhalans sont une continuation des vaisseaux lymphatiques, & que ceux-ci le sont des vaisseaux sanguins ? Il n'est pas possible de découvrir ce qui pourroit faire la séparation des uns d'avec les autres, au contraire, tout prouve leurs communications. La transpiration insensible, tant celle qui est particuliere à la peau, que celle qui se fait dans toute la surface intérieure des vésicules des poumons, des bronches, de la trachée-artere, de la bouche & du nez, ne le démontre-t-elle pas ?

Cette évacuation est si considérable que, selon Sanctorius, de huit livres d'alimens il s'en dissipe cinq par ces voies ; peut-elle être autre chose qu'une dépuration générale de la masse des liquides ? Il faut donc que les pores qui la fournissent soient des continuations des vaisseaux sanguins & des lymphatiques qui se distribuent dans toutes les parties du corps, même dans les points les plus insensibles de leurs divisions, pour les accroître dans la jeunesse & pour les nourrir dans tous les âges.

Ces connoissances ne semblent-elles pas mettre dans tout son jour la communication des vaisseaux sanguins avec les lymphatiques ? Ne font-elles pas appercevoir sensiblement que les pores exhalans, ne sont autre chose que des extrémités de ces derniers ? Le sang peut donc se répandre aisément par les issues des pores de ces vaisseaux, lorsqu'ils sont dilatés par quelque cause que ce soit qui fasse violence aux calibres des vaisseaux dont ils sont la continuation. L'observation suivante que Wan Swieten a faite sur lui-même ne laisse pas de doute sur cette vérité.

Cet auteur fut pris d'une petite toux irritante, à la suite de laquelle il rendit des crachats teints de sang ; il regarda dans sa bouche à la faveur d'un miroir, un jour où le soleil étoit rayonnant ; il s'aperçut que le sang qui teignoit ses crachats, provenoit d'un petit vaisseau, du diamètre d'un cheveu, dont le bout s'étoit ouvert, au voile du palais, à côté de la partie latérale droite de la luette. Ce vais-

seau rendoit une petite goutte de sang toutes les secondes ; cet écoulement dura une demi-heure , & l'embouchure du petit vaisseau dilaté fut totalement effacée dans trois heures. Ce vaisseau étoit si petit , ajoute Wan Swieten , que dans son état naturel il ne pouvoit pas admettre le sang rouge : il eut ensuite occasion de faire de pareilles observations sur trois différens sujets. Galien , Arétée , Celse en avoient déjà fait de semblables.

J'ai vu une fille âgée de dix-huit ans , qui rendoit du sang goutte à goutte par un mamelon ; cet écoulement de peu de conséquence , revenoit ordinairement une fois ou deux par mois. On distinguoit aisément que ce sang provenoit de la dilatation d'un vaisseau lacteux ; il ne causoit d'autre incommodité que le désagrément d'un écoulement qui n'étoit pas dans l'ordre de la nature. Cette fille se maria , elle eut un enfant , & l'écoulement qui se faisoit par le mamelon cessa pour toujours.

Une femme rendoit du sang par les pores de la tête , principalement par ceux de la partie occipitale , elle étoit obligée de changer de bonnet quelquefois deux fois par jour ; ses regles avoient alors diminué , elles se rétablirent dans l'ordre naturel , & le sang ne coula plus par cette voie extraordinaire.

J'ai rapporté dans mon livre d'observations , deux cas remarquables , d'après les transactions philosophiques. Un jeune homme conservoit depuis l'enfance une hémorrhagie par le pouce de la main droite , qui se renouvelloit périodiquement tous les mois : elle

ne cessa qu'à l'âge de vingt-quatre ans ; il rendoit chaque fois quatre onces de sang ; cette quantité augmenta à l'âge de dix-sept ans jusqu'à une demi-livre. Il se brûla le ponce avec un fer chaud à l'endroit qui fournissoit le sang , dans la vue de faire cesser l'écoulement ; il lui survint une hémophthisie dont il eut peine à guérir par les secours de l'art.

Un Cabaretier éprouva depuis l'âge de quarante-trois ans jusqu'à celui de cinquante-cinq , un écoulement de sang , par le doigt index de la main droite, qui survenoit presque tous les mois ; il en rendoit jusqu'à quatre livres. Il appliquoit quelquefois des astringens sur le vaisseau d'où venoit l'hémorrhagie , dans l'espérance de la faire cesser , il lui en survenoit des douleurs cruelles au bras.

N'est-ce pas par un mécanisme à-peu-près semblable que se fait l'écoulement périodique des femmes ? Jusqu'à l'âge de puberté , les vaisseaux qui le fournissent sont lymphatiques , ils deviennent sanguins pendant leurs époques , ils cessent de l'être quand l'écoulement cesse ; ils restent lymphatiques pendant leurs intervalles , & ils le sont pour toujours après la cessation naturelle des regles. Combien de fois n'a-t-on pas vu des femmes dont les regles étoient diminuées ou supprimées , les rendre périodiquement par d'autres parties & principalement par l'expectoration , sans qu'il leur en arrivât d'inconvénient ?

Un Gentil-homme , d'un tempérament robuste , âgé de soixante ans , me consulta dans l'année 1738

sur un crachement de sang périodique qu'il conservoit depuis l'âge de quinze ans ; il n'étoit pas de mois qu'il n'en rendît une livre au moins : quatre ans après le crachement de sang cessa, il n'y survécut que de peu de jours.

Je fus appelé dans l'année 1750 pour un malade âgé de cinquante-cinq ans, qui avoit un mal de gorge gangreneux ; il crachoit beaucoup de sang, ce symptôme me donnoit de l'inquiétude, mais le malade me rassura en me disant que toutes les semaines, depuis son enfance, il avoit craché du sang, & que lorsqu'il avoit la fièvre, il en crachoit avec plus d'abondance. Je ne fis plus attention à ce symptôme, & le malade guérit. J'ai rapporté ailleurs ces deux observations.

Ces especes d'hémophthísies se font par la dilatation des vaisseaux sans déchirure ni érosion ; elles sont moins dangereuses qu'effrayantes ; souvent elles sont nécessaires, sur-tout lorsqu'elles suppléent à quelque évacuation naturelle, diminuée ou supprimée, comme celle des femmes ; ou habituelle comme celle des hémorrhôïdes, chez l'un & l'autre sexe.

A mesure que les vaisseaux se déchargent de l'abondance du sang qui a dilaté leurs calibres & forcé leurs embouchures, ils se resserrent ordinairement par leur propre ressort, & l'hémorrhagie cesse. Si cependant le relâchement des vaisseaux étoit excessif, l'hémorrhagie seroit trop abondante ; elle pourroit faire tomber le malade dans l'épuisement ; ce seroit alors une maladie qui exige-

roit les secours de l'art. J'ai donné mes soins , au commencement de cette année , à une femme âgée de trente-huit ans , qui crachoit le sang depuis un mois ; je la trouvai dans un tel épuisement , que je craignis pour ses jours : mais comme elle n'avoit ni fièvre ni signes de suppuration à la poitrine , je jugeai que c'étoit une hémophthisie qui provenoit d'une dilatation des vaisseaux , entretenue par une toux violente ; je calmai la toux , & l'hémophthisie cessa. Le crachement de sang & la toux reprirent la malade six semaines après ; les mêmes secours la rétablirent en peu de jours.

Lorsque des hémorrhagies de cette nature suppléent aux secours périodiques des femmes, quelquefois elles se soutiennent encore après que les évacuations naturelles sont rétablies ; il est essentiel alors d'y remédier, en observant les ménagemens qu'exige la conséquence de la chose. Les hémorrhagies par anastomose , sont fréquentes chez les scorbutiques & souvent très-dangereuses par l'épuisement qui en est la suite. La partie rouge du sang est en dissolution dans cette maladie , & le relâchement des vaisseaux est presque général , lorsque la dissolution est parvenue à son dernier période. Le sang des scorbutiques transude par les pores de la peau , sans que souvent il y paroisse de dilatation sensible ; il coule aussi par les levres , par la bouche , par la trachée-artère , par l'œsophage , par l'estomac , &c.

Les hémorrhagies , sur-tout les hémophthisies , de quelque espece qu'elles soient , ne sont jamais

dans l'ordre de la nature ; les vaisseaux de l'air ne sont pas faits pour recevoir le sang, ils n'admettent naturellement qu'une humeur mucueuse très-divisée, qui se sépare de ce fluide pour humecter & lubrifier la membrane intérieure des bronches , & rendre l'expectoration plus prompte & plus aisée , secours essentiel de la nature , dans tous les cas d'incommodité ou de maladie où cette évacuation est nécessaire.

Le renversement de l'ordre de la nature , dans l'hémophthisie doit toujours en faire craindre les suites qui peuvent devenir dangereuses , selon les circonstances. Les mêmes accidens auxquels on est exposé par la rupture des vaisseaux ou par leur érosion , peuvent avoir lieu dans leur dilatation. J'ai vu des crachemens de sang habituels & sans danger en apparence , amener après eux des ulcères , des suppurations , la phthisie & la mort. Ces funestes événemens ne sont pas moins fréquens qu'ils sont à craindre , lorsque les poumons sont flétris ou épuisés par l'abondance & la durée des crachats , des gens pituiteux & des asthmatiques , lorsque la masse du sang est altérée par quelque vice étranger , comme chez les scorbutiques , ou par des abus dans le régime de vie , par des excès , par des passions , &c.

SECTION QUATRIEME.

Des Tubercules des Poumons.

CHAPITRE PREMIER.

Des Tubercules en général.

ON entend par tubercules des poumons , des concrétions dures qui se forment dans ce viscere : ces concrétions sont différentes entr'elles ; les unes se font par congestion dans les vaisseaux de l'air , les autres sont des engorgemens glanduleux qui s'établissent dans sa propre substance. Ceux-ci suppurent ou sont propres à suppurer , à moins qu'ils ne dégénèrent en des substances pierreuses ; les autres ne suppurent jamais. Les tubercules suppurans proviennent d'une lymphe , ou d'humeurs récrémentielles dégénérées : ceux qui ne suppurent jamais sont formés par des humeurs excrémenteuses retenues dans les bronches ou dans leurs cellules , qui s'y condensent , s'y durcissent & forment des concrétions tuberculeuses , polypeuses , graveleuses , pierreuses , &c.

CHAPITRE II.

Des Tubercules qui ne suppurent jamais.

ON a déjà vu que les vaisseaux sanguins & les lymphatiques des poumons ont des communications avec les bronches & avec leurs vésicules ; c'est par ces communications que se font les évacuations des humeurs étrangères qui se séparent de la masse du sang , par les corps glanduleux de ce viscere. On fait que c'est dans les poumons que se fait la premiere préparation du chyle , quand il est parvenu dans les vaisseaux du sang ; il doit résulter de la dépuratation de cette substance alimentaire , des humeurs qui , dès ce moment , deviennent étrangères à la masse des liquides , & qui doivent être évacuées par quelque voie. D'ailleurs les poumons concourent puissamment à la dépuratation du sang en général , & comme ce fluide y circule plus précipitamment & avec plus d'abondance que dans les autres viscères , les excrétiions des humeurs superflues y doivent être plus abondantes. Les pores exhalans qui fournissent la transpiration pulmonaire , sont les organes naturels de cette excrétiion , aussi se fait-elle avec aisance , lorsque tout répond à l'ordre général de la nature , dans l'état d'une santé parfaite.

Si ces humeurs étrangères sont propres à se condenser dans les vaisseaux de l'air par le contact de
ces

cet élément , ou si elles sont trop denses de leur nature , elles ne sont expulsées qu'imparfaitement , ou en partie , par les voies de l'expectoration ; ce qui en reste inhérent dans les bronches , ou dans les vésicules bronchiques , s'y épaissit de plus en plus , se durcit , forme des corps tuberculeux , polypeux ou des concrétions pierreuses : ces accidens surviennent aussi à la suite des rhumes longs & rebelles.

Sennert a observé que des tubercules de cette espece , se forment de matieres qui ne suppurent jamais : ces matieres , dit cet auteur , sont des humeurs grossieres , ou une lympe trop dense , retenues dans les bronches ou dans les vésicules bronchiques ; il ajoute que quelquefois c'est un sang dur & mêlé avec d'autres humeurs qui s'épaississent insensiblement jusqu'à la dureté. Fernel a vu de ces tubercules durs & d'autres qui le devenoient qu'il avoient déjà pris la consistance de fromage. Hippocrate , Galien , Paul d'Égine & d'autres auteurs anciens & modernes ont vu expectorer de pareils corps durs , des polypes , des concrétions pierreuses , qui ne pouvoient s'être formés que dans les bronches.

Wan Swieten rapporte , d'après Boerrhaave , l'observation suivante. Un soldat , âgé de 25 ans , avoit une fièvre lente avec une toux sèche , une oppression , &c. Le visage étoit pâle & le corps très-maigre ; ses poumons étoient parsemés d'un grand nombre de tubercules durs , aussi gros que des pois ; ils étoient formés d'une matiere plâtreuse , mais un peu moins dure que le plâtre.

Heurnius, en ouvrant le corps de David Jarvis, âgé de 28 ans, le 6 de Janvier de l'année 1693, reconnut que la cause de sa mort provenoit des poumons, qui étoient remplis de petits tubercules crus. Toutes les bronches & les vésicules bronchiques étoient obstruées de pareils tubercules, de façon que la respiration étoit devenue impraticable. Le poumon du côté droit étoit étroitement adhérent au diaphragme & à la plevre; les autres viscères paroissoient dans l'état naturel.

Tralian a donné l'observation d'un homme qui rendit par l'expectoration, une pierre bien figurée. Ce n'étoit pas, dit cet auteur, une humeur grossière & visqueuse, mais une véritable pierre très-polie, & dure au point que jettée à terre elle donnoit du son. Cet homme touffoit depuis long-temps, & il cessa de tousser lorsqu'il eut rendu ce corps étranger.

Un prêtre, d'une maison distinguée, expectora en 1748, à la suite d'une fièvre lente qui avoit duré près de trois mois, une concrétion dure comme de la corne, couverte de pus, de la longueur de près d'un pouce, sur huit lignes ou environ de circonférence. Ses crachats, avant qu'il eût rendu ce corps étranger, n'étoient que lymphatiques, excepté sur la fin qu'ils parurent teints d'un peu de sang.

Après cette expectoration, la toux devint plus fréquente, il s'y joignit une douleur de poitrine, le malade crachoit le matin des sérosités rougeâtres qui devinrent blanches & cessèrent en peu de jours. Ces symptômes se soutinrent les mêmes pendant environ

deux mois, époque à laquelle le malade rendit encore par les voies de l'expectoration , un autre corps étranger de la même nature & de la même grosseur que le premier ; les crachats devinrent purulens. Le malade vint me consulter , il me porta les deux concrétions *corniformes* qu'il avoit rendues , & il me fit le narré dont je ne donne que l'extrait : je lui ai donné plus détendue dans mon livre d'observations.

Il est très-vraisemblable que ces corps étrangers s'étoient formés dans les bronches, puisqu'ils furent expectorés sans aucun délabrement dans la substance des poumons ; s'il y en avoit eu , il auroit été suivi d'une hémorragie considérable & d'une supuration abondante, l'une ni l'autre n'eurent lieu. Le pus dont ces corps étrangers étoient couverts provenoit d'une simple érosion de la membrane intérieure des bronches. Les humeurs rougeâtres que le malade rendoit le matin dans l'intervalle de l'expulsion des deux corps étrangers , ne pouvoient pas être considérées comme du pus ; elles étoient le produit de l'irritation des membranes occasionnée par ces corps énormes , respectivement au calibre des bronches où ils s'étoient formés.

D'après ces considérations , je regardai cette pulmonie comme très-simple ; je la traitai en conséquence , & le malade guérit en très-peu de tems. Je quittai la Province dans le mois d'Avril de l'année 1755 , pour me retirer à Paris ; M. l'Abbé jouissoit d'une santé parfaite ; il avoit le même bonheur dix

ans après ; je l'ai perdu de vue depuis ce tems-là.

Les exemples qui précèdent cette dernière observation , & les autorités que j'ai déjà citées , démontrent qu'on peut mourir de Phthisie pulmonaire sans avoir craché du pus ; la raison en est que, non-seulement les poumons obstrués & farcis de tubercules crus ne peuvent pas donner au chyle le degré de perfection qu'il devoit acquérir dans ce viscere, mais encore, parce que ces tubercules, ces matieres créta-cées, &c. qui engorgent les bronches & les vésicules bronchiques, gênent les fonctions de ce viscere, les troublent, les pervertissent, ce qui ne peut être qu'au préjudice des autres fonctions animales, avec lesquelles elles concourent ; celles-ci étant ainsi affectées, dégénèrent & se pervertissent.

Des malades affligés de tubercules de cette espece, sont débilités par la longueur du mal, fatigués par des toux importunes, & épuisés par l'inanition. La nature perd toutes ses ressources dans ces malheureuses circonstances, & celles de l'Art sont souvent impuissantes.

On préviendroit ces funestes accidens, si l'on prenoit la maladie dans son principe, lorsque la nature ne se suffit pas à elle-même pour s'engarantir.

Dès la naissance des tubercules crus, la respiration devient plus fréquente qu'elle ne l'est dans l'état naturel ; sa gêne & sa fréquence augmentent à mesure que les tubercules grossissent, se propagent & se multiplient. Il s'y joint une petite toux & souvent le pouls devient inégal : on ressent ordinairement dans cet état, une légère douleur à la poitrine,

principalement quand on fait quelque exercice immodéré, ou que l'on se livre aux passions de l'ame.

Cette maladie est perfide, elle se présente sous des symptômes légers & supportables : on croit se bien porter, on continue, sans gêne, des exercices ordinaires; on se néglige d'abord & le plus souvent on ne demande des secours que lorsque le mal est incurable; j'en rapporterai encore un exemple bien extraordinaire & bien frappant.

M. B. . . âgé de 45 ans, d'un tempérament délicat, mais faisant bien d'ailleurs toutes ses fonctions, fut pris le 12 du mois de Septembre de l'année 1773, d'une fièvre intermittente dont il fut guéri dans peu de jours, sans prendre d'autres remèdes que quelque léger purgatif. Au commencement du mois d'Octobre, il se sentit oppressé; l'oppression devint considérable; il s'ensuivit un mouvement fébrile, les urines devinrent rares, & il souffroit d'inquiétudes dans tout le corps. Tous ces symptômes firent des progrès rapides, l'étouffement devint extrême & le malade mourut le 31 du même mois dans la détresse de la suffocation.

On procéda le lendemain à l'ouverture du corps, le foie étoit d'une couleur livide & plus volumineux que dans l'état naturel; la rate étoit flétrie & de mauvaise couleur. On trouva dans la cavité de la poitrine environ deux livres d'une sérosité roussâtre: le poumon droit étoit flétri, le gauche étoit adhérent à la plevre dans toute son étendue, cartilagineux dans toute sa substance, & rempli de masses

crétacées, de la grosseur de noix & de noisettes ; la plevre étoit également cartilagineuse dans toute son adhérence.

On n'a pu attribuer la cause de cette maladie singulière qu'à des chagrins cuisans & à des tristesses légitimes , auxquelles M. B. . . avoit été exposé pendant deux ou trois mois avant sa mort.

Quelque-tems avant l'ouverture du corps de M. B. . . j'avois trouvé le fond de la matrice d'une Dame morte cachectique , totalement cartilagineux & tendant à l'ossification. De pareilles observations ne sont pas rares ; on en trouve dans les ouvrages de plusieurs Auteurs célèbres

CHAPITRE III.

Des Tubercules qui suppurent , ou qui sont propres à supurer : Cause de Pulmonie.

LES tubercules qui suppurent, ou qui sont propres à supurer , proviennent d'une lymphe dégénérée qui a acquis plus de densité qu'elle n'en avoit dans son état naturel. Cette lymphe engorge les glandes des poumons, s'y condense de plus en plus, s'y durcit, y acquiert une âcreté phthisique, détruit leur ton & les réduit en tubercules. Ces tubercules sont plus ou moins nombreux, plus ou moins considérables, selon la qualité de la cause qui leur a servi de principe & qui favorise leur progrès. Ils entrent en suppuration les uns plutôt,

les autres plus tard ; le pus qui s'y forme corrode , ronge , détruit les membranes des glandes engorgées & celles des bronches qui les avoisinent : ce sont des ulcères établis , dont le pus s'évacue par les voies de l'expectoration.

Si le pus des ulcères ne se fait pas jour par ces voies , il s'y établit une suppuration sourde ; le pus se répand dans la substance des poumons , & y fait des ravages qui éludent les ressources de la nature & celles de l'art , pour les prévenir & pour y remédier. De pareils accidens ont également lieu , lorsqu'on n'expectore pas le pus des ulcères en totalité ; c'est ce qui rend les Phthysies pulmonaires si dangereuses & si souvent funestes.

Les rhumes catharreux longs & rebelles , occasionnent souvent des accidens semblables ; ils prennent le caractère des toux phthisiques & sont suivis des mêmes effets.

Des Observateurs en médecine ont remarqué qu'il se forme très-aisément des tubercules aux poumons & quelquefois en si grand nombre , que plusieurs d'entre eux ont dit , qu'il étoit surprenant que tous les hommes ne périssent pas de cette maladie. Ces observations sont justes, cependant on voit tous les jours que la nature se suffit souvent à elle-même pour dissiper & guérir des tubercules nombreux , lorsqu'ils ne proviennent pas de vices particuliers qui exigent les secours de l'Art. Il ne résulte ordinairement de ces espèces de tubercules qu'un léger mal-aise & de petites toux qui , en réhaussant le ton

des fibres des solides secondent les ressources de la nature en donnant plus d'activité, plus d'énergie au mouvement systaltique du cœur & des artères pulmonaires.

Lorsque les poumons sont parsemés de petits tubercules qui ne sont pas de la nature des précédens, ils viennent ordinairement en suppuration, les uns après les autres, à mesure qu'ils mûrissent : ce sont autant d'ulceres qui se multiplient & font la maladie plus grave que ne l'en rendent de gros tubercules ou des vomiques dont on crache le pus avec aisance & en totalité.

La suppuration des tubercules se fait plus ou moins promptement, elle est même plus ou moins lente, selon la qualité de la lymphe qui les produit. Si la lymphe a pris un caractère scorbutique, *psorique*, dartreux, érysypellateux, les tubercules ne tardent pas à se former & à suppurer ; si au contraire la lymphe a pris un caractère scrophuleux, vénérien, gouteux, la suppuration des tubercules ne se fait que très-tard & très-lentement, souvent même elle est précédée de la Phthisie & de la mort. Les tubercules qui proviennent d'accidens, de compressions extérieures, de contractions spasmodiques de durée, sans être compliqués de vices intérieurs, sont les moins dangereux & les moins difficiles à guérir, pourvu qu'on ne les laisse pas invétérer.

Les tubercules héréditaires & ceux qui dépendent du caractère des humeurs, sont aussi différens entre eux, que le sont entre elles les humeurs qui les

forment : cela paroît démontré par la matiere même des tubercules, tantôt elle est blanche, tantôt grise, jaune, ou de toute autre couleur. La consistance de cette matiere est rarement la même : on en voit de semblable à du suif, d'autre à du fromage ; il en est de fongueuse, de crétacée, de dure, de pierreuse, &c. Wan Swieten le confirme par les observations suivantes qu'il a prises de Boerrhaave.

On a trouvé dans un jeune homme asthmatique, mort de pulmonie, les poumons en partie ulcérés & en partie farcis de tubercules qui contenoient une matiere crétacée ; la partie concave du foie, la rate, le mésentere, étoient parsemés de tubercules semblables à ceux des poumons.

Un enfant de quatre ans qui paroissoit guéri d'une phthisie au premier degré, mourut de convulsions ; on fit l'ouverture du corps, les poumons étoient farcis de tubercules, les uns étoient purulens, les autres pleins d'une matiere semblable à du fromage mou.

Les tubercules qui sont parvenus par degrés à la dureté, suppurent enfin si la suppuration n'est pas prévenue par la mort.

Un soldat âgé de vingt-huit ans, extrêmement maigre & débile, étoit affecté depuis huit mois d'une toux fréquente, avec une fièvre lente ; ses crachats étoient blancs sans être purulens ; il ne pouvoit pas se coucher sur le côté gauche, la déglutition devint difficile, la voix s'éteignit, il mourut.

Les pumons étoient adhérens à la plevre , & parsemés dans toute leur substance de tubercules très-petits , comme des semences de millet ; lorsqu'on comprimoit ce viscere avec la main , on distinguoit par le tact des tubercules durs , de la grosseur d'une noix ; on en ouvrit quelques-uns , ils contenoient une matiere blanche comme du plâtre mou ; on n'en trouva qu'un plein de pus. La partie supérieure du lobe droit étoit dure comme une pierre. Sans doute que tous les autres tubercules avoient suppuré avec le tems , de même que celui qui étoit en suppuration.

Une femme mariée en secondes noccs , dont le premier mari étoit mort pulmonique , nourrissoit un enfant depuis dix - huit mois , elle étoit bien avancée dans le dernier degré de pulmonie , lorsqu'elle me consulta dans le mois de Janvier de l'année 1752 , elle mourut peu de jours après. Elle se plaignoit principalement d'un poids au côté gauche de la poitrine , qui diminueoit tous les matins après avoir rendu beaucoup de crachats. A l'ouverture du corps , les pumons me parurent boursoufflés , je n'apperçus pas d'ulcere sur leur surface. En ouvrant le gauche , on mit à découvert une espece de lac plein de pus qui s'étoit formé dans son centre. La substance interne , tant de ce pumon que de l'autre , étoit parsemée de tubercules suppurés , qui formoient autant de petits ulceres ; il étoit des endroits où il n'y avoit pas plus de distance des uns aux autres , qu'il n'en falloit pour pouvoir

en distinguer la séparation. Les autres viscères étoient tels qu'ils sont ordinairement dans les Phthisies pulmonaires au dernier degré. Cette histoire & la suivante sont prises dans mon livre d'observations.

Un jeune homme, âgé de vingt-cinq ans, s'exposa à un air froid dans un moment où il étoit en sueur ; c'étoit pendant l'hiver de l'année 1747 : il lui survint une douleur à la nuque , qui s'étendit sur toute la tête , elle se porta à la poitrine, il s'ensuivit une toux sèche, une fièvre lente & une oppression considérable. On m'appela quelque tems après au secours de ce malade, je le trouvai avec les symptômes précédens , & tremblotant généralement de tous ses membres , au point qu'il falloit qu'il fît plusieurs essais pour porter la main directement à la bouche : il étoit d'ailleurs presque toujours en sueur , & il avoit un dégoût général pour toutes sortes d'alimens. La toux devenoit de jour en jour plus fréquente , elle commençoit à être humide , & la maigreur faisoit des progrès : tout indiquoit déjà le second degré d'une Phthisie pulmonaire tuberculeuse , malgré les symptômes extraordinaires qui , de leur nature , n'y avoient point de rapport. Après un long usage de remèdes , la sueur se modéra , la peau resta seulement douce & humide d'ardente qu'elle étoit auparavant : tous les autres symptômes se mitigèrent & se dissipèrent insensiblement , après quatre mois de maladie.

Une Dame de Normandie, âgée de trente ans , femme d'un capitaine de vaisseau , m'adressa un

mémoire à consulter dans le mois d'Octobre de l'année 1762. Cette Dame, d'un tempérament délicat, avoit conservé une toux sèche depuis sa première couche, qui datoit déjà de près de trois ans. Elle avoit craché trois fois du sang en différens tems, sans qu'il s'en fût suivi desymptômes qui pussent faire soupçonner d'ulcere à la poitrine. Cependant son état lui donnoit des sollicitudes ; d'autant mieux que quelque tems après sa première grossesse, il lui étoit survenu des croûtes au visage qui s'étoient dissipées, ce qui ne diminua pas sa toux, au contraire elle étoit devenue plus fréquente. Il lui survint pendant le mois d'Août de l'année 1762 une pesanteur de poitrine & des inquiétudes dans le corps, presque continuelles ; il s'y joignit une chaleur fébrile, la toux devint plus forte, elle décida l'expectoration d'environ six onces d'une matiere purulente & fétide qui avoit sans doute commencé de se former, dans le mois d'Août précédent. L'expectoration de ce pus fut suivie d'une suppuration & de tous les symptômes qui caractérisent une Phthisie pulmonaire tuberculeuse.

Il paroît sensible que tous ces symptômes étoient des effets d'un tubercule considérable, qui s'étoit établi insensiblement depuis la première couche, ou depuis la guérison masquée des croûtes qui étoient survenues au visage. Les crachemens de sang avoient été causés par la compression de ce tubercule sur les calibres des vaisseaux sanguins qui l'environnoient. La malade fit exactement usage

des remèdes que je lui proposai dans ma consultation ; on m'apprit plusieurs mois après qu'elle étoit totalement guérie de son mal de poitrine , & qu'il ne lui restoit d'autre incommodité qu'une délicatesse qui provenoit de son tempérament

Un homme âgé de vingt-cinq ans , d'un tempérament robuste , habitué à des exercices pénibles , fut pris pendant l'été de l'année 1751 d'une toux avec expectoration de crachats lymphatiques. La toux augmenta au commencement de l'automne , elle devint violente & enfin convulsive. Ce malade ne fut soulagé que par l'expectoration de quelques gorgées de pus. Il souffroit depuis quelque tems d'une légère douleur de poitrine. Il succéda à cette expectoration une fièvre lente , la douleur de poitrine devint plus marquée , & il commençoit de s'établir des sueurs nocturnes. Il m'appela , & il fit usage des remèdes dont je rendrai compte ; il guérit parfaitement. J'ai donné l'histoire de cette maladie dans mon livre d'observations.

J'ai vu un nombre de guérisons de tubercules en suppuration & avant de suppurer : les vrais médecins sont souvent en occasion de faire de pareilles observations ; ils en feroient de bien plus fréquentes s'ils étoient appelés à tems pour prévenir les suites funestes de cette maladie. De vingt malades de pulmonie qui les consultent , à peine s'en trouve-t-il deux qui soient dans le cas de pouvoir espérer de guérir. Les uns n'ont pas prévu le danger de leur maladie , ils se sont négligés ; les autres se sont livrés à des

charlatans, ou bien ils ont donné une confiance aveugle à des gens hors d'état de connoître leurs maladies, d'en distinguer le caractère & d'en apercevoir les causes. C'est ainsi que de malheureux citoyens, que des peres de famille, des épouses tendres & des enfans chéris deviennent les victimes de l'ignorance & de la cupidité.

Il n'est pas aisé de connoître quand il se forme des tubercules aux poudons, cependant on s'aperçoit ordinairement que le teint de ces malades change à leur désavantage, que la couleur du visage pâlit & devient comme livide, que leur langue est ordinairement limoneuse, principalement après la digestion. Ces malades ont une petite toux qui fait des progrès à proportion de ceux des tubercules, & qui enfin devient étique si l'on n'en prévient pas le second degré par les secours de l'art. Ils ressentent un mal-aise dans tout le corps, les urines sont rougeâtres, le pouls est fréquent : ils rendent des crachats épais & visqueux. Lorsqu'on s'aperçoit de quelqu'un de ces symptômes, on a lieu de craindre la pulmonie tuberculeuse : si deux ou trois concourent à la même indication, ils en font un signe essentiel. Pour ce qui concerne les tubercules qui ne suppurent pas, on ne les connoît que par la toux & par la gêne de la respiration.

Lorsque les tubercules viennent en suppuration, il s'établit une fièvre lente, à moins qu'ils ne soient renfermés dans un kiste : tous les symptômes augmentent, alors la toux devient humide, plus fré-

quente , les crachats de plus en plus fétides , & l'on ressent ordinairement des frissons principalement au dos une douleur à la partie antérieure de la poitrine selon l'endroit des poumons où sont situés les tubercules suppurés, &c.

CHAPITRE IV.

Vomique des Poumons ; Suppuration à la suite des Fluxions de poitrine ; d'autres Maladies aiguës & chroniques ; Causes de Phthyses Pulmonaires.

ON entend par vomique des poumons , un abcès plus ou moins considérable , qui se forme dans ce viscere & qui est ordinairement renfermé dans un kiste ou membrane qui fait une espece de poche.

La suppuration des poumons qui survient à la suite des maladies aiguës qui n'ont pas été parfaitement jugées , doit aussi être considérée comme une espece de vomique : il n'est pas rare de voir de pareils exemples à la suite des fluxions de poitrine , des péripneumonies , des fièvres putrides , &c.

La vomique véritable se forme insensiblement , fait des progrès & prend enfin un volume considérable , sans qu'elle donne ordinairement de signe de son existence , jusqu'à ce qu'elle se rompt tout à coup. Alors la grande quantité de pus qui s'en répand dans les bronches , les obstrue & les engorge au point que l'air ne pouvant plus se distribuer dans leurs calibres , le mécanisme de la respi-

ration est suspendu , arrêté , & l'on expire dans quelques instans.

Si l'on est assez heureux d'expectorer la plus grande partie du pus des grandes vomiques , on n'étouffe pas & l'on vit encore : il survient alors une fièvre lente & une suppuration suivies du même danger que les Phthysies pulmonaires les plus à craindre. Lorsque les vomiques sont peu considérables , la quantité du pus est moins grande , on risque moins pour la vie quand elles se rompent , & on a moins à craindre des suites de la suppuration , pourvu qu'il n'y ait pas de cause étrangere qui la rende suspecte.

Les vomiques se forment le plus souvent chez les gens maigres & chez ceux qui ont eu des vaisseaux rompus dans les poudrons. Il s'en forme aussi sans qu'on puisse en entrevoir la cause , chez des sujets qui n'ont point d'incommodités , & qui vaquent à leurs affaires comme dans la santé la plus parfaite : cependant dans ces circonstances malheureuses , ils sont comme en équilibre , dans le pas glissant , entre la vie & la mort.

Fernel prétend que quelquefois les vomiques donnent des signes qui les indiquent avant qu'elles ne se rompent : ce sont des toux , des sputations sanguinolentes , des gênes dans la respiration , des oppressions , une haleine forte & fétide. J'ai aperçu , mais rarement , quelqu'un de ces signes avant la rupture des vomiques , ils ne pouvoient que

les

les faire soupçonner, mais non pas les indiquer assez pour en porter un jugement solide.

Hippocrate a observé que l'on meurt de cette maladie, de même que de toute autre suppuration aux poudons, si elle n'est pas terminée en quarante jours.

J'ai pour les aphorismes d'Hippocrate & pour leur auteur la vénération qu'ils méritent, mais ce pronostic est trop général pour n'être pas sujet à des exceptions.

Un Marchand Boutonnier, logé rue neuve St. Martin, retiré de son commerce pour jouir d'une aisance honnête, m'appela dans l'année 1770 : il avoit vomi la veille, ou rendu par l'expectoration une pleine jatte de pus : peu s'en fallut qu'il n'en fût étouffé : la fétidité en étoit si insupportable, qu'à peine on pouvoit en soutenir l'odeur. La toux étoit fréquente & quinteuse, & la fièvre assez forte. Ces deux symtômes & le crachement de pus durèrent plus de trois mois, presque de la même force. La quantité du pus & de la sérosité glaireuse qu'il expectoroit étoit au moins de deux livres par jour. Ce malade qui d'ailleurs étoit d'un bon tempérament, tomba dans le marasme & s'affoiblit enfin au point qu'il ne pouvoit quitter son lit. On avoit désespéré de sa guérison, lorsqu'il survint une toux violente avec un déchirement de poitrine qui le menaçoient de son dernier moment : il rendit enfin avec les crachats une peau membraneuse, confondue avec une espede de peloton de pus sanguinolent.

Peu de jours après la toux se modéra , la quantité de pus diminua , la fièvre tomba , il en fut de même de tous les autres symptômes qui se dissipèrent insensiblement. Le malade guérit parfaitement , il reprit son embonpoint ordinaire , il jouit encore aujourd'hui de la santé la plus parfaite.

Jacob Walier , ouvrier en laine , mourut à Leyde le 5 de Septembre de l'année 1641 ; il avoit essuyé au commencement de la même année une maladie aiguë de poitrine , pour laquelle il n'avoit point fait de remède. Il succéda à cette maladie une toux & un crachement de pus , si considérables qu'il mourut dans le marasme. Le poumon droit étoit adhérent à la plevre qui étoit très-épaisse ; la cavité de la poitrine étoit remplie d'une sanie très-fétide. Le poumon gauche étoit corrompu & imbibé d'une férosité écumeuse ; il contenoit aussi quelques vomiques. Le cœur étoit flétri & adhérent au péricarde , de façon qu'il ne restoit pas une seule goutte d'eau dans la cavité de ce dernier. Les autres viscères étoient pâles , lâches & épuisés de sang ; l'épyploon en grande partie conservé : tout le corps étoit tellement atrophié , qu'à la place des chairs , on n'appercevoit que des filamens. Cette observation est de Hurnius.

Jean de Néef , Flamand , prit une pleurésie le 21 de Novembre 1636 ; on négligea de le saigner , il en resta une Phthisie pulmonaire de laquelle il mourut dans le marasme le 20 de Décembre de la même année , sans donner de marque d'agonie. Son corps étoit desséché ; la plevre du côté gauche étoit dans

l'état naturel, le poumon droit adhérent à la plevre, aux côtes & au péricarde. La membrane qui recouvre les poumons n'étoit point déchirée. Dès qu'on l'eût ouverte, on s'apperçut d'une cavité comme une espece de cloaque qui tenoit toute cette partie des poumons qui paroissoit tombée en colliquation ; de sorte que la substance de ce lobe représentoit une espece de filet auquel tenoit une matiere gluante & purulente, mêlée avec une pituite épaisse. Cette matiere paroissoit semblable à la boue qui reste dans les filets des pêcheurs quand ils les levent des marais. Le poumon droit étoit très-libre & n'avoit pas contracté d'adhérence. Cependant en le disséquant, on trouva vers le milieu une vomique assez considérable qui rendit une matiere purulente. Tous les visceres étoient desséchés sans qu'il y eût rien de skirreux. Cette observation est rapportée par Fernel.

On m'appela dans l'année 1750 pour un gentilhomme âgé d'environ trente ans, qui avoit rendu depuis environ trois ans deux vomiques considérables ; j'avois suivi ces deux maladies, il en étoit parfaitement guéri. Je le trouvai qu'il venoit d'en rendre une troisieme dont les suites lui furent funestes. La toux, la fièvre, la suppuration & tous les autres symptômes ordinaires de cette maladie, ne firent qu'empirer ; ils le conduisirent à une hydropisie qui termina ses jours.

Les suppurations des poumons qui surviennent dans les maladies aiguës où à leur suite, doivent

être considérées comme des crises imparfaites , à moins que toute la matiere qui les forme ne soit évacuée par l'expectoration , ou par toute autre voie conforme aux vues de la nature. Si le pus s'épanche dans la cavité de la poitrine , c'est un empyeme , maladie toujours dangereuse , parce que le pus qui croupit sur le diaphragme & entre la plevre & les poumons y acquiert une acreté corrosive , détruit insensiblement ce viscere & accomplit les symptômes & les pronostics les plus funestes d'une Phthisie pulmonaire.

Un homme âgé de vingt-cinq ans , étoit guéri en apparence , dans l'année 1765 , d'une fluxion de poitrine ; je passai chez lui quelques jours après , uniquement pour le voir dans sa convalescence ; il avoit repris toutes ses fonctions , & il se réjouissoit de son entier rétablissement. Cependant je lui trouvai une petite toux sèche , & je m'aperçus que sa respiration étoit gênée ; le lendemain on m'annonça sa mort ; il en avoit été frappé tout-à-coup. C'étoit , sans doute , l'effet d'un abcès aux poumons dont le pus avoit flué rapidement sur le diaphragme , ou dans les bronches ; il n'en falloit pas davantage pour supprimer la respiration & pour abattre du même coup toutes les fonctions vitales

Un jeune homme étoit fatigué d'une toux qui ne lui donnoit point de relâche ; elle étoit survenue à la suite d'un exercice immodéré ; il rendit avec beaucoup d'efforts une vomique entiere , de la grosseur d'un œuf de pigeon ; on l'ouvrit , il en

sortit un pus blanc & égal ; il lui en resta un crachement sanguinolent qui dura deux jours avec fièvre & agitation. Ces symptômes se mitigèrent , & le malade guérit par le secours de Fernel qui a donné cette observation.

Un magistrat d'un siége présidial d'une grande Province , étoit venu à Paris vers l'année 1770 , il fut pris d'une fièvre putride qui dura dans toute sa force , au moins vingt-deux jours. Alors la fièvre tomba & tous les symptômes se dissipèrent ; il se croyoit déjà en convalescence. Cependant il ne se rétablissoit pas , au contraire , il n'avoit pas ses nuits tranquilles , son sommeil étoit interrompu par une toux sèche très-importune. Cette toux devint humide , les crachats furent d'abord rares , mais bientôt ils devinrent fréquens ; tous ces symptômes étoient regardés comme les effets d'un rhume , on m'appela pour en juger.

Je trouvai le malade accablé ; il avoit un peu de fièvre , la peau étoit sèche , la toux fréquente & les crachats purulens. Il n'en falloit pas davantage pour pouvoir affirmer que ce prétendu rhume provenoit d'une suppuration aux poudrons. Les crachats devinrent de plus en plus abondans , & dans peu de jours je m'apperçus qu'il rendoit du pus non-seulement par les voies de l'expectoration , mais encore par les urines & par les garderobes. Je fus surpris , je l'avoue , de ces ressources de la nature. Je fis appeler les deux Médecins de Paris qui jouissoient de la réputation la mieux méritée. Ils furent tellement

étonnés de la quantité du pus que le malade évacuoit par ces trois voies & de sa fétidité , qu'ils désespérèrent de sa guérison ; ils ne continuèrent pas de le voir , parce qu'ils croyoient que les secours de l'art lui seroient inutiles.

La nature avoit déjà prononcé un jugement bien différent ; le malade continua de rendre du pus par les trois voies ; je fis une suite de remèdes propres à favoriser ces évacuations , il s'ensuivit une guérison si parfaite que ce magistrat reprit bientôt après les fonctions de son état ; il les remplit encore aujourd'hui avec une distinction méritée.

M. de Just... jeune homme distingué par ses talens, se trouva incommodé dans le mois de Septembre de l'année 1768 , peu de jours après il se déclara une fièvre maligne , avec des symptômes violens qui se soutinrent près d'un mois. La fièvre diminua & tous les symptômes de la maladie se mitigèrent. On concevoit des espérances d'une guérison prochaine , lorsqu'il survint une toux violente qui fut suivie de crachats purulens, & ensuite d'un pus fétide & si abondant qu'il en rendoit au moins deux livres par jour. Le malade étoit dans le marasme , il avoit d'ailleurs tous les symptômes d'une Phthisie pulmonaire : il guérit après environ deux mois de suppuration , & il jouit encore des avantages d'une bonne santé.

Un enfant âgé de dix ans , fils d'un traiteur de la rue St. Honoré, fut accablé d'une fièvre putride des plus alarmantes pendant l'automne de l'année

1780. Cette fièvre diminua vers le vingtième jour de la maladie. Il survint alors une toux, il cracha du pus, la fièvre prit un caractère de fièvre lente, & la maigreur étoit extrême. Le petit malade continua de tousser & de cracher avec la même abondance pendant environ six semaines. La toux enfin se modéra, les crachats diminuèrent en quantité; leur qualité s'améliora insensiblement, & peu de tems après j'eus la satisfaction de le voir entièrement rétabli.

Un des principaux officiers des gardes du corps du roi, essuya à Versailles pendant le mois de Février de l'année 1781 une fièvre continue, avec douleur de poitrine; il se rétablit de cette maladie, & il vint à Paris dans le mois d'Avril suivant. Cet officier avoit toujours conservé depuis sa maladie une petite toux suivie d'une expectoration glaireuse. Il lui survint dans le mois de Mai quelques accès de fièvre tierce, la toux augmenta, & les crachats devinrent purulens. La fièvre n'avoit pas entièrement cessé, elle prit un caractère de fièvre lente & dura environ six semaines. Pendant tout ce tems les crachats étoient un vrai pus mêlé avec une lymphe glaireuse; la fièvre & les autres symptômes cederent à l'usage des remèdes, le malade se rétablit au point qu'il fut bientôt en état de partir pour ses terres, où il jouit aujourd'hui de tous les avantages d'une guérison parfaite.

Une femme âgée de quarante-deux ans, affoiblie par une expectoration de pituite glaireuse très-abon-

dante , à laquelle elle est habituée depuis environ sept ans , se plaint dans le mois d'Avril dernier d'une oppression de poitrine douloureuse ; sa toux devint plus forte & plus fréquente ; elle éprouvoit de tems en tems des frissonnemens , elle cracha du pus & il se déclara une fièvre étiq̃ue , avec tous les symptômes qui la caractérisent. Cette femme étoit dans un état déplorable au commencement du mois de Juillet ; je ne l'abandonnai pas , la nature fit en sa faveur des efforts salutaires , je la secondai par les secours de l'art , & la malade se rétablit dans le même état où elle étoit avant ce dernier accident.

On peut inférer de ces observations que les Phthies ne sont pas toujours aussi dangereuses qu'elles sont alarmantes , sur-tout dans leurs commencemens , pourvu qu'on ait la scrupuleuse attention de remplir les indications curatives , d'après la dictée de la nature.

C H A P I T R E V.

*Obstructions des viscères du bas ventre : Cause des
Phthies pulmonaires.*

LES obstructions des viscères du bas ventre sont quelquefois la principale cause des Phthies pulmonaires , & il n'est pas rare que celles-ci provenant de tout autre principe donnent lieu aux engorgemens , aux obstructions de ces viscères & à d'autres

accidens souvent incurables. Tous les viscères en général ont des communications les uns avec les autres ; on voit tous les jours des phénomènes qui l'insinuent , & des observations qui le confirment. Lindan a reconnu que dans la Phthisie on peut cracher du pus sans qu'il vienne directement des poumons ; il a vu des phthifiques dont le pus provenoit de l'orifice supérieur du ventricule , & en d'autres il a trouvé que le ton & l'énergie des poumons avoient déterminé vers le bas ventre une matiere purulente qui s'étoit formée dans leur substance. Pison rapporte l'histoire d'un asthmatique dont l'asthme provenoit d'une collection de pus qui s'étoit faite entre les membranes du ventricule. Bonnet qui rapporte ces observations en a fait lui-même de semblables , qui ont été confirmées par d'autres observateurs. J'ai déjà donné l'histoire d'un homme qui crachoit du pus provenant d'un ulcère considérable qu'il portoit au *scrotum* , sans que les poumons en eussent contracté la moindre altération dans leur substance.

Bonnet a donné l'observation d'une fille de six ans , morte de Phthisie pulmonaire , avec des douleurs aux hypocondres & une inappétence absolue. A l'ouverture du corps on trouva le foie si gros qu'il remplissoit presque tout l'abdomen ; il avoit allongé le ventricule de façon que celui-ci paroissoit séparé de l'œsophage ; le poumon gauche étoit totalement consumé.

Une fille de quatorze ans , phthifique depuis sa

dixième année, soutint sa maladie pendant quatre ans ; elle étoit dans le marasme , cependant son appétit n'avoit jamais diminué ; elle mangeoit & buvoit comme si elle eût été parfaitement saine : elle conserva même le goût des jeux de l'enfance jusqu'à un mois avant sa mort.

A l'ouverture du corps on trouva le mésentère parsemé de tubercules , formés par une matière semblable à du suif, & des tumeurs dures & scirreuses principalement vers les vaisseaux qui sont aux environs de la veine porte. Il y en avoit de la grosseur d'œufs de poule, & d'autres de celle de châtaignes. On trouva une pierre dans les reins ; le foie, le ventricule & la rate étoient dans l'état naturel. Le lobe droit des poumons contenoit un abcès qui rendit une livre & demie d'un pus fétide enfermé dans un kiste. On distinguoit un nombre de tumeurs dans la substance de ce viscère, les unes étoient scirreuses, & les autres sebacées. C'est une observation de Lindan.

Il est ordinaire que les phthiques perdent l'appétit, cependant la malade de l'observation précédente le conserva presque jusqu'à sa mort ; n'étoit-ce pas un symptôme de la maladie, ou bien les organes de la digestion ne participoient-ils qu'indirectement aux vices des autres ? J'ai vu un nombre de cas semblables, ils sont même assez fréquens dans nos Provinces méridionales.

Horstius ouvrit le corps de Lister, mort de Phthisie pulmonaire, il trouva l'épiploon & le mésentère

presque entièrement consumés ; une partie de la rate étoit noire & ressembloit à du sang gelé ; le foie étoit extrêmement gros & presque desséché ; sa couleur étoit plombée du côté droit , & noire du côté gauche : la vésicule du fiel contenoit une matiere noire grumelée & quelques pierres grosses comme des lentilles ; les poumons étoient ulcérés & corrompus.

Une fille , à la suite d'une peur , fut prise d'une fièvre lente avec douleur à la poitrine ; les parotides & presque toutes les glandes du cou s'engorgerent , elle mourut phthistique. On trouva dans le bas ventre des sérosités limpides , l'épiploon étoit attaché au mésentère & au péritoine par quelques ligamens. Ces trois parties , & d'ailleurs les intestins , l'*uterus* , la vésicule du fiel étoient parsemés à leur superficie de tumeurs inégales de différentes grosseurs , & de différentes figures. Ces tumeurs étoient plus petites vers la partie supérieure de l'épiploon , que vers la moyenne où elles étoient beaucoup plus grosses ; elles étoient très-rapprochées dans la partie inférieure , à peine pouvoit-on les y distinguer les unes des autres. Il y avoit dans le poumon gauche un ulcère ichoreux & sanieux , & on y distinguoit des tumeurs semblables à celles du mésentère & des autres parties du bas ventre , dont quelques-unes étoient en suppuration. Plusieurs de ces tumeurs étoient formées d'une matiere semblable à la bouillie , d'autres d'une matiere plus épaisse , elles ressembloient , pour ainsi dire , à des glandes englobées.

M. l'Abbé Guer... fut pris, à l'âge de quarante-cinq ans, d'un serrement de poitrine & d'une toux sèche, qui durèrent près d'un an dans le même état; la toux devint humide, il cracha un peu de sang & ensuite du pus. Ces symptômes firent des progrès, il se déclara une fièvre lente, la maigreur commença à s'établir, les crachats devinrent fétides & plus abondans; le marasme s'accomplit insensiblement, il survint des aphtes à la bouche, principalement vers le larynx où étoient des ulcères qui gênoient extrêmement la déglutition. Le malade étant réduit à une foiblesse extrême eut recours en différens tems aux maîtres de l'art les plus en état de lui donner des secours; ils désespérèrent tous de sa guérison, ils ne pouvoient, selon toute apparence, porter d'autre pronostic.

Je fus appelé, après trois ans de souffrances, pendant le printems de l'année 1765; je trouvai le malade dans un dépérissement total; les crachats étoient du vrai pus mêlé avec des mucosités d'une odeur fétide & rebutante; il suoit toutes les nuits. Le palais, les amigdales étoient parsemés d'aphtes & d'ulcères chancreux; la fièvre avoit tous les après midi des exacerbations constantes & considérables

Beaucoup moins de symptômes alarmans auroient suffi pour désespérer des jours de M. l'Abbé, j'en désespérois aussi tout comme en avoient désespéré les Médecins qui l'avoient vu avant moi. Cependant M. le premier Chirurgien du roi m'engagea à suivre cette maladie, pour en modérer les symptômes s'il

n'étoit pas possible de donner au malade des secours plus utiles.

J'examinai scrupuleusement l'état des viscères du bas ventre, je trouvai l'hypocondre droit plus élevé que le gauche, & le foie me paroissoit plus volumineux qu'il ne l'est ordinairement dans l'état naturel. Comme j'avois la main sur la vésicule du fiel, le malade se plaignit d'une sensation douloureuse qui augmentoit par une plus forte compression.

Je soupçonnai un engorgement dans la vésicule, & je fis des remèdes en conséquence. Peu de tems après, le malade rendit en huit jours plus de soixante pierres biliaires, sans compter celles qui se perdirent dans les garderobes. Ces pierres étoient grosses, les unes comme de petits pois, les autres comme des grains de vesse; celles-ci étoient angulaires, d'autres rondes & raboteuses; il y en avoit plusieurs de plattes.

A cette époque la fièvre diminua, les crachats devinrent moins fétides, ils prirent une meilleure qualité; tous les symptômes se mitigèrent insensiblement, le malade entra en convalescence & il se rétablit parfaitement dans l'espace d'environ trois mois.

Après cette heureuse convalescence M. l'Abbé Guer... jouit pendant plusieurs années d'une santé parfaite; cependant il prenoit assez aisément des rhumes qui se terminoient en peu de jours: deux ou trois ans avant sa mort, dont il fut frappé vers la fin de l'année 1781, il étoit incommodé d'un

asthme humide qui le tenoit dans une espece de langueur qui n'avoit cependant rien de semblable à celle qu'il éprouvoit lorsqu'il étoit affligé de Phthisie pulmonaire. Il fut saisi enfin tout à coup d'un chagrin violent qui fut suivi dans peu de momens d'un vomissement de sang si considérable qu'il expira sans qu'on eût le tems de lui donner du secours.

Horstius a donné l'observation d'un homme mort de phthisie , auquel il avoit trouvé plus de deux cents petites pierres dans la vésicule du fiel ; la substance du foie en étoit déchirée.

SECTION CINQUIEME.

Métastases : Cause de Phthysies pulmonaires.

CHAPITRE PREMIER.

Métastases en général.

ON entend par métastase , le transport de la matiere qui fait une maladie , d'une partie , ou d'un viscere à un autre. Ce transport se fait du dedans au dehors , ou du dehors au dedans du corps ; on peut le considérer comme une crise parfaite ou imparfaite ; dans le premier cas elle est salutaire , parce qu'elle détruit ou dissipe la cause de la maladie ; dans l'autre, elle

laisse après elle la plus grande partie de cette cause, & la maladie continue avec les mêmes symptômes. Lorsque le transport de la matiere morbifique se fait du dehors au dedans du corps, il ne mérite plus le nom de crise, parce qu'il n'est jamais salutaire, & qu'il est toujours suivi d'un plus grand danger.

Les crises se font ordinairement par les voies de la transpiration, des sueurs, des urines, des garderobes, par des hémorrhagies, par des engorgemens de glandes ou des abscesses extérieurs. Les crises ne sont regardées comme salutaires que lorsque les symptômes de la maladie diminuent sensiblement & que la guérison s'ensuit; autrement elles sont imparfaites & laissent après elles un danger imminent.

Les métastases qui se font dans les pounons sont toujours pleines de danger; elles proviennent de l'intérieur du corps, ou de l'extérieur; de la diminution ou de la suppression, par exemple, de l'écoulement des hémorrhoides, des regles, des voidanges, du lait, des fleurs blanches, d'éruptions cutanées repercutées; des suites de la petite vérole, de la rougeole mal jugées; d'humeurs dartreuses, psoriques, érésipellateuses; de vieux ulcères cicatrisés, mal-à-propos, &c. Les humeurs propres à ces maladies étant portées dans les pounons, y causent des oppressions, des asthmes suffoquans, des phthifies pulmonaires, &c.

Lorsque les métastases se font du dedans au dehors, les symptômes de la maladie primitive cessent, les fonctions des viscères affectés se réta-

blissent , & l'on apperçoit à l'extérieur des écoulemens relatifs à la cause de la maladie , ou bien des tumeurs , des abcès , des ulcères , des éruptions cutanées , &c.

Les métastases sont ordinairement précédées de quelque trouble dans l'économie animale ; ce sont des frissonnemens de dérangemens dans l'ordre des pulsations des artères , d'inquiétudes dans les membres , & d'autres symptômes propres à la nature des évacuations supprimées des matieres dont se font les déplacemens , & enfin , par le plus ou le moins de délicatesse des viscères , ou des parties où se forment les dépôts.

Les voies par où se font les métastases n'ont pas été parfaitement développées ; elles tiennent encore du problème. Il paroît vraisemblable que celles du sang se font par ses propres vaisseaux ; celles de la lymphe , par les vaisseaux lymphatiques , celles des autres humeurs , par le tissu cellulaire. Les métastases violentes , qui sont des effets de la fièvre & de l'inflammation , se font indistinctement par toutes sortes de voies. Comme le genre nerveux est généralement répandu dans toutes les parties du corps , dans tous les viscères , dans les membranes des vaisseaux du sang , de ceux de la lymphe & du tissu cellulaire , il participe à toutes les métastases en favorisant leurs directions par les mouvemens spasmodiques que lui occasionnent les humeurs qui se déplacent pour faire la métastase.

Le sang qui engorge les vaisseaux hémorrhoidaux,
celui

celui que fournissent les secours périodiques des femmes se déplace-t-il pour former dans la poitrine des asthmes , des abcès , des ulcères , ou bien ces abcès , ces ulcères font-ils l'effet d'une pléthore générale , ou particulière aux vaisseaux hémorrhoidaux & à la matrice ?

La question est difficile à résoudre ; le sang qui circule dans les poumons est différent du sang hémorrhoidal ; celui-ci a acquis un mauvais caractère par son séjour dans des vaisseaux où il a formé des engorgemens phlogistiques ou inflammatoires. La masse générale des liquides ne participe pas à ce vice , ou n'y participe pas assez pour former dans les poumons des plaies semblables à celles que pourroit y faire un sang hémorrhoidal déjà dégénéré. D'ailleurs une pléthore particulière aux vaisseaux hémorrhoidaux & aux utérins ne sauroit d'abord accomplir une pléthore générale dans tout le corps , ni particulière dans les poumons , sur-tout chez des hommes délicats , foibles & débiles , dont le sang est lâche & apauvri , qui cependant sont les plus sujets à de pareilles métastases. Il paroît donc vraisemblable que c'est le sang des hémorrhoides & celui des règles qui se porte aux poumons dans les métastases pour y former des engorgemens , d'autant mieux que les tumeurs hémorrhoidales diminuent , & que les vaisseaux qui les forment , se dégorgent , en même-tems que l'engorgement des poumons s'établit.

Dans les apoplexies sanguines par métastase , on

trouve les vaisseaux du cerveau ; ses sinus , ses ventricules engorgés de sang , & sa substance quelquefois inondée de ce fluide extravasé ; il en est de même des autres viscères après des métastases sanguines.

Il est difficile de comprendre comment le sang peut prendre un courant rétrograde , opposé à celui de sa circulation , pour se porter du bourlet hémorrhoidal & de la matrice , dans les poumons , dans la tête ; cependant l'observation suivante donne une idée de la possibilité du renversement de ce mécanisme , & la célébrité de *Baillou* , qui en est l'Auteur , lui mérite de la confiance.

Un jeune homme âgé de 20 ans crachoit souvent du sang ; on s'attachoit aux poumons pour le guérir de ce phénomène ; le médecin en passant légèrement la main sur le bas ventre , distingua sensiblement par le pouls que le sang couloit des hypocondres , vers les parties supérieures , comme si on l'y eût conduit avec la main. Il reconnut par une suite de son observation , qu'en même-tems que ce fluide se portoit vers les poumons , il excitoit un léger frissonnement à la suite duquel le malade crachoit du sang ; ce crachement imitoit celui de l'hémoptysie ordinaire : instruit par cette heureuse découverte , le savant médecin tourna ses vues curatives du côté des hypocondres qui étoient engorgés d'humeurs ; il les évacua , & par ce moyen l'hémorragie cessa.

Benet a vu des cas semblables , & Hippocrate a observé que ceux qui crachent un sang écumeux , & qui ressentent une douleur au-dessus du diaphragme , le crachent du foie.

Aretée a aussi reconnu que l'on peut cracher du sang provenant de la rate & du foie ; il avoue que cette espece d'expectoration , ne se fait pas aisément , & qu'il est bien plus aisé que ces visceres se dégorgent par le ventricule & par les intestins , que par le poumon ; il n'est pas cependant impossible , ni incroyable , ajoute cet auteur , que cette évacuation se fasse par les poumons , & par la trachée-artère , puisque dans les fièvres dont la cause est dans la rate ou dans le foie , il survient des hémorragies par le nez , dont le sang coule toujours par la narine qui répond au côté du viscere affecté.

On voit souvent dans les hydropisies , l'engorgement lymphatique d'un membre se porter dans un autre , quitter celui-ci & revenir dans le premier , sans qu'il se fasse de changement dans la couleur , ni dans la qualité du fluide qui les forme. Si ces humeurs qui font l'engorgement œdémateux , avoient passé dans le sang , elles conserveroient quelque teinte de sa couleur , mais elles restent les mêmes qu'elles étoient dans leurs vaisseaux. Ne paroît-il pas sensible que le transport de ces humeurs se fait par les vaisseaux qui leur sont propres ? Je rapporterai plus bas l'observation faite sur une femme morte subitement , d'une métastase laiteuse dans les poumons : à l'ouverture du corps ; le lait ruisseloit de ce viscere , à chaque taillade qu'on y faisoit avec le bistouri.

L'observation curieuse que j'ai déjà donnée concernant un magistrat qui rendit , en même tems ,

un abcès critique de la poitrine, par l'expectoration, par les garderobes & par les urines, ne démontre-t-elle pas que les pores resorbans qui prenoient cette matiere dans son foyer pour la déposer dans des vaisseaux excrétoires de ces différentes parties, étoient des continuations de vaisseaux lymphatiques ?

Le pus que rendoit, par l'expectoration, le malade qui avoit une suppuration au *scrotum*, sans qu'il en restât d'altération dans la substance des poumons, pouvoit-il provenir d'ailleurs que des vaisseaux lymphatiques ou du tissu cellulaire ?

Pour ce qui concerne les métastases promptes & subites des éruptions cutanées inflammatoires, telles que les pourprées, celles de la petite vérole, de la rougeole, des éréthypes, elles doivent se faire par toutes les voies, par les vaisseaux sanguins, les lymphatiques & le tissu cellulaire. Les fonctions vitales, les animales sont alors dans un fatal désordre ; la nature est surprise, violentée, elle s'égare dans ce trouble général, tout tombe dans la confusion, tout s'anéantit, jusqu'à une extinction totale, si elle n'est prévenue par les secours de l'art.

Les métastases des éruptions cutanées de tout autre caractère, telles que les dartreuses, les psoriques, les suppurations habituelles paroissent se faire par le tissu cellulaire ; elles sont lentes, & les accidens qui s'ensuivent, pourroient être considérés comme des dépôts particuliers qui se forment dans les viscères, ou en d'autres parties, si l'on

n'étoit pas prévenu qu'ils font les effets de métastases.

Quoi qu'il en soit , le mécanisme de la métastase restera toujours problématique ; c'est un mystère que la nature s'est réservé pour elle seule.

C H A P I T R E I I .

*Sang hémorrhoidal porté à la poitrine par métastase :
Cause de Pulmonie.*

LE flux hémorrhoidal est salutaire lorsqu'il est modéré & qu'il vient périodiquement ; il préserve les viscères du bas ventre , ceux de la poitrine & de la tête , de phlogoses , d'inflammations , d'obstructions propres à donner lieu à des maladies aiguës & à des chroniques de la nature de celles qui font passer la vie dans la langueur , & qui se terminent souvent par une mort précédée de cruelles souffrances. C'est d'après des observations multipliées qu'Hippocrate a établi que ceux qui sont sujets aux hémorrhoides , ne sont exposés à presque aucune maladie. Galien son sage commentateur , ajoute que ce n'est pas seulement par l'écoulement du sang que les hémorrhoides préservent & guérissent de plusieurs maladies , mais par l'évacuation d'humeurs étrangères répandues dans la masse de ce liquide , qui , si elles étoient retenues dans les vaisseaux , causeroient des accidens dangereux & funestes.

C'est par les hémorrhoides que se dissipe l'engorgement sanguin & l'humoral de tout le corps, & principalement celui des lombes & des viscères du bas ventre. L'écoulement hémorrhoidal, lorsqu'il ne contrarie pas l'ordre de la nature, garantit de fièvres intermittentes, de maladies cutanées, d'obstructions des viscères, de maladies de poitrine, de douleurs de tête, &c. S'il survient de ces maladies par quelque accident, l'écoulement des hémorrhoides les modère & souvent les guérit.

L'évacuation du sang hémorrhoidal ne se fait pas toujours dans un ordre aussi salulaire, & ne se contient pas dans de justes bornes ; tantôt il ne vient pas dans le tems ordinaire, il ne rend pas assez ou il se supprime, & tantôt il est trop abondant ou excessif. Ce sont autant de sources de maladies qui menacent du plus grand danger ; il en résulte plus d'inconvéniens que l'écoulement ne procure d'avantages lorsqu'il est régulier & constant dans sa régularité. Ce sont des engorgemens des vaisseaux hémorrhoidaux suivis de phlogoses & d'inflammations douloureuses souvent insupportables, quelquefois des ulcères fistuleux qui mettent dans la nécessité d'avoir recours à des opérations chirurgicales, souvent pleines de danger, sur-tout si l'on ne laisse pas quelque vaisseau de ceux qui fournissent l'écoulement, pour en faciliter le retour, s'il est encore nécessaire, pour seconder les vues de la nature. Il en survient aussi des métastases à la tête, dans les viscères de la poitrine & du bas ventre, qui

causent ; à la tête des étourdissemens , des convulsions épileptiques , des démences , des paralysies , des apoplexies , &c ; à la poitrine des toux convulsives , des asthmes , des étouffemens , des inflammations , des hémoptysies , par rupture des vaisseaux ou par anastomose , des Phthysies pulmonaires , &c. au bas ventre des engorgemens inflammatoires , ou des obstructions au foie ; à la rate & aux autres viscères de cette capacité , des affections mélancoliques , des hydropisies , des dyssenteries , des tenesmes & d'autres accidens toujours dangereux , toujours à craindre si l'on n'en prévient le danger par les ressources de l'art.

Si le flux hémorrhoidal est trop abondant , ce sont des pertes qui appauvrissent la masse du sang , qui menent après elles des relâchemens , des atonies des fibres organiques des viscères ; les sécrétions en sont troublées , & les excrétions ne se font qu'irrégulièrement. Il survient de ce désordre des embarras , des obstructions dans les viscères , principalement dans ceux du bas ventre & dans la substance des poumons , il s'ensuit un appauvrissement général de la masse des liquides , des Phthysies nerveuses , des Phthysies pulmonaires ou des hydropisies incurables , &c. Je me bornerai , pour ne pas m'écarter de mon sujet , à donner des exemples des effets du flux hémorrhoidal irrégulier qui donne lieu à la Phthysie pulmonaire.

Wan Swieten a donné l'histoire d'un de ses malades , qui avoit deux ou trois fois dans l'année un

écoulement de sang très-abondant par les hémorrhoides ; on supprima cette évacuation. Peu de tems après il s'aperçut d'une vascillation dans le poulx, ensuite d'une tension à l'hypocondre gauche, qui s'étendoit vers la poitrine : il s'ensuivit une hémoptysie. On fit des tentatives pour rétablir l'évacuation hémorrhoidale, elles furent inutiles, l'hémoptysie se renouvela plusieurs fois avec les mêmes symptômes ; le malade mourut enfin phthistique.

Un honnête Bourgeois de campagne, âgé de trente ans, souffroit depuis quelques années en 1739, d'un engorgement considérable aux hémorrhoides avec un suintement de sang presque continu. De tems en tems le sang en couloit abondamment ; alors il paroissoit pur. Le suintement devint enfin sanieux ; le sphincter de l'anus étoit bouché au point que les garderobes ne pouvoient passer sans causer de vives douleurs. Ce malade étoit fatigué depuis quelque tems par une petite toux sèche, elle devenoit violente & quelquefois convulsive, lorsque le sang ne couloit pas aisément. Il y avoit déjà un mois à ma première visite que la toux étoit humide, & je trouvai les crachats purulens ; la maigreur commençoit à s'établir ; tout indiquoit une Phthisie pulmonaire.

Les secours de l'art étoient devenus impuissans pour le soulagement du malade ; tout imposoit la nécessité d'en venir à l'opération : on la fit avec succès. On eut l'attention de suivre le précepte d'Hippocrate, on laissa un bouton hémorrhoidal,

celui qui paroïssoit le moins disposé à devenir fistuleux. Le malade guérit en peu de tems de l'opération , l'écoulement hémorrhoidal continua par l'hémorrhôïde qu'on avoit ménagée , mais il ne fut plus que très-moderé. Un régime de vie doux & d'autres secours donnés à propos remédièrent aux symptômes alarmans de la poitrine , qui resta enfin sans altération ; le malade jouïssoit quinze ans après d'une santé parfaite ; je l'ai perdu de vue depuis ce tems-là.

Ne paroît-il pas sensible que l'engorgement inflammatoire des vaisseaux hémorrhoidaux étoit la principale cause de la métastase & des symptômes qui menaçoient la poitrine , puisqu'ils se dissipèrent totalement après l'opération ?

Un Chirurgien de Paris, distingué par ses talens, souffroit depuis quelques années d'engorgemens aux vaisseaux hémorrhoidaux ; il s'y forma un ulcere fistuleux qui l'obligea d'en faire l'opération en l'année 1768, à l'âge de trente-trois ans. Il se croyoit parfaitement guéri , lorsque deux ans après il fut pris d'une toux convulsive qui se soutint pendant plusieurs mois, malgré tous les moyens qu'on mit en usage pour y remédier. Il survint un crachement de sang très-abondant, avec de vives douleurs à la poitrine. On calma les douleurs , mais la toux se soutint & la fièvre s'établit ; les crachats devinrent purulens, l'amaigrissement, la prostration des forces étoient extrêmes & la fièvre si considérable qu'on étoit dans les plus justes alarmes ; on désespéroit de ses jours.

La maladie étoit dans cet état alarmant , lorsqu'on m'appela au secours du malade qui eut le bonheur de guérir radicalement ; il jouit encore aujourd'hui de la santé la plus parfaite.

Un Officier de distinction souffre depuis plusieurs années d'hémorrhoides internes & externes ; elles fluent de tems en tems abondamment , & jusqu'à l'affoiblir. Peu de tems après qu'elles ont cessé de fluer , il lui survient des toux importunes suivies d'hémoptysie avec douleur à la poitrine & oppression. Il modere la toux & la douleur par une diète exacte & des boissons adoucissantes , le crachement de sang diminue & il cesse enfin sans qu'il en arrive d'inconvénient. Il n'est pas rare de voir des cas semblables , lorsque le sang qui se porte à la poitrine par métastase , s'y infiltre ou s'y fait des issues par anastomose. On n'a rien à craindre de ces especes d'hémoptysies , pourvu que l'on évite toutes sortes d'excès , & que l'on prenne des précautions convenables pour modérer les symptômes dont elles sont les suites.

CHAPITRE III.

Métastases des secours périodiques des femmes : Cause de Pulmonie.

Les secours périodiques des femmes ne sont pas essentiels à leur existence ; on en a vu de très-robustes à l'âge de soixante ans , qui jamais n'avoient

été réglées. Les regles sont des écoulemens d'un sang préparé par la nature pour la propagation de l'espece humaine, & sans doute pour sa plus grande perfection, puisque les femelles des animaux brutes ne sont pas sujettes à de pareilles évacuations. Ces secours commencent à l'âge de puberté, époque où les femmes sont fécondes ; ils cessent lorsqu'à un âge avancé, vers la quarante-cinquieme année, elles ne sont plus d'enfans. Pendant la grossesse l'écoulement des regles est suspendu, il se rétablit après l'accouchement ; c'est une preuve non-équivoque que cette surabondance de sang est destinée pour favoriser la génération & pour servir à l'accroissement du fœtus, jusqu'à l'accouchement. Les filles, quoiqu'elles ne soient pas réglées, jouissent jusqu'à l'âge de puberté de toute la perfection de leur espece ; les femmes après avoir perdu leurs regles dans l'ordre général, n'en sont point incommodées ; elles reprennent alors, pour ainsi dire, l'existence de leur premiere jeunesse. Cet ordre régulier de la nature ne démontre-t-il pas qu'il n'a été établi que pour la propagation & la perfection de l'espece humaine ?

Comme l'établissement des regles chez les filles opere sur elles un changement considérable, il doit se faire, selon les vues de la nature, sans obstacle & dans des tems déterminés par les différens tempéramens ; autrement la surabondance du sang retenu, qui dégénere bientôt de sa qualité, devient une source de langueurs, de pâles couleurs, de jaunisses,

de fievres lentes, de mouvemens spasmodiques, de convulsions, &c. Si pendant ces détresses le sang se porte à la poitrine, il en résulte des oppressions, des douleurs, des toux, des hémoptysies, des Phthísies pulmonaires, &c.

La cessation des regles dans le tems critique cause aussi quelquefois des dérangemens considérables chez les femmes pléthoriques, chez celles qui se livrent aux passions de l'ame, qui commettent des abus dans le régime de vie, & chez celles sur-tout qui sont cacochymes & dont les viscères du bas ventre sont obstrués. Le sang dont la quantité n'est pas assez diminuée pour ne pas former de pléthore, doit se frayer de nouvelles routes ou forcer les calibres de ses propres vaisseaux, ce qui donne lieu à des engorgemens, à des obstructions, à des tumeurs, des suppurations à la matrice, des pertes en rouge ou en blanc; des cancers, ou bien des toux, des asthmes, des hémoptysies, des Phthísies pulmonaires, &c.

Les secours périodiques des femmes, lorsqu'ils sont établis dans l'ordre général de la nature, sont quelquefois retardés, diminués ou supprimés, par des obstacles qui s'opposent à leur excrétion. Ces dérangemens donnent occasion à des souffrances qui ne cessent que lorsque tout est rétabli par les voies ordinaires, ou par d'autres qui les suppléent. Ce sont des frissonemens, des fievres, des palpitations de cœur, des douleurs de tête violentes; la couleur du visage pâlit, les urines sont chargées, les seins deviennent douloureux & quelquefois ils

sont engorgés de lait ; j'ai vu ce phénomène chez des filles très-chastes dont on ne pouvoit pas soupçonner la vertu. Hippocrate a observé que des femmes dans cet état , ressentent des pésanteurs dans tout le corps , des douleurs aux lombes & aux cuisses , & souvent en d'autres parties.

Lorsque le sang des regles se porte par métastase dans les viscères du bas ventre , il cause des jaunisses , des œdématis aux pieds & aux jambes , des hydropisies , des coliques , &c.

Si le sang se porte à la tête , ce sont des migraines , des vertiges , des mélancolies , des manies , des apoplexies ; s'il se porte dans les parois du ventricule , ou dans les membranes du diaphragme , il en résulte des engorgemens douloureux , des éréthismes flatueux & spastiques , des cardialgies , des vomissemens de sang , des spasmes , des convulsions qui accomplissent un désordre général dans le système des nerfs. Si le sang est déterminé vers l'extérieur du corps , on voit bientôt s'y élever des tumeurs , des éruptions , s'y former des ulcères ; si la métastase se fixe à la poitrine , le sang engorge le cœur & les vaisseaux des poumons , il s'ensuit des palpitations , des syncopes , des oppressions , des asthmes , des suffocations , des hydropisies , des hémoptysies , des Phthysies pulmonaires.

Comme la cause principale de ces symptômes consiste en une pléthore générale ou particulière des viscères du bas ventre , les malades ne peuvent être soulagées efficacement que par une hémorrhagie. La

nature y pourvoit, par d'heureuses tentatives & le sang se fraie des issues par la dilatation des vaisseaux de quelque partie de quelque viscere. Souvent ces hémorrhagies suppléent aux regles diminuées ou supprimées, elles ont des retours périodiques, comme si elles étoient exactement dans l'ordre des secours ordinaires. D'après ces observations, Hippocrate a reconnu que si, dans la suppression des regles, il survient une hémorrhagie par le nez, elle est ordinairement salutaire. Celles de cette nature qui se font par d'autres parties, & même par les poumons & par l'expectoration le font également lorsqu'elles se font par anastomose.

Hoffman rapporte l'exemple d'une femme de condition dont les regles s'étoient supprimées tout-à-coup, par une grande peur dont elle fut prise, dans le tems où cette évacuation étoit abondante; il s'ensuivit une pesanteur à la poitrine, des inquiétudes dans les entrailles, des palpitations violentes. La période ensuite, les regles furent très-médiocres, il survint un crachement de sang qui dura quatre jours. Cette hémoptysie suppléa pendant neuf ans à l'écoulement des regles qui ne parurent plus; elle cessoit pendant les grossesses, & pendant que cette tendre mere allaitoit ses enfans; elle revenoit ensuite dans l'ordre ordinaire, comme auparavant.

Skenkius a vu dans les suppressions des regles, le sang couler par les oreilles, Hollier par les gencives & les alvéoles; d'autres par le vomissement; je l'ai vu couler par un mamelon: il arrive bien

plus fréquemment qu'il se fraie des issues par les poumons & qu'il est rejeté par l'expectoration.

Malgré de tels exemples qui sont très-fréquens & souvent salutaires , tout écoulement de sang qui supplée aux regles , peut devenir dangereux , surtout lorsque les viscères ou toute autre partie essentielle à la vie , sont le siège de cette évacuation extraordinaire.

Les femmes dont les regles se suppriment , ne sont pas toutes également heureuses ; le sang forcé dans ses voies ne se porte pas extraordinairement dans les poumons sang danger ; il s'arrête dans ce viscere , il s'y dévoie , il y croupit & s'enflamme ; il s'ensuit des hémoptysies , des ulcères , des Phthysies pulmonaires qui menacent du plus grand danger.

Les filles avant d'être réglées , sont exposées à de pareils accidens , de même que les femmes après que les regles ont cessé dans leur tems critique.

Ces hémorrhagies sont suivies le plus souvent , de fievres , de phlogoses , d'inflammations , de douleurs à la poitrine , de toux , d'ulcères , de suppurations contagieuses , d'amaigrissement général & d'une extinction totale , toujours inévitable , à moins que les ressources de la nature & les secours de l'art ne préviennent ses funestes progrès. L'observation suivante est de *Heurnius*.

Une fille âgée de 38 ans prit beaucoup de lait froid , étant dans ses regles qui étoient abondantes ; ce lait resserra les vaisseaux de la matrice au point que l'écoulement cessa. Le sang se porta par mé-

tafale , dans les poumons & dans les viscères de l'abdomen. Il s'ensuivit un crachement de pus , une fièvre hectique & la mort. On trouva à l'ouverture du corps , le foie & le pancréas très-pâles , la rate plus petite que dans l'état naturel ; l'ovaire gauche plein de sérosité , le droit comme squirreux , le corps de la matrice contracté & desséché.

Heurnius ne parle pas dans son observation de l'état des viscères de la poitrine , cependant la malade avoit une fièvre hectique , elle crachoit le pus & il n'existoit pas dans le bas ventre des marques de suppuration ; ce pus ne pouvoit donc venir que de la substance des poumons.

Une fille âgée de dix-huit ans , mourut à Geneve d'une Phthisie pulmonaire , qui étoit survenue d'une suppression des règles ; on ouvrit le corps , l'épiploon étoit pourri & déchiré , les intestins remplis de vents & transparens , le foie blanchâtre & plus volumineux que dans l'état naturel ; la rate ne paroissoit pas altérée ; le mésentère étoit très-maigre & couvert de glandes engorgées. La face externe des poumons paroissoit dans l'état naturel , mais le lobe droit étoit dans l'intérieur totalement pourri , il ressembloit à un sac rempli de pus. A tous ces désordres s'étoit jointe une hydropisie de poitrine & de bas ventre ; cependant la capacité de l'abdomen n'étoit pas plus volumineuse que dans l'état naturel : le péricarde contenoit aussi beaucoup d'eau. Cette observation est de Bonet , & la suivante de Hoffman.

Une femme âgée de vingt ans, souffroit d'une douleur à l'hypocondre gauche; elle avoit depuis long-tems une toux humide, il lui survint une hémoptysie : on se servit sans doute d'astringens pour l'arrêter. L'hémorrhagie cessa, & les regles qui auparavant étoient abondantes se supprimerent pour toujours. La respiration devint difficile, il s'ensuivit une oppression & une prostration de forces considérable; la toux devint plus forte & plus fréquente, elle fit des progrès pendant plus d'un an. La malade rendit ensuite des crachats purulens mêlés de sang & d'une mucosité gluante; elle tomba dans une inappétence considérable, & elle maigrissoit à vue : la chaleur fébrile augmentoit tous les jours, & le pouls devenoit plus fréquent sur-tout après avoir pris de la nourriture. La malade étant dans ce triste état, appela Hoffman qui la guérit.

La Phthisie pulmonaire qui provient de la suppression des regles, est susceptible de guérison; principalement si les regles se rétablissent par les voies ordinaires ou par d'autres qui les suppléent. Cette maladie est beaucoup plus dangereuse lorsqu'elle est la cause de la suppression, elle est même alors regardée comme incurable. Cependant on trouve chez différens auteurs des observations sur des Phthisies désespérées guéries par les secours de l'art; j'en ai vu moi-même pendant le cours d'une pratique d'un demi siècle. On est bien plus heureux lorsqu'on prévient de telles suppressions, en prenant

la maladie dans ses commencemens, avec connoissance de son caractère & de ses causes.

CHAPITRE IV.

Métastase des lochies à la poitrine : Cause de Pulmonie.

ON entend par lochies l'écoulement de sang & d'humeurs qui se fait immédiatement après l'accouchement, par les voies de la génération. Les vaisseaux de la matrice se dilatent extrêmement chez les femmes grosses ; la substance cellulaire de ce viscere favorise leur dilatation. Ces vaisseaux reçoivent dans leurs calibres une quantité considérable de sang & d'humeurs ; leur circulation s'y fait très-lentement & souvent avec une extrême difficulté. Ce sang & ces humeurs sont destinés pour la nourriture du fœtus, & comme ils ne sont jamais consumés en totalité, ce qui en reste y acquiert de la densité & dégénere de sa pureté.

Le sang des lochies paroît d'abord naturel ; son écoulement dans l'ordre ordinaire ne cause point de douleur ; il diminue en quantité quelques heures après l'accouchement, il coule plus lentement & se forme en caillots. Vers le quatrième ou cinquième jour, les lochies cessent ordinairement d'être rouges ; à mesure que la couleur rouge diminue elles deviennent séreuses ; elles diminuent encore lorsque la fièvre de lait commence, & lorsqu'elle a cessé elles reprennent leur cours ordinaire. Alors elles deviennent

laiteuses & comme purulentes ; quelquefois elles sont verdâtres sans que pour cela elles aient de mauvais caractère ; on le connoît en ce que les femmes se portent bien d'ailleurs & qu'elles n'ont point d'incommodité qui puisse donner lieu à cette couleur extraordinaire.

Il est des femmes en couche chez lesquelles la couleur rouge des lochies n'a presque point lieu ; chez d'autres elles restent plus ou moins colorées , & quelquefois sanguinolentes pendant des mois. On en a vu qui ont duré pendant un an ; elles sont suivies alors de fleurs blanches dont la guérison est très-difficile & très-incertaine. Il est des femmes , c'est un cas rare , qui n'en ont que très-peu sans en être incommodées : la nature les supplée alors par de copieuses sueurs , ou par des cours de ventre , sans quoi on auroit à craindre pour les suites de cette suppression.

Le sang des lochies retenu après l'accouchement , devient étranger à la nature des liquides animaux ; il est de nécessité qu'il soit évacué ; s'il ne l'est pas en totalité , il en résulte des maux infinis ; ce sont des inquiétudes générales dans tout le corps , des érétismes douloureux de l'abdomen ; des douleurs , des pesanteurs de tête , aux reins & aux lombes ; il s'ensuit des oppressions , des palpitations de cœur , des spasmes , des convulsions , des délires , des manies , des tranchées violentes , des vomissemens , des inflammations , des fièvres aiguës & souvent éruptives de mauvaise nature. Lorsque ces maladies ne sont pas bien jugées , il en reste souvent à la poitrine des

impressions qui menent à des Phthisies pulmonaires d'autant plus dangereuses que leur cause a été alarmante.

Les lochies trop diminuées ou supprimées se portent ordinairement par métastase dans quelque autre viscere ; alors la matrice est moins douloureuse qu'elle ne l'étoit auparavant , les douleurs se font ressentir dans le viscere où s'est faite la métastase. Si c'est dans le bas ventre , l'abdomen se météorise ; si c'est dans les poumons , le bas ventre reste tendu s'il l'étoit auparavant ; mais la tension ne fait pas de progrès. La métastase des lochies à la poitrine se manifeste dans l'instant par une toux violente , par une oppression & une suffocation cruelles : la fièvre s'allume rapidement , l'inflammation & de vives douleurs précèdent la gangrene qui se manifeste en peu de tems ; lorsqu'il n'est pas possible de la prévenir par les secours de l'art , la mort en est une suite inévitable.

Les symptômes de ces métastases ne sont pas toujours portés à un point aussi extrême , mais ils sont souvent dans les visceres des impressions qui laissent après elles des sources de maladie chroniques , dont les effets pour être lents n'en sont pas moins dangereux , principalement lorsque les lochies sont de mauvaise qualité. Ce sont des dérangemens dans l'ordre des digestions , des cacochymies , des cachexies , des tumeurs à la matrice , des ulceres , des cancers , des obstructions au foie , au mésentere : si les métastases se font dans les poumons , il s'ensuit des toux violentes , des varcies , des hémoptysies , des

tubercules, des abcès, des ulcères, des suppurations, des fièvres lentes étiques, des sueurs colliquatives, &c.

L'évacuation des lochies est dérangée, suspendue, arrêtée ou supprimée par la contraction des vaisseaux de la matrice ; tout le système des nerfs dans le premier tems des couches est d'une irritabilité la plus exquise ; tout excès l'agace, toute surprise le met dans l'irrégularité, dans le désordre. Les passions de l'ame, les contrariétés, un froid léger, des odeurs fortes ; tout est en état de resserrer, de contracter les pores excrétoires de ce viscere, qui après l'accouchement sont sensibles, entr'ouverts & béants. Il n'en faut pas davantage pour arrêter l'écoulement des lochies & pour donner lieu à tous les symptômes qui proviennent de leur suppression.

Ces causes de suppression des lochies, quoiqu'elles soient pleines de danger, sont souvent moins redoutables & moins funestes que le régime de vie mal entendu des femmes en couche, qui se gouvernent par des préjugés & par leur propre penchant, pour ne pas dire par leurs passions. Une nourriture trop recherchée, des alimens pris mal à propos, ou qui flattent le goût par des préparations incendiaires ; des boissons fortes, des liqueurs spiritueuses propres à roidir les fibres des solides & à détruire l'élasticité du système membraneux des vaisseaux de la matrice, ne sauroient que mettre dans le désordre des évacuations nécessaires, & causer de mortelles suppressions.

Pourroit-on voir sans plaindre l'humanité des

gens de l'un & de l'autre sexe, sans lumieres, sans connoissances, oser gouverner des femmes en couche, même dans leurs incommodités & dans leurs maladies ? Cette dangereuse témérité fait un des malheurs de ce siecle ; elle est funeste à l'espece humaine, elle concourt à la dépopulation. Les lochies mal gouvernées font périr les femmes en couche, les plongent dans la langueur, ou bien les rendent stériles ou les disposent à des avortemens.

Une femme âgée de trente ans, d'un tempérament sanguin, avoit accouché heureusement, il ne s'écouloit de la matrice qu'une sérosité limpide. On eut d'abord recours à des remedes toniques & apéritifs, la fièvre s'alluma, elle étoit violente ; le bas ventre se météorisa & devint douloureux. Ces remedes donnés imprudemment avoient mis la malade dans le plus grand danger. Hoffman fut appelé, il eut recours à la saignée, aux remedes émolliens, aux rafraîchissans, aux calmans ; il survint le septieme jour une sueur abondante qui dura deux fois vingt-quatre heures, & la malade guérit.

Une jeune femme colérique, accoutumée à boire de la biere & du vin, accoucha heureusement, mais les lochies s'arrêtèrent d'abord après l'accouchement ; les forces s'abattirent, les entrailles devinrent douloureuses & ardentes ; ces symptômes amenoient après eux des anxiétés, des oppressions, &c.

On donnoit à cette malheureuse femme, dans la vue de rétablir l'évacuation supprimée, de la poudre

de myrrhe , de l'écorce d'orange , des yeux d'écrévisse , de l'ambre jaune , de l'huile de canelle , du fel volatil de corne de cerf dans l'eau de canelle.

Ces drogues supprimèrent les urines , procurèrent une constipation obstinée , & augmentèrent sans doute les obstacles qui s'opposoient à l'écoulement des lochies. Après six jours d'insomnie , les yeux devinrent vifs , hagards , & le visage rouge & animé. C'étoient les préludes d'un délire si furieux que la malade se leva de son lit , s'échapa dans la rue où elle couroit dans un tems des plus rigoureux sans sentir la moindre impression de froid ; elle avoit au contraire les extrémités brûlantes. On appela un Médecin dans cet état déplorable , il la fit saigner du pied , lui fit prendre des émulsions & lui procura du sommeil. Il survint une sueur abondante qui dura huit jours. La violence de la maladie se modéra par ces secours , mais la malade n'en guérit point , il lui en resta une fièvre lente qui dégénéra en érique & termina , vers l'équinoxe d'automne , des jours rendus malheureux par des remèdes incendiaires donnés mal à propos.

J'ai déjà observé que les sueurs & les diarrhées sont les crises les plus salutaires dans la suppression des lochies ; les deux observations précédentes démontrent les bons effets des sueurs ; Bartholin confirme dans la suivante , que ceux des diarrhées ne sont pas moins heureux.

La femme de ce savant Médecin avoit accouché très-heureusement , les lochies furent très-médiocres

dans cette couche, elles avoient été abondantes dans celles qui l'avoient précédée. Il survint une diarrhée qui dura quelques jours sans que les forces en fussent diminuées ; cette diarrhée suppléa à l'évacuation utérine, sans qu'il en arrivât d'inconvénient.

Un nombre d'Auteurs ont donné des observations semblables, j'en ai fait moi-même plusieurs qui les confirment. J'ai vu sur-tout des femmes dont l'esprit étoit égaré, à la suite de maladies occasionnées par la suppression des lochies. Elles restoient dans cet état de démence pendant une année & quelquefois plus long-tems ; elles recouroient ensuite leur esprit & leur raison. J'en ai vu mourir de Phthisie pulmonaire à la suite de la diminution & de la suppression des lochies ; j'en ai vu guérir, mais plus rarement qu'on ne guérit des pulmonies provenant de toute autre cause. Ne sont-ce pas des raisons bien essentielles pour mettre scrupuleusement en usage les moyens propres à les prévenir, lorsque les femmes en couche sont menacées ou affligées de métastases de cette nature,

C H A P I T R E V.

*Métastase du lait, ou Dépôt laiteux à la poitrine :
Cause de Pulmonie.*

ON entend par dépôts laiteux, des engorgemens formés par le lait accumulé ou condensé dans ses propres vaisseaux, dans des vaisseaux de différens genres, ou extravasé dans le tissu cellulaire,

Il se fait des dépôts laiteux par métastase dans les différens viscères & en différentes parties du corps ; j'en ai traité assez au long dans le livre sur les maladies des femmes en couche , je ne ferai mention dans ce chapitre que de ceux qui affectent les viscères de la poitrine & qui causent des Phthysies pulmonaires.

Les métastases du lait dans la poitrine , sur-tout au commencement des couches , lorsqu'il est abondant , causent des phlogoses , des inflammations dans la partie où s'est formé le dépôt ; si c'est à la plevre , au médiostin , à la membrane qui recouvre les poumons , ce sont des pleurésies ; si c'est dans la substance de ce viscère , ce sont des péripleumonies. Ces maladies , si elles ne sont pas parfaitement jugées , peuvent occasionner , & occasionnent souvent , des Phthysies pulmonaires. Le danger est imminent dans les maladies aiguës de ce caractère , elles sont terminées en peu de tems ; quand on a le bonheur d'en guérir , elles laissent souvent après elles dans les glandes des poumons des embarras , des engorgemens propres à occasionner des Phthysies.

Les métastases qui se font par le tissu cellulaire ne sont pas d'abord inflammatoires , elles se manifestent par de petites toux seches , qui ensuite deviennent humides & enfin purulentes , avec tous les symptômes qui caractérisent la Phthysie pulmonaire. Il en est de même des engorgemens glanduleux qui restent après les maladies aiguës de la poitrine , ils grossissent peu à peu , y forment des tubercules , des

érosions, des ulcères ; de-là, des toux, des phlogoses, des crachemens de sang, de pus, &c.

Tout ce qui est propre à occasionner les métastases des secours périodiques & des lochies, peut en causer de laiteuses & de dépôts de lait. Les métastases laiteuses reconnoissent une cause particuliere que la nature n'adopta jamais, parce qu'elle est opposée à sa prévoyance & à la sagesse de ses loix. C'est le pernicieux usage où sont les femmes d'étouffer leur lait quand elles ne nourrissent pas leurs enfans. Toutes les sources de cette substance alimentaire sont ouvertes après l'accouchement ; les mammelles en sont le réservoir précieux, préparé par la nature pour continuer la nourriture d'un être formé dans les entrailles d'une mere tendre. Ce lait est fourni aux seins en abondance, on l'arrête dans ses réservoirs délicats, ils en sont engorgés & douloureux ; ses issues lui sont fermées, il est forcé de prendre un cours rétrograde & des routes opposées à ses directions naturelles. Il pénètre indifféremment dans les vaisseaux de tout genre, dans le tissu cellulaire, & il est par-tout étranger, onéreux & opposé aux loix de la nature.

Le lait qui séjourne dans les vaisseaux qui lui sont propres, s'y condense, s'y alkalise, s'y corrompt & devient contagieux aux autres liquides animaux ; quels effets ne doit-il pas faire sur ces liquides lorsqu'il est dévoyé dans des vaisseaux qui lui sont étrangers ? Il ne peut qu'en altérer la qualité & fournir autant de principes de maladies que ces

liquides sont propres à contracter des vices de différens caracteres. Le lait ainsi dévoyé, dégénere ; il ne fauroit franchir des routes opposées à ses directions naturelles , il s'arrête , tantôt dans le tissu cellulaire où il forme de gros dépôts, tantôt dans les glandes qu'il engorge , & souvent dans les vaisseaux capillaires membraneux , où il fournit des sources intarissables de douleurs & de souffrances.

La nature après avoir été ainsi contrariée , tarit enfin les sources laiteuses ; mais il est rare qu'elle remédie aux dangereuses impressions qu'un lait dégénéré a déjà faites sur des liquides qu'il a altérés , & sur des solides qu'il a rendus délicats , sensibles & susceptibles des plus légères irritations.

C'est de là que proviennent les regles irrégulieres ou leur suppression ; c'est de là que prennent leur source les pertes blanches , les dérangemens des digestions, les jaunisses, les obstructions, les tumeurs des viscères, les excroissances polypeuses, les schirres de la matrice , les douleurs vagues dans tout le corps, ou particulieres à quelque partie, à quelque viscere.

Les métastases laiteuses peuvent avoir lieu jusqu'à ce que les sources du lait soient taries ; ce fluide se porte & se répand jusqu'alors par-tout où l'entraînent des directions contre nature. Ce n'est plus ensuite le lait qui forme des dépôts, qui cause des douleurs & d'autres accidens que des vendeurs de secrets attribuent toujours au lait répandu ; ce sont au contraire des effets des vices que les liquides & les solides

ont contractés de la dépravation de ce suc alimentaire qui n'existe plus, mais qui a laissé après lui des principes de maladies ou de langueurs.

Les Phthísies pulmonaires peuvent provenir de ces deux causes, du lait répandu & de ses effets, qui subsistent après lui; il seroit dangereux de ne pas les distinguer en prenant de leurs symptômes de justes indications curatives. On tomberoit, en manquant à cette attention, dans les écueils dangereux où entraînent le charlatanisme & la cupidité qui ne peuvent qu'avilir & rendre méprisables ceux qui ont le malheur d'en être susceptibles.

Les promptes métastases du lait dans le tissu cellulaire ou dans les vaisseaux de la poitrine, étouffent tout-à-coup les malades, ou donnent d'abord des frissons généraux dans tout le corps, la fièvre, une toux violente, des oppressions, des crachats sanguinolens & purulens. Les urines deviennent ar dentes & déposent un sédiment considérable: il survient des anxiétés & des inquiétudes générales; les yeux se gonflent, s'enflamment & deviennent faillans; les mammelles se flétrissent. Ce sont les symptômes ordinaires des dépôts laiteux inflammatoires dans les viscères de la poitrine.

Si à la suite de ces maladies il reste une petite toux qui se soutienne pendant quelque-tems dans cet état, si ensuite elle devient plus fréquente, & si la malade ne reprend pas de l'embonpoint, on doit craindre une Phthísie pulmonaire; la toux devient humide & les crachats purulens, la pul

monie est décidée , il s'ensuit des ulcères , des supurations , une fièvre lente , le marasme , &c.

Si la toux avoit commencé avant la maladie aiguë , ou si elle ne s'établit que quelque tems après qu'elle a été parfaitement jugée , on doit l'attribuer à des érosions qui dégénèrent en ulcères , ou à des tubercules dans la substance des poumons , qui , en faisant des progrès , parcourent tous les tems des Phthysies pulmonaires.

Madame accoucha dans le mois de Mai de l'année 1769 , son accouchement fut naturel & ses couches très-heureuses , quoiqu'elle eût étouffé son lait & que les évacuations ordinaires eussent été médiocres. Elle se croyoit si parfaitement rétablie qu'elle voulut faire ses relevailles le vingt - unième jour après son accouchement. En descendant l'escalier de sa chambre pour aller à l'église , elle fut saisie tout-à-coup d'un étouffement si violent qu'elle en mourut dans quelques minutes.

Le lendemain on fit en ma présence l'ouverture du corps ; les viscères du bas ventre étoient très-sains & sans la moindre flétrissure ; ceux de la poitrine l'étoient de même , à l'exception des poumons dont toute la superficie étoit livide & parsemée de taches violettes. On fit un nombre de taillades sur les lobes de ce viscère , à chacune il découloit une source de lait qui ne paroissoit point altéré ; il en couloit aussi abondamment des bronches & des vésicules bronchiques , sur-tout quand on les comprimoit avec la main ; de sorte que ce viscère étoit totalement infiltré & engorgé de ce fluide.

Je fus appelé le quinze du mois de Juillet de l'année 1760, pour une Dame qui avoit accouché six semaines auparavant, & qui avoit étouffé son lait ; son accouchement & ses couches avoient été très-heureux. Elle avoit été prise comme subitement, la veille de ma première visite, d'un serrement douloureux de poitrine, d'une toux violente, d'un frisson & d'une fièvre alarmante, par la détresse & les inquiétudes dont elle souffroit dans tout le corps.

La fièvre étoit la même à mon arrivée auprès de la malade, les intervalles de la toux n'étoient jamais de trois secondes, & l'oppression étoit étouffante. Je modérai ces symptômes par les saignées, les délayans, les calmans, &c. La malade n'étoit pas à Paris, on l'y conduisit avec beaucoup de peine, je lui donnai des soins assidus pendant environ six semaines, & sa santé se rétablit totalement. Il n'est pas douteux que cette maladie des poumons ne fût l'effet d'une métastase laiteuse inflammatoire.

Madame S... accoucha dans le mois d'Avril de l'année 1780, elle étouffa son lait, cependant ses couches furent heureuses ; elle jouissoit en apparence d'une bonne santé, lorsque dans le mois de Juin elle fut prise d'un gros rhume qui dans quelques jours fut suivi d'un crachement de sang, le pus vint ensuite ; elle continua d'en cracher abondamment. La malade étoit alarmée de son état avec d'autant plus de raison qu'elle dépérissoit à vue.

Je fus appelé le 20 de Décembre pour M. son frère qui avoit la petite vérole, je vis la malade

par occasion, elle me consulta sur son état, dont on disoit qu'elle n'avoit rien à craindre. Je lui trouvai de la fièvre, ses crachats étoient du vrai pus, quelquefois mêlé avec du sang ; sa maigreur étoit déjà considérable, elle avoit une sensation d'érailllement vers la partie intérieure moyenne du sternum, & d'ailleurs tous les symptômes d'une Phthisie pulmonaire au troisième degré. Je ne pus me dispenser de dire sa situation à ses parens ; ils en furent alarmés & me prièrent de suivre exactement cette maladie ; c'étoit dans les premiers jours du mois de Décembre ; la malade guérit radicalement dans l'espace de quatre mois : elle jouit depuis ce tems - là d'une santé parfaite.

CHAPITRE VI.

Métastases des fleurs blanches dans le viscere de la poitrine.

ON entend par fleurs blanches des suintemens ou des écoulemens par les parties naturelles des femmes, d'humeurs aqueuses, séreuses, lymphatiques, mucueuses, bilieuses ou laiteuses qui prennent différens caractères, différentes couleurs, différentes odeurs ou différens degrés de fétidité selon la différence des causes qui les produisent, ou selon qu'elles sont plus ou moins invétérées.

Ces écoulemens ne sont pas dans l'ordre de la nature ; on doit les considérer comme des pertes

qui dérangent les fonctions animales, qui débilitent ou épuisent plus ou moins selon leurs qualités & selon les différens degrés de leur abondance & de leur durée. Elles conduisent quand elles sont excessives à un état de langueur, souvent alarmant & quelquefois funeste. Lorsque l'écoulement des fleurs blanches est diminué ou supprimé par quelque accident ou par quelque drogue donnée mal à propos, il s'en fait des métastases dans quelque viscère & ordinairement dans ceux de la poitrine où elles causent des tubercules, des érosions, des suppurations des Phthisies pulmonaires que l'on reconnoît par les mêmes symptômes qui caractérisent celles qui sont occasionnées par la suppression des regles. Hippocrate, & après lui les Médecins observateurs, ont toujours regardé les fleurs blanches invétérées comme un commencement de cachexie, sur-tout lorsqu'elles sont purulentes : il seroit dangereux alors de les faire cesser ou de les tarir sans en avoir dissipé la cause.

J'ai traité dans le plus grand détail des fleurs blanches, de leurs causes, de leurs différences, de leurs différens caractères, des accidens qu'elles occasionnent & des moyens d'y remédier. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit dans cet ouvrage, je me bornerai aux observations suivantes sur des Phthisies pulmonaires qui dépendent du dérangement ou de la suppression de cet écoulement.

Une Dame âgée de vingt-cinq ans étoit fatiguée depuis quatre ans de fleurs blanches abondantes & irritantes,

irritantes , au point de causer des douleurs & des élancemens au bas ventre & aux cuisses , qui l'empêchoient de se tenir assise ; ces pertes rendoient ses digestions lentes & pénibles , elle vomissoit beaucoup de sérosités. On lui conseilla l'usage de certaines pilules où l'on disoit qu'il entroit de l'ipécacuanha ; ce remede pernicieux supprima les fleurs blanches. A peine l'écoulement avoit cessé qu'il survint une toux importune qui bientôt fut violente ; les crachats étoient d'abord lymphatiques , ils devinrent sanguinolens ; il s'établit assez promptement un crachement de pus , une fièvre lente : la Phthisie fit des progrès rapides & fut terminée par la mort.

On fit l'ouverture du corps ; on trouva les intestins grêles extrêmement boursoufflés & dilatés , les gros étoient très-resserrés & le mésentère parsemé de glandes obstruées. La plevre étoit adhérente aux poumons dans toute leur étendue. On découvrit d'abord dans le poumon gauche deux glandes de la grosseur d'une noix ; la substance qu'elles contenoient étoit semblable à du suif. Après avoir détruit l'adhérence de ce poumon , il en sortit environ une cuillerée de matiere fétide & purulente , provenant d'un kiste qui répondoit à l'une des glandes engorgées. Ce kiste formoit un sinus très-considérable , qui s'étendoit depuis la partie supérieure du lobe , jusqu'à l'inférieure ; sa cavité avoit assez de diamètre pour y introduire quatre doigts. Ce poumon étoit parsemé d'ulcères & de tubercules dans toute sa substance , qui étoit engorgée d'une sanie

semblable à la lie de vin. L'extrémité inférieure étoit adhérente au diaphragme, elle paroissoit cartilagineuse. Les lobules du poumon droit étoient confondus les uns avec les autres, adhérens au diaphragme & parsemés de tubercules crus & purulens.

Une Dame fut prise de fleurs blanches, dans l'année 1761, elles devinrent abondantes & très-âcres; vers la fin de l'année 1765 elle fut saisie d'une frayeur soudaine, c'étoit vers la fin de ses regles; tout à coup les fleurs blanches cessèrent, elles reparurent après la période suivante des regles, & continuerent avec la même abondance qu'auparavant.

Dès le moment que cet écoulement fut suspendu la malade ressentit des douleurs au dos & à la poitrine, vers le cartilage xiphoïde; il survint peu de tems après une petite toux sèche, des crachats teints de sang & d'autres symptômes d'une Phthisie pulmonaire, la toux & la douleur de poitrine diminuèrent & cessèrent enfin par le moyen d'un régime de vie très-exact & de remèdes donnés à propos. Quelque tems après les fleurs blanches diminuèrent & changerent de caractère; il n'en resta qu'un léger suintement qui ne fut plus incommode, & qui au contraire lui a été très-salutaire dans son tems critique, qu'elle a passé sans inconvénient.

Une femme d'une famille distinguée, âgée de vingt-cinq ans, s'étoit livrée pendant sa première jeunesse à un régime de vie très-mal entendu; elle

mangeoit par jour jusqu'à quatre gros melons , elle buvoit par-dessus de l'eau de fontaine froide , & pendant la nuit elle prenoit des bains froids. Elle se maria , changea d'air & de régime de vie. Il se forma un abcès sous l'aisselle du côté gauche , que l'on guérit ; il survint ensuite une galle sèche & des fleurs blanches. La malade ennuyée de ces incommodités demanda conseil à une femme qui se mêloit de donner des remèdes ; cette femme lui fit prendre des bains astringens où entroient du vitriol & de l'alun ; elle donna d'autres drogues , sans doute , de la même nature qui arrêterent l'écoulement.

Trois jours après que cette évacuation fut arrêtée il se forma aux deux côtés du cou de grosses & de petites tumeurs scrophuleuses ; il s'ensuivit une toux violente , des ulcères aux poudrons & une fièvre étiqne : le pus qu'elle expectoroit étoit sanguinolent. Cette Phthisie étant déjà établie , il se manifesta une hydropisie qui fut suivie d'une dyarrhée séreuse & bilieuse , & de la chute des cheveux. Six mois se passèrent dans les perplexités & les alarmes sur le compte de cette malade ; tous les jours on s'attendoit à son dernier moment ; cependant elle guérit par l'usage des remèdes fortifiants.

Cette observation est rapportée dans la seconde année des Éphémérides des Curieux , & dans le quatrième volume de la Bibliothèque pratique de Manget.

Il est fâcheux que l'auteur de cette observation n'ait pas donné la méthode curative qu'il employa

pour obtenir une guérison aussi heureuse qu'elle paroïssoit être désespérée. Il a dû en être surpris lui-même , puisqu'elle ne s'accorde pas avec l'aphorisme d'Hippocrate qui dit que la diarrhée & la chute des cheveux dans une Phthisie confirmée , sont des signes certains d'une mort prochaine. De telles diarrhées quand elles sont critiques & qu'elles tiennent lieu de crises parfaites , sortent des regles générales ; ce sont des phénomènes qui tiennent uniquement aux ressources de la nature , & dont elle seule peut donner raison.

C H A P I T R E V I I .

Métastase dans les poumons ; du pus des ulcères & de la matière des tumeurs : Cause de pulmonie.

LES ulcères sont des solutions de continuité dans les parties molles , avec écoulement de pus.

Les tumeurs sont des élévations contre nature , qui surviennent dans quelque partie du corps.

Les tumeurs & les ulcères spontanés viennent d'une cause interne étrangère à la nature , qui la détermine vers la superficie du corps pour qu'elle ne devienne pas nuisible à la régularité de ses fonctions. Les ulcères & les tumeurs de cette nature , proviennent d'humeurs scorbutiques, vénériennes, scrophuleuses, cachectiques, &c. toujours étrangères à la masse des liquides & propres à altérer le système des solides. Le pus que rendent ces ulcères , & les ma-

tières qui ont formé ces tumeurs , sont plus ou moins irritans , rongeurs , ou caustiques , selon leurs différens caractères. Les uns & les autres , ou suppurent ouvertement , ou forment insensiblement des suppurations qui ne se manifestent que lorsqu'elles ont acquis un degré de maturité propre à percer & à se répandre au-dehors. La matière que rendent ces ulcères & celle de ces tumeurs , étant suspendue , arrêtée ou répercutée , & ne pouvant franchir les obstacles qui s'opposent à son écoulement , se porte par métastase dans quelque autre partie , le plus souvent dans quelque viscère , & principalement dans ceux de la poitrine , où elle forme des engorgemens , des tubercules ou des érosions qui dégénèrent en ulcères , en suppurations , & qui établissent successivement tous les symptômes des Phthysies pulmonaires.

Les métastases de la matière des tumeurs accidentelles & du pus des ulcères , qui sont des effets de causes extérieures , sont moins à craindre que celles dont la matière & le pus tiennent leurs principes de causes internes ; cependant elles sont toujours dangereuses , sur-tout après de longues suppurations ; j'en rapporte des exemples.

Un Chirurgien sexagénaire portoit depuis vingt ans une fistule à l'anus , qu'il conservoit avec soin pour lui servir de cautère , d'autant mieux qu'elle ne l'incommodoit pas : cet ulcère se cicatrisa de lui-même. Le malade fut pris tout-à-coup d'une toux sèche très-importune ; il négligea ce symptôme

pendant plusieurs mois , jusqu'à ce qu'il s'apperçût qu'il avoit une fièvre étiq̃ue & qu'il maigrissoit considérablement. Peu de temps après il fut accablé de tous les symptômes d'une Phthisie pulmonaire confirmée. Dans ce triste état , le malade appella Manget , qui a donné cette observation , mais trop tard pour que les secours de l'Art pussent lui être de quelque utilité. Il avoit déjà des marques d'une colliquation générale , & il étoit dans le dernier degré de marasme ; il mourut quelques mois après.

Un homme âgé de quarante-quatre ans , d'un tempérament sanguin & colérique , souffroit depuis quelque-tems des hémorroïdes qui , s'étant extrêmement engorgées , lui caufoient des douleurs insupportables. Il appella un Chirurgien qui lui appliqua des caustiques extérieurement ; il y détermina un ulcere fistuleux de mauvais caractère , qui le fit souffrir cruellement pendant plus d'un an.

On appela enfin les Médecins & les Chirurgiens qui avoient la meilleure réputation ; ils se déterminèrent à faire couper le bourlet hémorroïdal ; ils mirent en usage les remèdes intérieurs , les plus propres à consolider l'ulcere. A peine un mois s'étoit-il passé depuis l'opération , que le malade fut pris d'une toux fréquente avec expectoration de matieres visqueuses & purulentes ; d'ailleurs les viscères du bas ventre étoient tellement irrités , qu'il vomissoit presque tous ses alimens , & il avoit une grande difficulté de respirer : il étoit menacé de marasme , ses forces diminuoient , l'appétit étoit tombé & les garderobes devenoient liquides.

Comme les remèdes n'avoient point le succès qu'on en attendoit , on appela Hoffman qui eut le bonheur de guérir le malade dans l'espace de six semaines.

Un homme de Geneve , âgé de trente-six ans , Capitaine dans les troupes Françoises , fit une chute sur la glace dans l'année 1736 ; elle occasionna une hémorragie par le nez , si considérable , qu'il paroissoit dans un état de mort. Il s'ensuivit une si grande foiblesse dans la tête , & une ophtalmie qui avoit rendu les paupieres si difformes , qu'on fut obligé d'appliquer un seton à la nuque. Ce seton inquiétoit le malade ; il le supprima , & reprit un régime de vie défordonné , tel que celui où il s'étoit livré avant son accident ; il lui survint une toux , une hémoptysie , un crachement de pus , une Phthisie confirmée qui le conduisit à son dernier moment.

On trouva dans la capacité du thorax une férofité très-âcre , un abcès considérable dans les poumons , qui d'ailleurs étoient durcis , secs & pourris dans toute leur substance. Cette observation est de Bonnet.

Une femme de la campagne avoit une tumeur à la partie interne du talon , du côté droit , qui étoit venue de la grosseur de la tête d'un homme de taille médiocre. Cette tumeur devenoit cancéreuse , on l'extirpa , elle se régénéra ; nonobstant sa régénération il survint une douleur à la partie latérale gauche de la poitrine , avec difficulté de respirer. Vers le quarantième jour la difficulté de respirer augmenta ,

il s'y joignit un serrement de poitrine & une suffocation si considérables , que la malade ne pouvoit respirer qu'étant assise sur son lit. Dans ce triste état elle ne ressentoit pas de douleur , elle ne touffoit , ne crachoit & n'avoit point de fièvre , excepté dans les derniers jours de sa vie , qu'il se manifesta un mouvement fébrile. La difficulté de respirer faisoit tous les jours des progrès , principalement dans la nuit. Cette femme étant dans un marasme absolu , & ne pouvant prononcer que par un petit filet de voix par rapport à des érosions qu'elle avoit à la gorge , mourut dans de vives souffrances.

En ouvrant la poitrine , il sortit de sa cavité du côté gauche , une sérosité sanguinolente qui n'avoit point d'odeur , cependant elle étoit purulente ; le poumon étoit corrompu jusques vers le milieu de sa partie antérieure : on découvrit en même tems une espece de lac , qui contenoit sans doute une humeur purulente. Ayant porté plus avant la dissection de ce viscere , il se présentoit en différens endroits une substance semblable à du suif , cependant quand on ôtoit le bistouri cette matiere ressembloit plutôt à du pus qu'à toute autre chose. Le reste du poumon n'étoit point dur , il étoit d'une couleur rouge qui paroissoit dépendre d'un vice du sang.

Un Officier de maison portoit depuis quelques années une loupe entre les omoplates ; elle devint d'une grosseur si énorme qu'il ne pût plus la supporter , d'autant mieux que depuis quelque tems elle étoit douloureuse. Il la fit extirper ; la plaie se

cicatrisa ; le malade se croyoit parfaitement guéri. Dès que la suppuration cessa il se manifesta une toux sèche qui fit des progrès rapides ; elle devint humide, & enfin on s'apçeut qu'il avoit une fièvre lente & qu'il crachoit du pus. La Phthisie pulmonaire parcourut tous ses degrés, & le malade expira avec un grand regret de n'avoir pas gardé sa loupe , malgré les incommodités auxquelles elle l'affujettissoit.

Une jeune Demoiselle de dix ans étoit affligée depuis l'enfance, de tumeurs scrophuleuses en différentes parties du corps ; déjà plusieurs s'étoient dissipées , lorsqu'il en survint quelques - unes aux jambes avec des signes d'une suppuration sourde. Des *Médecistes* , gens ordinairement très-officieux, promirent aux parens de la malade une guérison très-prochaine ; ils lui appliquèrent des onguens , des emplâtres & lui firent prendre intérieurement des drogues dont je n'eus pas connoissance. Ces remèdes diminuerent le volume des tumeurs & dissipèrent les signes qui indiquoient une suppuration éloignée. La malade fut bientôt prise d'une toux sèche, d'un serrement de poitrine, d'inquiétudes dans tout le corps , &c. Elle étoit dans cet état lorsqu'on m'appela à son secours , au commencement de l'année 1750. Je la trouvai avec tous les symptômes d'une Phthisie pulmonaire ; cependant elle ne crachoit pas encore du pus , mais la toux étoit humide & les crachats visqueux. J'employai d'abord les secours indiqués par le caractère & par les symptômes de la maladie, & tous les moyens possibles

pour établir une suppuration aux jambes ; je ne pus y parvenir qu'imparfaitement , la malade n'en fut point soulagée. Le coup avoit été porté trop vivement à la poitrine par la métastase qu'avoient décidée les remèdes des charlatans ; la phthisie parcourut tous ses degrés , & la malade mourut dans le marasme.

Un homme d'une famille honnête , âgé de trente ans , m'appela au commencement du printems de l'année 1738 , pour des tumeurs scrophuleuses qu'il avoit depuis long-tems à une jambe. Il avoit été affligé de cette maladie dans sa premiere jeunesse ; il lui en restoit encore des cicatrices au cou & aux mains ; il en avoit perdu un doigt de la main droite & deux du pied du même côté. Je découvris dans une des tumeurs de la jambe une fluctuation sourde ; peu de jours après elle s'ouvrit. Le pus en étoit épais & semblable à du suif. Je remarquai que le malade avoit une légère oppression , des frissonnemens au dos , & qu'il touffoit très-fréquemment ; c'en étoit assez pour appercevoir dans ces symptômes les avant-coureurs d'une Phthisie pulmonaire. Je fis appeler un Chirurgien ; nous employâmes tous les secours propres à provoquer la suppuration de la tumeur de la jambe. Peu de tems après une autre tumeur vint à suppurier d'elle-même , & enfin elles suppurerent toutes ; de sorte que la suppuration de ces tumeurs se fit des communications des unes avec les autres & formoit une espece de clapier , qui exigea que l'on fît un nombre d'incisions qui établirent , pour ainsi dire dans cette partie , une suppuration générale.

L'abondance de la suppuration & les remèdes faits à propos dissipèrent les symptômes de Phthisie pulmonaire ; le malade après quatre mois de ces usages, se rétablit si heureusement qu'il jouit encore aujourd'hui, 1781, d'une assez bonne santé.

Il est des momens heureux dans les maladies, principalement dans celles de la poitrine où la nature démontre toute sa puissance ; ces momens sont ceux où il survient des métastases qui la dégagent des humeurs qui se sont portées dans ses viscères, où elles feroient par leur séjour des plaies incurables & mortelles : je n'en citerai qu'un seul exemple.

Un jeune homme âgé de vingt-six ans, fut pris d'un gros rhume, dans les premiers jours du mois d'Avril de l'année 1780 ; malgré ce rhume il se livra à des excès qui le rendirent très-grave : il resta près de trois mois dans cet état de souffrance & d'abus. Il entreprit un voyage au commencement du mois de Juin, il faisoit une chaleur excessive, & il fit dans deux journées une route forcée qui en auroit exigé quatre s'il l'eût entreprise avec prudence.

Le soir de son arrivée au lieu de sa destination il se trouva sans toux, sans rhume & sans la moindre incommodité ; il soupa, se coucha & dormit très-tranquillement. Il fut éveillé à cinq heures du matin par une douleur au côté gauche de la poitrine ; dans peu de momens elle fut violente & insupportable. Il se mit dans un bain, il en souffroit davantage ; l'oppression augmentoit, on le saigna cinq fois dans les vingt-quatre heures ; la douleur ne faisoit qu'em-

pirer, le malade étouffoit. On appliqua enfin un emplâtre vésicatoire, sur la partie de la poitrine, où la douleur se faisoit le plus ressentir; dès qu'il commença d'irriter la peau la douleur diminua, & dans peu de momens elle cessa totalement.

Pendant la nuit du quatrième au cinquième jour de la maladie, il survint une douleur au bras droit, il s'y forma dans l'instant un abcès si considérable qu'on fut obligé de l'ouvrir le lendemain; il en sortit deux livres de pus très-caractérisé. Après l'ouverture de ce dépôt, dans l'intervalle de quinze jours, il s'éleva successivement sur les jambes & sur le bras gauche huit petites tumeurs qui à peine élevoient la peau, elles n'en altéroient pas même la couleur; elles ne tarderent pas à devenir molles, on en fit l'ouverture; il en sortit un pus séreux. Depuis ce tems-là, les abcès, les suppurations se font toujours succédés jusques aujourd'hui dans les extrémités supérieures & dans les inférieures; il y a dix-huit mois qu'ils ont commencé, & il n'y a pas apparence qu'ils approchent de leur fin, quoique d'ailleurs ce jeune homme paroisse jouir d'une bonne santé.

CHAPITRE VIII.

*Métastase des éruptions cutanées dans les poumons :
Cause de Phthisie pulmonaire.*

LA matiere des éruptions cutanées qui se font par les voies de la transpiration, est le produit de la

dépuration de la masse des liquides. Tandis que cette matiere n'a pas contracté de vice particulier & qu'elle a toutes ses issues libres par les pores exhalans de la peau & par ceux qui fournissent la transpiration pulmonaire, elle répond au vœu de la nature ; son excrétion est nécessaire & salutaire, elle concourt à conserver la santé & à préserver de maladies.

Comme la matiere transpirable est l'excrément des dernieres digestions, elle est étrangere aux liquides animaux dès le moment qu'elle est séparée de leur masse, & nuisible au système des solides, dès qu'elle est retenue dans les pores de la peau & dans les issues de la transpiration pulmonaire par des obstacles qui s'opposent à son excrétion. Ces obstacles proviennent ou de la qualité de la matiere transpirable retenue, ou d'accidens qui donnent lieu à son interception. Les vices de cette matiere dépendent en général de ceux du sang, ou de la lymphe, & les obstacles qui ferment ses issues sont des effets de tout ce qui peut resserrer les calibres des pores exhalans, les obstruer, ou les oblitérer.

La matiere transpirable retenue à la superficie, forme des éruptions cutanées de différente nature, selon la qualité qui lui est propre, ou selon les vices qu'elle a contractés de la masse des liquides. La qualité de cette matiere dégénere dès qu'elle est retenue ; elle se pervertit pour peu qu'elle soit altérée par des vices qui lui soient étrangers : bien plus, elle reste souvent imbue de la qualité de ces

vices, elle en contracte le caractère & devient contagieuse à la matiere transpirable qui lui succede.

La matiere qui forme les éruptions cutanées reste ordinairement mobile & très-aisée à repercuter ; un air froid, des excès de quelque nature qu'ils soient ; les passions de l'ame, des abus dans le régime de vie, des topiques appliqués imprudemment la déplacent & la déterminent par métafaste vers d'autres parties, & principalement vers les viscères de la poitrine où elle se fixe pour y causer des plaies dangereuses & souvent mortelles.

On observe en général trois différentes especes d'éruptions, de taches, ou efflorescences ; les unes sont purement dépuratoires ou critiques ; elles ne s'élèvent pas au-dessus du niveau de la peau ; leur couleur est ordinairement la même que celle des tégumens, quelquefois elle en differe en quelque chose, ou bien de petites pustules imperceptibles qui disparoissent en peu de tems. Ces efflorescences & ces pustules ne sont précédées, accompagnées ni suivies de mouvemens fébriles, ni de lésion sensible des fonctions, excepté de démangeaisons très-incommodes ; telles sont celles qui surviennent après de grandes chaleurs, après des exercices immodérés, des passions de l'ame, &c.

La seconde espece consiste en des exenthemés fébriles, souvent formés d'un dépôt de matiere critique encore crue, que la fièvre détermine par violence vers les extrémités capillaires des arteres sanguines & lymphatiques. Ces exenthemés sont différens,

selon la nature de la maladie & selon la différence de la matiere morbifique qui en fait le caractere. C'est de ces différences que les fievres exenthémateuses prennent leurs différentes dénominations ; telles sont les scarlatines, les pétéchiales, les pourprées, les miliaires, les érépipellateuses, les vario-
liques, celles de la rougeole, &c.

La troisieme espece consiste en des éruptions de matieres âcres que la nature détermine vers les orifices des pores de la peau, qu'elles irritent, resserrent, rongent, & y forment des croûtes, des taches, des pustules, tantôt générales, tantôt particulières, selon la disposition des pores exhalans & des parties sur lesquelles elles se répandent : ce sont des croûtes laiteuses, des teignes, des galles, des dartres, &c.

La premiere espece de ces exanthemes peut être considérée comme critique ; la matiere qui les produit s'épuise en se dissipant, pourvu qu'on laisse agir la nature, qu'on la seconde à propos & qu'on ne commette pas d'imprudencce qui puisse faire obstacle à la résolution de cette matiere & à son excretion. Si l'on en commettoit on auroit à craindre que cette matiere déjà pervertie ne se portât par métastase dans les viscères de la poitrine & n'y occasionnât de fâcheux accidens & principalement des Phthises pulmonaires.

La seconde espece d'éruptions est toujours aiguë, inflammatoire & menace d'un danger prochain. Si ces différentes maladies dont les éruptions indiquent

le caractère ne sont pas parfaitement jugées, lorsque la fièvre a cessé & que tous les symptômes se sont dissipés, on court le danger des métastases dans la poitrine, suivies de Phthysies pulmonaires, toujours annoncées par de petites toux qui font des progrès rapides qui conduisent par degrés à une extinction totale. On est principalement exposé à ces accidens, à la suite de la petite vérole, de la rougeole, des érysipelles, &c.

Les éruptions de la troisième espèce sont chroniques & dangereuses dans tous leurs tems & dans leurs différences; les humeurs qui les causent, toujours disposées à se dissiper par métastase, menacent les principaux viscères, & semblent se porter par préférence dans les poumons, qui en sont toujours dangereusement affectés.

CHAPITRE IX.

Métastase de l'humeur qui forme les croûtes laiteuses & la teigne des enfans : Cause de Phthysies pulmonaires.

LES croûtes laiteuses des enfans, proviennent d'ulcères qui se répandent d'abord à la tête, au visage & quelquefois en différentes parties de la superficie du corps. Ces ulcères commencent par de petites vésicules blanches, qui deviennent jaunes, dont la suppuration s'épaissit par le contact de l'air & forme des croûtes. La matière de cette suppuration ne s'épaissit pas totalement en croûtes, il en coule

une humeur ichoreuse qui cause des démangeaisons cuisantes , sur-tout lorsque les croûtes ont pris une étendue considérable.

La principale cause des croûtes laiteuses , est une lympe viciée , trop visqueuse , trop âcre pour se distribuer dans les glandes cutanées , sans y causer des engorgemens , des érosions , des ulcères.

Les causes éloignées des croûtes laiteuses dépendent du tempérament du pere & de la mere , de celui de la nourrice , des maladies auxquelles ils sont sujets ; de la qualité du lait , de la trop grande quantité dont on a la pernicieuse coutume d'engorger les enfans , & des autres alimens qu'il est très-ordinaire qu'on leur donne mal à propos , sur-tout dans les premiers six ou sept mois de leur nourriture.

Les croûtes laiteuses dégèrent en teigne d'un mauvais caractère , lorsqu'on néglige d'en prendre soin , de les tenir propres & lorsqu'elles durent trop long-tems. Les enfans sont exposés au même accident & souvent à de plus graves , lorsque les nourrices commettent des abus dans le régime de vie , tant en ce qui concerne la nourriture , que les passions de l'ame. J'ai vu des croûtes laiteuses , par la seule cause que les nourrices avoient des fleurs blanches , ou d'anciens écoulemens gonorrhéïques , quoiqu'ils ne pussent être suspectés d'être vénériens ; il seroit donc essentiel qu'on n'adoptât jamais pour nourrices des femmes qui auroient des écoulemens , de quelque nature qu'ils fussent.

On distingue la teigne des croûtes laiteuses, par des ulcères couverts de croûtes vertes, jaunes, blanches, qui rendent une ichorosité fétide, peu abondante, qui cause des démangeaisons insupportables. Lorsqu'on gratte les croûtes des teigneux, ou qu'on les frotte un peu fortement, il en sort des écailles semblables à du son. La teigne se borne ordinairement à la tête, elle couvre toute l'étendue du cuir chevelu ; il est rare qu'elle passe au visage & qu'elle se répande sur d'autres parties.

Les croûtes laiteuses bénignes, celles qui proviennent d'une nourriture trop abondante, doivent être considérées comme une dépuration de la masse des liquides ; on y remédie sans danger, pourvu qu'on n'emploie pas d'abord des applications de remèdes repercussifs ou astringens : quelque bénignes que fussent les croûtes, elles causeroient des métastases mortelles.

Hoffman a observé qu'à la suite de tels abus il survenoit des tintemens d'oreille & des vertiges. Cet Auteur ajoute que la seule impression du froid repercute les croûtes laiteuses, donne la fièvre qui ne cède que lorsque les croûtes reparoissent. Il a vu que des linimens dessicatifs appliqués inconsidérément sur des croûtes laiteuses, avoient occasionné des métastases dans les poumons qui avoient donné lieu à des asthmes convulsifs. On a souvent observé que des enfans dépérissent, tomboient dans le marasme & devenoient phthifiques pour avoir appliqué des onguens sur des croûtes laiteuses qui paroiss-

soient bénignes. Les applications de topiques sur des croûtes laiteuses dont la cause est compliquée, menacent toujours du plus grand danger, sur-tout lorsque cette cause est héréditaire, c'est-à-dire, lorsqu'elle provient des vices du pere, du sein de la mere, ou du lait de la nourrice.

De pareilles applications sont encore plus dangereuses lorsqu'on les emploie pour guérir de la teigne sans les avoir faites précéder par des remèdes intérieurs. Hoffman a observé qu'un simple liniment astringent employé mal à propos sur la teigne d'un enfant de dix ans, avoit occasionné une inflammation à un œil, qu'il étoit venu en suppuration, & qu'enfin il s'étoit perdu totalement.

Quels ravages ne feroient pas de telles métastases en se portant dans les poumons ? combien n'a-t-on pas vu d'enfans mourir phthifiques, à la suite & par l'effet de pareilles imprudences ?

CHAPITRE X.

Métastases d'humeurs dartreuses dans la poitrine : Cause de phthifies Pulmonaires.

LES dartres sont des pustules de différentes especes, souvent éréthyspélateuses qui se répandent sur la peau, où elles prennent des dénominations différentes, selon leur caractère.

Lorsque les pustules dartreuses sont séparées les unes des autres, comme le sont ordinairement celles

qui viennent au visage, on les appelle discrètes. Celles-ci s'élevent en pointe avec une base enflammée dont la rougeur disparoît après qu'elles ont jetté un peu de matiere séreuse; elles se desséchent ensuite d'elles-mêmes & tombent en petites écailles semblables à du son de farine de froment.

Les pustules qui forment les dartres confluentes sont petites, ramassées; leurs pointes se remplissent d'une matiere blanchâtre d'où se forme une petite croûte ronde semblable à un grain de millet; on appelle ces dartres miliaires.

On reconnoît sous le nom de dartres rongeantes, celles dont les pustules sont si âcres, si corrosives qu'elles pénètrent dans la peau, la rongent & la détruisent.

Ces différentes especes de dartres proviennent d'une lymphe plus ou moins épaisse, plus ou moins âcre retenue dans les glandes de la peau; elles prennent souvent leur principe d'un vice de la masse des liquides, soit héréditaire, soit acquis, ou accidentel. Ce vice peut être compliqué avec différens virus, comme le vérolique, le scorbutique, le cancéreux, le scrophuleux, &c.

On jugera aisément, en réfléchissant sur le caractère des dartres, qu'on doit les considérer comme une maladie que la nature a suscitée, pour garantir les viscères des dangereuses impressions que pourroit faire sur eux un principe dartreux retenu dans le système des vaisseaux. L'humeur dartreuse lorsqu'elle est à la peau, se déplace aisément, sur-tout lorsqu'elle

est repercutée par des topiques appliqués mal-à-propos. Elle se porte ordinairement dans la poitrine par de dangereuses métastases & se fixe dans les poumons qu'elle semble choisir de préférence à tous les autres viscères, où elle s'annonce bientôt par tous les symptômes des Phthifies pulmonaires.

Dès que l'humeur dartreuse est fixée dans la substance des poumons, il survient une toux qui amène après elle une sérosité claire & abondante. On éprouve tous les jours un froid assez considérable, suivi de chaleur & d'altération. Il survient à la gorge des douleurs qui gênent la voix & la déglutition. L'appétit tombe, & dès que la Phthisie pulmonaire est confirmée, les crachats sont copieux, épais, jaunes & quelquefois roux. Cette Phthisie est pleine de danger dans ses commencemens, & ordinairement incurable, lorsqu'elle est parvenue au troisième degré.

Bonnet rapporte l'histoire d'un homme qui, ayant eu l'imprudence de repercuter des dartres par des topiques, fut pris d'une colique violente, dont la cause se porta à la poitrine, & le rendit phthisique.

Un homme âgé de vingt-quatre ans avoit une dartre au front, vers la racine du nez, entre les sinus frontaux; c'étoit un négociant robuste & bien fait, qui voyageoit tous les ans dans les villes principales du royaume, pour donner de l'étendue à son commerce. Cette espèce de difformité l'inquiétoit; il y appliqua des topiques astringens; la tache dartreuse disparut en peu de tems. L'humeur qui la formoit,

étant repercutée par ce remede pernicieux , se porta dans la substance des poumons où elle accomplit une Phthisie pulmonaire qui parcourut tous ses degrés jusqu'à une entiere extinction. Cette pulmonie se communiqua successivement à deux gardes qui avoient donné au malade des soins assidus pendant tout le cours de sa maladie.

On ouvrit le corps du négociant , on le trouva atrophie à la superficie ; les poumons étoient farcis d'ulceres & de tubercules crus & suppurés ; les visceres du bas ventre étoient parsemés d'obstructions & couverts de taches gangréneuses.

Un jeune homme âgé de douze ans , fils unique d'une maison distinguée , étoit affligé dès son enfance de croûtes dartreuses aux jambes ; M. son pere éprouvoit la même maladie , même avant son mariage & n'en étoit point guéri. On regardoit avec raison , dans la famille , les dartres du jeune homme comme héréditaires , & par conséquent , disoit-on , elles étoient incurables. Pendant toutes ces considérations , il survint une toux importune & une légère douleur de poitrine , effets sans doute des topiques qu'on appliquoit sur les croûtes dartreuses : on craignit les suites de ces nouveaux accidens , on m'appela au secours du malade ; c'étoit au commencement de l'année 1758.

Je trouvai les deux jambes couvertes de croûtes dartreuses & surfureuses depuis les rotules jusques aux pieds ; je ramolis les croûtes pour modérer les démangeaisons qu'elles causoient & pour favoriser

la suppuration ; j'empêchai ensuite qu'elles ne durcissent , je fis des remèdes intérieurs pendant plus de deux ans ; la toux , les douleurs de poitrine se dissipèrent insensiblement ; le malade guérit , sans qu'il en soit résulté d'inconvénient : il jouit encore aujourd'hui d'une santé parfaite.

Madame de la G... souffroit dès l'âge de vingt-deux ans , principalement de coliques & d'une toux nerveuse très-incommode ; quelque tems après il lui survint des boutons éréthypellateux , tantôt aux extrémités supérieures , tantôt aux inférieures ; ces boutons dégénérèrent en dartres vives qui se fixèrent enfin sur les jambes & y formerent des ulcères profonds qui rendoient un pus jaunâtre. Ce pus étoit tellement âcre , que la partie latérale interne de la jambe droite étoit presque couverte d'ulcères & de croûtes dartreuses ; la toux spasmodique se soutenoit toujours la même depuis quatre ans , & on ne cessoit pas d'employer des topiques sur les ulcères dartreux. On parvint enfin à diminuer la suppuration ; la toux devint bientôt humide , la poitrine commençoit d'être douloureuse , il s'établissoit un mal - aise général dans tout le corps , & le pouls dégéneroit de l'état naturel.

Ces symptômes donnerent de justes alarmes à la malade , elle vint à Paris pour me consulter sur sa situation , elle y fit un assez long séjour , elle employa tout ce tems à faire des remèdes utiles ; je donnerai cette méthode curative dans le dixième chapitre de la cinquième section de la seconde partie de cet ouvrage.

CHAPITRE XI.

*Métastase de la Gale dans les viscères de la poitrine :
Cause de Phthisie pulmonaire.*

LA gale est une éruption de pustules phlegmoneuses qui se répandent sur la peau & y causent des démangeaisons très-incommodes.

On reconnoît en général deux especes de gale, l'une est seche & l'autre humide. La seche est formée de petites pustules qui ne rendent presque point d'ichorosité ; il en sort des écailles semblables à du son, qui se renouvellent successivement. Dans l'humide, les pustules sont plus apparentes, elles rendent une matiere purulente, moins prurigineuse que la seche ; ces pustules se couvrent d'une croûte formée d'un pus très-âcre, qui ronge la peau & pénètre jusqu'au tissu cellulaire.

La cause de la gale est la matiere de la transpiration devenue trop dense & irritante ; elle obstrue & ronge les orifices des pores exhalans, se communique aux glandes cutanées, les engorge, les irrite & les détruit, sur-tout lorsqu'elle est compliquée avec quelque vice étranger, tel que le scorbutique, le dartreux, l'érésipellateux, le vénérien scrophuleux, &c.

La gale est une des maladies de la peau, la plus contagieuse ; elle se communique par la transpiration insensible, par le contact, par le pus que

rendent les pustules , s'il touche à des parties saines & même par des chemises & des habits , dont les galeux ont été couverts , quand on n'a pas eu l'attention de les laver & de les nettoyer exactement avant de s'en servir ; il seroit encore plus prudent de n'en faire aucun usage.

On conçoit par ces propriétés de la gale , dont l'humeur est extrêmement mobile , combien elle est propre à être répercutée , & à se porter par mé-tastase dans les viscères , & principalement dans les poumons. Dès que l'humeur *psorique* est fixée dans ce viscère , elle l'irrite , le ronge , y forme des ulcères , des tubercules , des hémoptysies , qui dégénèrent en Phthysies pulmonaires. Ces Phthysies sont presque toujours mortelles , à moins qu'on n'en arrête le progrès , dès qu'on s'apperçoit de quelque symptôme qui annonce que les poumons sont en souffrance.

Un moine de Padoue avoit la gale ; il la fit passer par le moyen de frictions , sans les avoir faites précéder par les remèdes généraux ; il lui en survint un écoulement d'humeurs salées , qui se portèrent dans les poumons , il en cracha plusieurs fois du sang , & il mourut d'une fièvre étique. On trouva à l'ouverture du corps , les poumons entièrement corrompus , & en grande partie squirrheux. Observation de Wiffangius , rapportée par Bonnet.

Le fils unique d'un fameux marchand de Londres étoit sujet à une espèce de gale scrophuleuse ; étant parvenu à l'âge de puberté , il se lassa de ses fréquens

retours ; il chercha à s'en guérir par des topiques & des répercussifs. Il fut pris bientôt après d'une toux sèche, qui provenoit de tubercules aux poumons. Il se négligea jusqu'à ce que ces tubercules s'enflammèrent, s'ulcérèrent & qu'ils déterminèrent une fièvre lente, & les autres symptômes d'une Phthisie pulmonaire.

Le malade étant dans ce triste état, on appella un Médecin, qui l'envoya à la campagne, où il fit des remèdes, qui paroissent avoir guéri la toux & la fièvre. Le malade ennuyé de la longueur du mal & de l'assujettissement qu'exigeoit l'usage des remèdes propres à sa situation, se refusa à tout secours. La toux & la fièvre étiques se renouvelèrent, il s'y joignit une diarrhée & d'autres symptômes de colliquation qui le conduisirent à son dernier moment.

A l'ouverture du corps, on trouva tous les lobes des poumons farcis de tubercules de différentes grosseurs ; il y en avoit de crus, d'enflammés & d'ulcérés : ils contenoient tous une matière purulente de consistance de miel. Cette observation est de Manget.

Une fille de Boulogne, âgée de 22 ans, avoit la gale qu'on repercuta avec des onguents ; elle fut bientôt prise d'une vive oppression sans fièvre ; cette maladie ne céda à aucun secours, les saignées ne faisoient que rendre plus violente la difficulté de respirer ; elle mourut à la suite de ce supplice.

On ouvrit le corps, où l'on ne découvrit aucune marque de gale ; le foie étoit plus livide & plus

dur que dans l'état naturel ; la rate étoit , pour ainsi dire , séparée en deux parties qui ne tenoient l'une à l'autre , que par un petit endroit dans l'un des côtés , sans quoi , on auroit pu prendre ces deux parties pour deux rates.

Avant d'ouvrir la poitrine , on disséqua les mamelles ; à chaque coup de bistouri , il en jaillissoit du lait ; toute leur substance en étoit imbibée. Ce qu'il y avoit en cela de surprenant , c'est que Morgagny , qui a donné cette histoire , avoit observé en faisant la dissection des viscères du bas ventre , des marques non équivoques , que cette fille étoit vierge. Dès qu'on eut porté le bistouri dans l'intérieur de la poitrine , il en sortit une eau presque bleue , qui remplissoit toute sa capacité : les poumons étoient en totalité adhérens à la plevre : le pericarde contenoit tant d'eau de la même nature , qu'il en étoit dur au tact : le cœur étoit de la grosseur ordinaire ; on ne trouva pas dans ses vaisseaux une seule goutte de sang , mais ses deux ventricules étoient farcis de concrétions polypeuses , dont la substance étoit semblable à une graisse jaunâtre.

Sennert fut appelé dans l'année 1726 par un homme d'un tempérament mélancolique , qui avoit une fièvre continue & une grosse toux , avec difficulté de respirer ; il rendoit des crachats copieux , & de tems en tems beaucoup de sang : tout donnoit lieu de craindre que ce malade ne tombât dans une Phthisie confirmée. Sennert voyant que les remèdes qu'il avoit mis en usage pendant huit jours , n'avoient pas procuré de soulagement , soupçonna

que cette maladie provenoit de quelque cause particulière. Il fit en conséquence des perquisitions exactes sur la façon de vivre du malade , & sur les incommodités auxquelles il avoit été sujet. Il apprit enfin qu'il avoit eu la gale , & que dès le moment qu'elle avoit disparu , il avoit été pris de la toux & de la fièvre qu'il avoit alors. Le médecin n'hésita pas à prononcer que la gale repercutée s'étoit portée par métastase dans les poumons , & que la fièvre & les autres symptômes provenoient de cette cause. Il prescrivit des remèdes propres à rappeler la gale à la peau , il y réussit , la fièvre , la toux & les autres symptômes disparurent. Le médecin s'occupa ensuite de la guérison de la gale & la santé de son malade se rétablit totalement , sans aucune crainte de la Phthisie , dont il avoit été menacé.

Il se fait aussi des métastases d'autres éruptions cutanées , celle de la suppuration des vieux ulcères ne sont pas moins dangereuses que celle de la gale ; j'en ai déjà rapporté des exemples. Il arrive aussi quelquefois , que des humeurs vagues , gouteuses , rhumatismales , scorbutiques , vénériennes , &c. , se fixent à la poitrine par métastase , & causent des Phthisies pulmonaires. La connoissance des métastases , dont je viens de traiter , instruit assez sur celles de ces humeurs , pour me dispenser d'entrer dans un plus long détail sur les effets qu'elles produiroient dans la substance des poumons , principalement si l'on ne les prévenoit pas , par préjugé , par négligence , par trop de sécurité , ou faute d'en connoître le danger.

SECONDE PARTIE.

MÉTHODE PRÉSERVATIVE ET CURATIVE DE LA PHTHISIE PULMONAIRE.

SECTION PREMIERE.

*Généralités concernant la méthode préservative
& curative de la Phthisie pulmonaire.*

CHAPITRE PREMIER.

État des poumons après la mort des Phthifiques.

J'AI fait connoître dans la premiere section de la premiere partie de cet ouvrage, l'état naturel des poumons; j'y ai donné une idée de leur délicatesse, & des dangers auxquels ils sont exposés au moindre accident qui trouble, ou qui dérange leurs fonctions. J'expose dans ce chapitre l'état de ce viscere, tel qu'il paroît par les dissections anatomiques des sujets morts de Phthisies pulmonaires.

Les poumons des phthifiques sont ordinairement adhérens, en tout ou en partie, à la plevre, aux côtes, & même aux vertebres du dos, dont il est difficile de les détacher. Il se forme souvent dans

leurs adhérences , une sérosité ichoreuse , putride ; tantôt un des lobules est détruit par la corrosion que fait la pourriture , tantôt deux & quelquefois toute la substance du lobe l'est également ; on trouve presque toujours dans l'un & l'autre lobe des ulcères fâlés d'une humeur sanieuse & infecte ; ces ulcères sont quelquefois si multipliés qu'ils labourent , pour ainsi dire , la plus grande partie de la substance pulmonaire. La plupart sont formés en vomiques , ils rendent un pus , tantôt épais , tantôt ichoreux & toujours fétide. En ouvrant les poudrons vers leur partie supérieure , on y découvre souvent des cavités qui représentent des especes de lacs , ou de cloaques qui contiennent un pus semblable à celui que rendoient les malades par l'expectoration.

Lorsque la pulmonie n'est pas causée immédiatement par des ulcères , elle l'est par des tubercules suppurans , par d'autres qui ne suppurent pas , ou par des concrétions polypeuses , graveleuses , pierreuses , cartilagineuses , &c. Les tubercules qui suppurent , rongent les parties qui leur sont adhérentes , & forment des ulcères qui ne diffèrent pas de ceux qui établissent la cause immédiate de la Phthisie pulmonaire. Les tubercules de cette espèce se multiplient de même que les ulcères qui en proviennent , c'est l'effet d'une espèce de contagion propre à tous ceux qui dépendent d'une source corrompue. Les progrès de ces ulcères ne sont bornés que par une extinction totale , lorsqu'on n'a pas eu

le bonheur ou l'intelligence d'en détruire la cause , avant que la maladie ne soit parvenue à un période qui la rende incurable.

Le pus des ulcères dans la Phthisie étant résorbé dans la masse des liquides , lui communique son caractère , déprave insensiblement le suc nourricier , & détruit ses propriétés : tous les viscères en éprouvent des atteintes mortelles. On a souvent trouvé après la mort des phthifiques , le cœur flétri , ses vaisseaux vuides de sang , & ses ventricules pleins de concrétions polypeuses ; il est très-ordinaire que dans leurs derniers momens , il s'épanche une sérosité purulente & fétide , dans la cavité de leur poitrine.

Cette maladie affecte également les viscères du bas-ventre ; le foie est presque toujours pâle & plus volumineux que dans l'état naturel ; quelquefois il est farci d'engorgemens. Les glandes du mésentère sont très-souvent obstruées , l'épyploon & les graisses sont consumées , & les chairs sont détruites ; tout tombe dans cette cruelle maladie , dans un dépérissement , qui fait des progrès jusqu'à une destruction totale.

CHAPITRE II.

On guérit souvent de la Phthisie pulmonaire , on la prévient même malgré le préjugé presque général que cette maladie est incurable.

DES obstacles sans nombre s'opposent à la guérison de la Phthisie pulmonaire ; on en voit tous les jours

des exemples funestes qui ne peuvent qu'alarmer l'humanité. Cette cruelle maladie n'épargne ni l'un ni l'autre sexe , elle est fatale à tous les âges , à tous les états ; elle moissonne les hommes , principalement dans la jeunesse , dans l'adolescence , & il n'est point de vieillard qui puisse se flatter d'en être exempt. Le public frappé de la seule idée de cette calamité , n'a pas tort d'en redouter les effets. Ceux qui parmi les gens riches ont le bonheur de s'en garantir , ou qui n'y sont pas exposés doivent ce précieux avantage à la pureté de leurs mœurs , à celle de leurs peres , à l'exercice & à la sobriété ; à quelles calamités ne doivent pas s'attendre des enfans , dont les peres ont détruit leur tempérament par des abus , par des excès & par les vices auxquels entraînent toujours les passions inconsidérées ; ils ne peuvent être que les malheureuses victimes de leur intempérance. A quels malheurs ne sont pas exposés les enfans des meres , qui ont pris dans le luxe & dans l'oisiveté , un penchant inévitable pour les passions , qui sacrifient à leurs sens & à des convenances imaginaires , une santé précieuse , des devoirs sacrés , suggérés par la raison , imposés par leur état , essentiels à leur conservation & nécessaires à leur postérité.

Ces abus , ces excès , ces passions , sont autant de sources fécondes de maladies de langueur , & sur-tout de Phthysies pulmonaires héréditaires qui , si elles ne détruisent pas les familles , parmi lesquelles elles ont commencé de germer , s'y étendent

& s'y multiplient , pendant un nombre de générations.

On ne guérit pas de la Phthisie pulmonaire ; selon l'opinion des hommes qui sacrifient au préjugé ; ils se trompent , mais peut-être , n'est-ce que d'après des gens de l'art , qu'ils ont adopté cette erreur ; il en est , qui ont prétendu que les pulmoniques ne guérissent point ; il est surprenant qu'ils n'aient pas opposé l'expérience aux foibles raisons qu'ils alleguent pour autoriser leur opinion , ils ont cru que le mouvement continu des poumons empêchoit les ulcères de se cicatrifier ; s'ils avoient consulté Galien , ils auroient appris de cet observateur , que le mouvement naturel de la respiration , n'agite pas assez les poumons , pour rendre impraticable la cicatrice des ulcères de ce viscère.

Il faut avouer , cependant , comme je viens de l'observer , qu'il est bien des obstacles qui s'opposent à la guérison des pulmoniques ; que ces obstacles sont redoutables , & qu'ils exigent des secours de l'art les plus éclairés , puisque dès son premier degré , la Phthisie pulmonaire élude souvent les puissantes ressources de la nature.

Il n'est point de pulmonique qui ne touffe ; la toux est plus ou moins violente , selon le plus ou le moins de l'irritation qui la provoque. Sans la toux , l'expectoration du pus des ulcères n'auroit pas lieu , & les fibres des ulcères sont inquiétées ou déchirées par les concussions , qui sont les effets d'une toux

trop forte. C'est l'un des principaux symptômes qui font obstacle à la réunion des levres des plaies, à la cicatrice des ulcères, & à la guérison de la pulmonie. D'ailleurs le pus ne sauroit prendre une bonne qualité parmi les concussions d'une toux vive & fréquente. Il est généralement avoué que les ulcères ne se cicatrisent qu'à la faveur d'un bon pus, d'un pus épuré, sous lequel le suc nourricier régénère les substances détruites, & forme des cicatrices solides. La fièvre est encore un obstacle qui s'oppose à la perfection du suc nourricier, & à ce que le pus prenne une qualité propre à favoriser la réparation de la perte de substance, dont l'ulcère s'est formé.

Ce n'est pas tout encore, il est peu de remèdes propres à la Phthisie pulmonaire qui puissent pénétrer directement dans les poumons, par la trachée-artère; ils ne peuvent être portés dans la cavité de la poitrine, que dans l'inspiration, sur les aîles de l'air de l'atmosphère. Ceux qui vont dans l'estomac, ne communiquent avec les poumons, que par les voies générales de la circulation du sang; ils ont alors perdu de leurs vertus, par les changemens qu'ils ont subi dans les voies des digestions.

Malgré tous ces obstacles, les plaies des poumons qui suppurent & les ulcères phthifiques de ce viscère ne sont pas incurables; ils guérissent souvent, lorsque les malades observent un régime de vie convenable à leur état; lorsqu'ils ont recours

aux secours de l'art , principalement au premier degré de la maladie , auquel la guérison est incertaine ; elle est douteuse au second degré , & au troisieme , elle est désespérée. Il est cependant un nombre d'observations qui confirment qu'on a guéri des Phthifies pulmonaires , à ces trois différens degrés ; elles ont été données par des auteurs dont on ne sauroit soupçonner la candeur & la bonne foi. Tels sont parmi les anciens , *Galien* , *Oradus* , *Ingarfias* , *Erasle* , *Avicenne* , *Mesué* , *Valescus* , *Vareliora* , *Craton* , *Forestus* , & un nombre d'autres. Ceux qui parmi les modernes en ont donné de pareilles , sont *Sennert* , *Riviere* , *Boerrhaawe* , *Morton* , *Burnet* , *Bonnet* , *Chefneau* , *Hoffman* , *Wan-Swieten* , &c. J'en ai donné moi-même dans mon traité d'observations , & dans la premiere partie de cet ouvrage , que j'ai faites sur des malades , dont on avoit lieu de désespérer de la guérison.

J'ai vu des bossus cracher le sang , se plaindre de douleurs à la poitrine , & d'autres symptômes qui menaçoient de Phthisie pulmonaire , s'en préserver par un régime de vie convenable à leur situation & par les secours de l'art employés à propos. J'ai observé à l'ouverture du corps des gens qui étoient guéris de pulmonie , morts long-tems après d'autres maladies , que les poumons étoient dans leur état naturel , qu'il n'y restoit point de tubercules , & qu'on n'y appercevoit que des bases d'ulceres parfaitement cicatrisés , & des adhérences sans suppuration.

La négligence trop ordinaire d'avoir recours aux secours de l'Art , lorsqu'on est menacé de Phthisie pulmonaire , est une des principales causes que cette maladie est souvent incurable. La toux sèche & la fièvre étiques sont supportables dans leurs commencemens ; on y fait peu d'attention , on les prend pour de simples rhumes : on boit de quelque infusion théiforme , on s'en rapporte pour le reste aux soins de la nature. Quelque tems après la toux devient plus considérable , plus fréquente , & commence d'être humide. C'est une marque , dit-on , *que le rhume meurt* , on se croit près de sa guérison , on est tranquille sur les suites de cette légère incommodité. L'hémoptysie survient enfin , les crachats prennent bientôt une odeur putride , la fièvre se manifeste par des exacerbations , & on maigrit. A cette époque on commence à prendre quelque sollicitude , on en fait part à ses amis , & sur-tout à ses amies , qui toujours sont savantes en médecine , principalement en observations. Les malades alors ont lieu de se tranquilliser ; on leur propose un nombre de remèdes , *bons pour la poitrine* , dit-on , & *tous infail-*
lables. On étale ces assertions d'un nombre de guérisons miraculeuses , opérées par ces remèdes , dans des cas où les maladies étoient désespérées & les malades abandonnés de tous les Médecins : on ne tarit pas sur ces exemples , aussi faux que séduisans.

Après une longue énumération de ces faits merveilleux , les uns proposent des tablettes d'un tel apothicaire , les autres un syrop qu'on débite en telle

maison ; d'autres des bouillons de choux rouge , de limaçons , d'eaux minérales , du lait , &c. D'autres plus exacts & plus favans , ont leur porte-feuillé garni de formules , pour un nombre de maladies principalement pour celles dont il est question , sans en connoître ni la nature ni l'espece. Les malades avides de guérison , sont aisément séduits par ces apologies officieuses ; ils prennent pour ces remedes une confiance aveugle , égale à la témérité de ceux qui les ont proposés , & ils persistent dans leur usage , toujours assez long-tems pour que la Phthisie devienne incurable , avant qu'on ne fasse usage de secours qui puissent être utiles.

Il est encore d'autres obstacles qui s'opposent à la guérison des pulmoniques ; c'est la témérité de ces guérisseurs universels qui entreprennent toutes les maladies , sans avoir une simple idée de leur caractere , sans en connoître les causes & les différences , encore moins la qualité des remedes dont ils font usage ; telle est la marche ordinaire de l'ignorance.

Viennent ensuite les charlatans qui sacrifient à leur cupidité tout sentiment honnête ; ils n'ont d'autre science que celle de séduire & de tromper. Une formule de remedes prise au hasard leur suffit , pour l'appliquer à toutes les maladies , & principalement à celle pour laquelle on a la simplicité de les consulter. Il leur est défendu en France de débiter leurs pernicioeux remedes ; ils sont proscrits en Allemagne , en Danemark , dans les Etats du Roi de Sardaigne , & la République de Venise a prononcé

contre eux des peines de mort. Par-tout on connoît leur témérité, leur audace, combien ils sont dangereux, & par-tout ils trouvent des gens simples & crédules, peut-être même des protecteurs; ne font-ce pas autant de plaies de l'espece humaine?

C H A P I T R E I I I.

*Récapitulation succinte des causes de la Pulmonie :
Signes qui la précédent.*

LA Phthisie pulmonaire dépend en général d'ulceres dans la substance des poumons, ou de tubercules; ceux-ci sont de deux especes, les uns suppurent & les autres ne suppurent point. Il s'engendre aussi dans les poumons des corps compacts, durs, cartilagineux & pierreux. Ce sont des causes prochaines de cette maladie qu'il est essentiel de connoître & de distinguer pour en établir solidement la méthode curative.

La suppuration est la cause immédiate de la Pulmonie; elle en décide le caractère, qui est aussi indiqué par la fièvre, par l'appauvrissement général de la masse des liquides, par la décomposition ou la destruction du système des solides.

Les tubercules & autres corps étrangers qui ne suppurent pas, produisent des effets aussi dangereux que ceux qui suppurent; ils diminuent ou suppriment les principales fonctions des poumons en général, ou en interceptant le commerce de l'air

avec ce viscere. Ce commerce est si essentiel, que sa diminution met dans des angoisses mortelles, & que sa suppression pendant quelques instans éteint toutes les fonctions vitales.

Ces différentes causes de la pulmonie, de ses progrès, de ses effets, tiennent souvent leur caractère de causes plus éloignées, qu'il est essentiel de connoître & de ne pas perdre de vue dans la méthode curative de cette maladie; on entend par ces causes éloignées, des vices scrophuleux, scorbutiques, vénériens, dartreux, érysipellateux, psoriques, ou de toute autre nature.

Des humeurs rhumatismales ou gouteuses fixées dans la substance des poumons; une simple disposition de la masse de liquides à contracter des vices propres à faire des érosions, à former des tubercules, établissent souvent des causes éloignées de la pulmonie, toujours dangereuses ou funestes.

Des évacuations habituelles, diminuées, supprimées ou repercutées, feroient des effets semblables, qui seroient suivis du plus grand danger, s'ils n'étoient prévenus par les ressources de la nature, ou par les secours de l'art.

On doit placer encore parmi les causes éloignées de la Phthisie pulmonaire, ces excrétiions luxurieuses devenues trop familières parmi les jeunes gens de l'un & de l'autre sexe; ce sont des abus, des excès pernicioeux qui épuisent les forces organiques, détruisent l'ordre & l'énergie de secrétions, dépravent la sanguification, la nutrition, & conduisent enfin à

des souffrances , à des Phthisies & à des langueurs qui éludent les ressources de la nature & les secours les plus puissans de l'art de guérir.

Il n'est rien d'aussi dangereux que d'anciennes suppurations , & d'éruptions cutanées repercutées ; le plus souvent l'humeur dont se forme le pus de ces ulcères , & celle qui fait le caractère des éruptions se portent dans les poumons & y font des taches mortelles , sur-tout si l'on néglige les moyens d'en garantir.

Les enfans de peres & de meres morts de phthisie , portent en naissant des dispositions à cette maladie ; ces dispositions ont toujours quelque rapport avec le caractère de la Phthisie originaire , ce qu'il ne faut jamais perdre de vue dans la méthode curative de cette maladie.

La mauvaise conformation du thorax , en comprimant les viscères de cette capacité , en gêne les fonctions ; les poumons en souffrent , la circulation s'y fait irrégulièrement : de là , des hémoptysies , des engorgemens tuberculeux , des suppurations , &c. La Phthisie est précédée ordinairement d'une voix enrouée , de pâleur à la peau , de débilité des extrémités inférieures , de maigreur. Quelquefois on est inquiété par des serremens de poitrine , par des oppressions semblables aux oppressions nerveuses qui paroissent provenir des hypocondres.

On s'apperçoit d'ailleurs des dispositions à la Phthisie , par des chaleurs incommodes à la plante des pieds & à la paume des mains , principalement

après les repas ; quelquefois pendant ces chaleurs le pouls est fréquent sans être fébrile.

Des rhumes habituels , des expectorations abondantes d'une pituite visqueuse , des frissonnemens momentanés , sont quelquefois des préludes de cette maladie ; on en trouve la méthode préservative dans la seconde section de cette partie.

C'est sans doute pour ne pas faire attention à ces symptômes & pour ne pas en prévenir les suites , que la Phthisie pulmonaire fait périr un si grand nombre de citoyens , que l'humanité en est justement alarmée ; c'est pour cette raison que je me suis permis la répétition des causes & des signes avant-coureurs de cette maladie.

CHAPITRE IV.

Règles générales pour servir à la méthode curative de la Phthisie pulmonaire.

LA méthode curative de la pulmonie , doit être établie & dirigée d'après ses causes éloignées , ses causes prochaines & ses causes immédiates ; d'après son caractère , ses différences , ses symptômes & d'après ses complications. Si les causes éloignées de cette maladie sont scorbutiques , vénériennes , scrophuleuses , dartreuses , érysypellateuses , psoriques , ou compliquées , on doit faire usage de remèdes propres à la guérison de ces vices ; on en distingue les espèces par la différence des signes qui les in-

diquent & par ceux qui sont particuliers à chacun d'entre eux ; on met en même tems en usage les secours qui conviennent au vice local qui caractérise la Phthisie pulmonaire, & aux différens symptômes qui en émanent.

On doit considérer la Phthisie pulmonaire dans ses différens degrés ; elle s'annonce au premier degré par des irritations, des toux, des hémoptysies, des érosions, des ulcères ou bien par des toux, des engorgemens lymphatiques, tuberculeux, qui viennent en suppuration, ou qui ne sont pas propres à suppurier, & qui n'en sont pas moins dangereux & funestes.

Dans ce degré on doit remédier à l'hémoptysie & fournir à la masse du sang des remèdes propres à modérer son activité, à tempérer son âcreté, à prévenir les érosions des vaisseaux & les suppurations. Si dans cet état la fibre est roide & la peau sèche, avec des signes de pléthore sanguine, on a recours à la saignée, aux bains domestiques, à des boissons émollientes & diaphorétiques. Si la Phthisie est tuberculeuse, on fait ces infusions dans une légère décoction de racines de plantes apéritives.

Lorsque la Phthisie provient de la diminution de quelqu'une des évacuations naturelles ou habituelles, ou bien d'éruptions à la peau qui se portent aux poumons, il est de la prudence & d'une saine pratique d'en faire une prompte diversion par le moyen de la saignée, de vésicatoires, de cautères, de setons, & par les secours les plus propres à garantir

les poumons des effets de ces dangereuses métastases. Si celles-ci proviennent de la suppression du flux hémorroïdal des deux sexes, ou du périodique des femmes, on seconde l'effet des saignées par l'application des sangsues à l'anús, à la vulve, &c.

Dès qu'on est parvenu à rendre la fibre moins roide & à ramolir la peau, on a égard aux premières voies ; on remédie au dérangement de leurs fonctions, par des vomitifs ménagés & par des purgatifs réitérés, lorsqu'il n'y a pas des indications qui en défendent l'usage. On passe ensuite avec plus de sûreté qu'auparavant à l'usage des diaphorétiques qui sont d'un puissant secours au premier degré de pulmonie. Ces remèdes sont propres à éloigner du centre des humeurs étrangères transpirables, qui se fixeroient dans les poumons si elles n'étoient pas déterminées par les secours de l'art, vers les pores de la peau. On préfère à cet effet les infusions, les décoctions de diaphorétiques choisis parmi les végétaux de cette classe : on les ménage selon la délicatesse des tempéramens, la consistance du sang, & selon le plus ou le moins d'irritabilité des solides.

Il est des tempéramens lents dont la fibre est lâche, chez lesquels les diaphorétiques ne seroient pas assez actifs pour provoquer une transpiration suffisante ; on met alors en usage des décoctions de bois sudorifiques, dont on a souvent obtenu de bons effets, dans de pareilles circonstances.

Lorsque la Phthisie est parvenue à son second degré, on renonce à la saignée, à moins qu'il ne

surviennent des fièvres péripneumoniques , occasionnées par l'inflammation de tubercules qui entrent en suppuration. S'il se présente des indications qui exigent des purgatifs , on s'en tient aux minoratifs les plus doux ; il seroit à craindre que , s'ils étoient plus énergiques , ils n'affoiblissent les malades , ou ne rendissent plus graves les symptômes de la maladie. On s'occupe principalement du soin de modérer la toux & de faciliter l'expectoration , sans trop l'exciter. Une toux violente ne pourroit que faire obstacle à la guérison des ulcères , & le pus par un long séjour les rendroit très-graves : cependant il seroit imprudent de trop provoquer l'expectoration , sur-tout lorsque le pus est de bonne qualité ; il est utile qu'il en reste un peu dans l'ulcère , pour favoriser la cicatrice , car les cicatrices des ulcères se forment sous un pus bien conditionné ; je l'ai déjà observé.

Les diaphorétiques & les sudorifiques qui sont souvent essentiels au premier degré de la pulmonie , deviendroient pernicioeux vers la fin du second & au troisième degré de cette maladie , sur-tout si la masse des liquides tendoit à la colliquation , ils la précipiteroient & rendroient la maladie incurable.

Les exercices modérés dans un air libre , les frictions seches sur tout le corps , sont essentiels dans la Phthisie pulmonaire ; ils soutiennent le ton des fibres relachées , ils favorisent la transpiration insensible , ils l'excitent & la soutiennent : ils soulagent les viscères en souffrance , en détournant & en dissipant par d'heureuses diversions des humeurs étran-

geres qui se fixeroient dans leur substance, si elles y faisoient quelque séjour.

Le régime de vie des phthifiques doit être sobre, doux, humectant & modéré ; ils doivent également l'observer dans l'usage des autres choses non naturelles.

Lorsque la Phthisie est avancée dans le second degré & dans le troisieme, les secours généraux les plus puissans que l'on puisse donner aux malades, consistent dans l'usage des calmans ménagés avec prudence ; des bechiques, des vulnéraires, principalement de ceux qui abondent en parties balsamiques. On prend ces remedes dans le regne des végétaux, auxquels on a reconnu cette qualité. On choisit parmi eux ceux qui abondent le plus en parties volatiles & qui ont le moins d'acreté, afin qu'ils n'irritent pas la substance des poumons, qui n'est déjà que trop en souffrance.

Les baumes ont été regardés dans tous les tems comme détersifs & propres à mondifier & à cicatrifer les ulceres ; ils font cet effet sur les ulceres extérieurs, parce qu'on les y applique immédiatement ; ils ne peuvent pas être aussi efficaces pour la guérison des ulceres des poumons, parce que leurs parties intégrantes n'y parviennent que par le moyen de la circulation des liquides. Il paroît cependant que leurs parties odorantes pénètrent & s'insinuent dans tout le corps, de même que les parties volatiles de toutes les substances de cette nature. La thérébentine qui ne differe des autres baumes que parce qu'elle est

moins épurée qu'eux , donne aux urines l'odeur des violettes de Mars ; la transpiration cutanée de ceux qui font usage du camphre , rend très-sensiblement l'odeur de cette substance volatile ; ne sont-ce pas autant de preuves que les parties volatiles dont on fait un usage intérieur , pénètrent dans les corps par les pores & par le tissu cellulaire ? C'est principalement en s'introduisant par ces voies dans la substance des poumons , que les baumes peuvent concourir à la guérison des ulcères de ce viscère. On doit préférer dans la méthode curative de la pulmonie , les baumes naturels aux factices ; ceux-ci , malgré l'opinion des Chymistes , tels que le baume de soufre & autres de cette nature , sont toujours âcres ; souvent rances & propres plutôt à irriter les poumons & à les enflammer , qu'à déterger les ulcères & à les cicatrifer. On remarque même parmi les baumes naturels , une différence considérable qui mérite aux uns la préférence sur les autres dans la méthode curative de la Phthisie pulmonaire , quel qu'en soit le caractère.

L'usage des anti-septiques est d'un puissant secours dans la Phthisie pulmonaire , pour prévenir les effets que la contagion du pus des ulcères fait ordinairement dans la masse du sang ; les baumes , la myrrhe , le camphre , la poix & tous les aromates de la même classe , sont reconnus pour avoir cette qualité. Pringle donne le sucre comme un excellent anti-septique ; depuis les expériences de cet Auteur , le sucre est généralement regardé comme tel par les gens instruits , malgré le sentiment de Boerrhaave & de Carteser

qui ont cru qu'il faisoit un effet tout contraire. Le sucre est aussi résolutif, il déterge les aphtes des enfans, & il mondifie les ulcères, par une application extérieure: il préserve puissamment de la pourriture les plantes & les substances animales. Il a encore une vertu bien précieuse, c'est qu'il est spécifique contre ce redoutable venin végétal, dont les Américains empoisonnent leurs fleches, qui en étant imbues font mourir dans le moment les animaux qui en sont blessés. Dolé ne connoissoit pas sans doute les précieuses qualités du sucre, pour la guérison de la Phthisie pulmonaire; il le regardoit comme très-nuisible dans cette maladie, par rapport à sa partie acide. Si cet Auteur avoit été instruit des effets qu'il produit sur les substances animales, il ne seroit pas tombé dans cette erreur. Lorsque les Negres de l'Amérique sont menacés de Phthisie pulmonaire, & lors même qu'ils sont Phthisiques, on les envoie dans les ateliers où l'on prépare le sucre, pour y respirer la vapeur qui s'élève des chaudières en si grande quantité, qu'elle obscurcit tout l'atelier par le nuage qu'elle y forme; ils y guérissent ordinairement en moins de deux mois de séjour.

Avicenne a donné l'observation d'une Phthisique désespérée qui guérit par l'usage du sucre rosat, dont elle mangea long-tems en très-grande quantité; *Arculanus* en rapporte une semblable: sa malade en avoit mangé quarante livres. *Cardan* guérit un jeune homme Phthisique par l'usage pour toute nourriture, de tisane & d'eau sucrée, & pour tout remède d'une

décoction de queues d'écrevisses édulcorée avec deux gros de sucre. Le même Auteur en guérit un autre par un grand usage de fraises que le malade desiroit ardemment ; il en mangea une quantité considérable , avec beaucoup de sucre ; *Cardan* attribue au sucre la guérison de ces malades. On lit dans les Observations de Burnet , qu'un Phthifique avoit éprouvé des effets très-heureux de l'usage de la conserve de roses ; il en délayoit dans sa boisson , il en mêloit avec ses alimens , & quelquefois il en prennoit pour toute nourriture en telle quantité qu'il en avoit épuisé toutes les boutiques des Apothicaires de Venise. Ces observations ne démontrent-elles pas l'efficacité de l'usage du sucre dans tous les degrés de la Phthisie pulmonaire ?

C H A P I T R E V.

Usage des six choses non naturelles , relatif à la méthode curative de la Phthisie pulmonaire.

A R T I C L E P R E M I E R.

Tous les secours de l'Art seroient impuissans dans la cure de la pulmonie , s'ils n'étoient secondés par une diete convenable à l'état des malades , & aux différens degrés de la maladie. On entend par diete l'usage des six choses que les Médecins appellent non naturelles ; ce sont , l'air , les alimens , la boisson ,

le mouvement & le repos , le sommeil & la veille , ce que l'on doit évacuer & retenir , & les passions de l'ame.

ARTICLE II.

L'Air.

L'air que respirent les Phtysiques doit être doux & serein ; il est essentiel qu'ils évitent de séjourner dans une atmosphère dont la température seroit chaude , sèche , ou trop froide. Un froid tempéré & humide convient à leur état. Un air froid dans l'automne leur seroit nuisible. Les Phtysiques doivent avoir une attention singulière à éviter une atmosphère trop sèche , & chargée d'exhalaisons âcres & putrides ; leur maladie en deviendrait plus grave , & peut-être incurable. C'est par cette raison que les Anglois phtysiques se retirent ou voyagent dans les Provinces Méridionales de la France , où ils trouvent , dans l'air pur & tempéré qu'ils y respirent , un préservatif & un remède dont il n'est pas rare qu'ils obtiennent une entière guérison.

ARTICLE III.

Les Alimens & la Boisson.

Les alimens les plus propres au premier degré de Phthisie , soit qu'elle provienne d'ulcères ou de tubercules , sont les émolliens , les adoucissans , les légèrement apéritifs & les plus aisés à digérer , tels que les herbes & les racines potagères ; la laitue par exemple , la poirée , la bourrache , le pourpier , toutes

les chicorées , les cardes , les artichauts , les racines de carottes , de panais , d'escorsonaire , de farfisi , de bettes-raves , de navets , &c. Toutes ces especes doivent être cuites en potages ou autrement , pourvu que l'assaisonnement n'en soit ni salé , ni épicé , ni aromatisé , ni chargé de ces jus incendiaires qui rendent les cuisines recherchées plus propres à causer des maladies qu'à conserver la santé.

On peut se permettre des fruits fondans , murs & bien conditionnés ; crus ou en compote ; des œufs frais à la coque , ou cuits à l'eau ou au bouillon ; ils seroient pernicioeux s'ils étoient durs. L'usage de la viande ne convient pas dans la Phthisie ; cependant on peut en faire usage pendant le premier degré , avant qu'il ne se manifeste des signes de suppuration ; on donne la préférence à la volaille , aux autres especes de volatiles en usage , & au poisson léger , cuit à l'eau ou grillé.

La boisson doit être délayante , apéritive & diaphorétique , composée de racines de pissenlit , de chien-dent , de bourrache , de chicorée blanche , de petit capillaire , de véronique , d'escabieuse , & d'autres de la même classe. On n'emploie à la fois qu'une ou deux de ces plantes ; en adoucir les infusions avec du miel , du sucre ou du syrop de capillaire. J'ai fait prendre avec succès , pour toute boisson , d'une infusion d'esquine rapée.

On doit s'abstenir pendant tous les tems de la maladie , de boissons fortes , telles que le café , le chocolat , & de liqueurs spiritueuses.

La suppuration des ulcères est déjà établie au second degré de la maladie ; les sucs gastriques se dépravent insensiblement , les fonctions des organes de la digestion s'affoiblissent & dégénèrent de l'ordre de la nature , la fièvre étiq̃ue survient , & le chyle prend une mauvaise qualité.

Tous ces désordres exigent des ménagemens scrupuleux dans le régime de vie & dans le choix des alimens. On ne peut se permettre dans cet état , sans courir les risques de se nuire , que des alimens doux , faciles à digérer , & en petite quantité. Si les alimens étoient âcres , irritans , salés , épicés ou incendiaires , le chyle conserveroit ces qualités : en passant dans les poumons , il irriteroit les ulcères , leur suppuration diminueroit , la toux deviendroît plus sèche , l'expectoration en seroit moins abondante , & la maladie plus grave.

Hippocrate connoissoit déjà ces inconvéniens ; il a donné pour précepte qu'il ne faut aux Phtyiques que très-peu d'alimens , & qu'ils doivent être de bonne qualité ; il conseille principalement les farineux. Wan-Swieten observe que si le chyle qui passe dans les poumons est épais , visqueux & en trop grande quantité , il est à craindre qu'il n'en reste d'adhérent aux vaisseaux des bords des ulcères , qu'il n'y cause des obstructions , de légères inflammations , & que les bouts des orifices de ces vaisseaux étant détruits , la suppuration n'augmente & ne donne aux ulcères un plus mauvais caractère. Ces observations sont fondées sur l'expérience.

Si les malades qui sont affligés d'ulceres extérieurs un peu considérables , commettent des excès dans le régime de vie , dès le même jour la suppuration des ulceres diminue ou cesse ; le fond en devient rouge & comme desséché. Le lendemain la suppuration se rétablit & le pus est de plus mauvaise qualité qu'il ne l'étoit auparavant.

Il en est de même des Phtyiques , s'ils mangent trop , ou s'ils se permettent des alimens qui soient contraires à leur état ; ils souffrent de l'estomac pendant tout le tems de la digestion , la chaleur étique augmente , les crachats diminuent , & quelquefois ils se suppriment. Quelque tems après l'expectoration se rétablit , & les crachats sont d'un plus mauvais caractère.

Bennet a observé qu'il est dangereux de permettre aux Phtyiques l'usage des gelées faites avec les extrémités des quadrupèdes , dans la vue de remédier à leur maigreur. Le chile qui provient de ces alimens ne peut être que très-mal digéré , mucueux , glutineux , & très-propre à former des engorgemens dans les glandes des poumons , & dans les capillaires lymphatiques qui aboutissent aux ulceres. De-là de nouvelles phlogoses , & un pus plus abondant & de plus mauvais caractère.

Il seroit donc essentiel de nourrir les Phtyiques avec du pain , du potage , des légumes , des bouillons aux racines avec des œufs , du poisson léger & des farineux de toutes especes. Ceux qui sont le plus en usage dans cette maladie sont le ris , le gruau , le

bled de turquie , l'avoine , la semouille , le sagou , le salep , les pommes de terre , &c.

Il n'est pas hors de propos d'observer que les substances farineuses non fermentées contiennent beaucoup d'air , & qu'en cela elles sont souvent difficiles à digérer , sur-tout par des malades qui ont l'estomac délicat. L'air de ces substances , en se développant dans les premières voies , se raréfie , gonfle l'estomac & les intestins , rend les digestions laborieuses , & produit une source de nausées , de rots & d'aigreurs.

On prévient ces inconvéniens en faisant torrifier les farines , ou en préparant les grains en forme de *malt*. Cette nourriture simple , conviendrait mieux aux Phytiques que les mets les plus recherchés , & que les consommés dont on a la pernicieuse coutume de les nourrir. Ces mets sont aussi dangereux que séduisans ; toujours disposés à se corrompre , le moindre mal qu'ils puissent faire , c'est de mettre obstacle à la guérison , & de rendre la pulmonie incurable. Je n'excepte pas de cette classe les bouillons de limaçons , auxquels on donne la qualité de remède dans la suppuration des poumons.

Les anciens Médecins qui ont recherché les propriétés de ces testacées , ne les ont jamais regardés comme propres à la Phthisie. Il n'y a que les Médecins du dernier siècle qui les aient donnés comme remèdes dans cette maladie. Ils ont pris sans doute cette opinion dans les ouvrages de Galien ; cet Auteur dit que les limaçons sont un puissant

restaurant ; bientôt après il reconnoît que leur chair est difficile à digérer & qu'elle ne rend pas un bon suc ; c'est une contrariété dont, sans doute, Galien n'est pas coupable, quoiqu'on la trouve dans l'immense collection de ses ouvrages. Sennert n'hésite pas à dire que les limaçons ne conviennent pas aux phtysiques, tant par rapport à la débilité de leur estomac, qu'à la dépravation des sucs gastriques & à la fièvre lente qui regne toujours dans la maladie dont ils sont affligés.

D'après ces incertitudes sur la qualité des limaçons & de leurs bouillons que l'on prodigue dans la Phthisie comme aliment & comme remède, j'ai cru qu'il seroit utile d'en fixer la propriété, afin que le public se livre moins généralement à un préjugé qui pourroit lui être nuisible. A cet effet j'ai prié M. *Fourcy*, Chymiste célèbre d'en faire l'analyse dans son laboratoire ; il l'a faite sous mes yeux, par les procédés les plus exacts & les plus propres à éclaircir ce problème.

On a placé cent limaçons dans un vaisseau clos, on les a fait infuser au bain-marie dans une pinte d'eau pendant six heures. Lorsque tout a été refroidi on a séparé le bouillon qu'on a fait évaporer à une douce chaleur, il en est résulté une gelée semblable à celle de la corne de cerf. Le bouillon avoit le goût du bouillon de viande, & la gelée celui d'amandes de pêches.

On a mis ensuite des limaçons dans une cornue qu'on a placée sur un feu de reverbere, au bec de

laquelle on a adapté un fuseau & un ballon. Toutes les jointures étant exactement lutées , on a procédé à la distillation par un feu gradué. Il en est résulté un phlegme connu sous le nom d'esprit empireumatique & de l'alkali volatil qui a tapissé l'intérieur du fuseau.

Il paroît par cette analyse des limaçons , qu'ils ont exactement les mêmes principes que les autres substances animales, que leurs bouillons & leurs gelées sont les mêmes que ceux de ces substances , & qu'ils en ont tous les avantages & tous les inconvéniens. D'après ces connoissances on ne peut attribuer aux bouillons des limaçons qu'une qualité restaurante & point médicamenteuse.

Hippocrate a donné de sages préceptes sur le régime de vie des phtyiques, qu'il seroit essentiel d'observer scrupuleusement. Plus on nourrit les corps impurs ou languissans, dit cet Auteur, plus on leur nuit. Cette vérité se manifeste sensiblement chez les phtyiques; les exacerbations de leur fièvre ont lieu principalement après les repas , sur-tout les après midi, dans le tems de la digestion. Plus ils ont pris d'alimens, plus la chaleur fébrile augmente & plus ils sont fatigués par des rots & par des borgborismes : leurs crachats paroissent le lendemain de plus mauvaise qualité.

Hippocrate observe encore que si dans les longues maladies les alimens ne restaurent pas, c'est une marque certaine qu'on en abuse, ou dans la qualité, ou dans la quantité. Il est bien rare que les phtysi-

ques ne souffrent pas après leurs repas ; il est plus rare encore de ne pas s'appercevoir que plus ils se nourrissent , plus ils maigrissent , & que les symptômes de leurs maladies deviennent de plus en plus graves.

Si les phthysiques se nourrissoient d'alimens les plus simples , & s'ils ne s'en permettoient à la fois qu'en une quantité médiocre , qui ne fatiguât jamais leur estomac , leur maladie en seroit bien moins dangereuse & leurs guérisons plus fréquentes. On a vu dans l'observation de Cardan que j'ai déjà rapportée , qu'il avoit guéri des Phthysies , dont l'une étoit héréditaire , en nourrissant les malades avec de la tisane & de l'eau sucrée ; il ne leur donnoit pour toute nourriture que quatre onces tous les matins de décoction de queues & d'yeux d'écrevisse , avec deux gros de sucre. La tisane dont se servoit Cardan étoit , sans doute , une décoction d'orge , qui étoit la tisane des anciens ; elle est en même tems nourrissante & médicamenteuse. On me passera cette répétition , en faveur des avantages que l'on retireroit d'un régime de vie à-peu-près semblable , si l'on avoit le courage de s'y soumettre.

Les alimens les plus succulens , tels que le jus de viande , les consommés & autres de cette nature sont toujours incendiaires dans les maladies de langueur & principalement dans la Phthisie pulmonaire ; il est essentiel d'en interdire totalement l'usage aux malades qui ont le malheur d'en être affligés. Il n'est point de substance plus propre à se corrompre , que

les animales ; si quelque partie du chyle qui en provient est déposée dans les ulcères des poumons , elle en augmente la corruption , le pus en devient plus fétide. Ce qui en passe dans la masse du sang , se corrompt très - promptement dans les voies de la circulation de ce liquide , par son mélange avec le pus résorbé , & en augmente la contagion.

Dans tous les âges de la Médecine , depuis Hippocrate jusqu'à nos jours , on a préconisé le lait , comme un aliment exquis & un excellent remède dans la Phthisie pulmonaire. Des observations que j'ai faites avec exactitude , pendant un demi siècle , m'ont éclairé sur ce préjugé. Je publiai l'abus de cet usage dans mon traité d'observations imprimé l'année 1752. Celles que j'ai faites depuis , jusqu'aujourd'hui , m'ont convaincu de la solidité des premières : j'en donnerai un extrait dans un chapitre particulier , à la fin de cette section.

La boisson dont les anciens Médecins faisoient le plus d'usage , sur-tout dans la pulmonie , étoit une décoction d'orge ; ils la composoient de différentes façons , la meilleure étoit de faire germer l'orge dans l'eau tiède ; on le torréfioit ensuite à une chaleur un peu vive , pour le purger d'air ; on concassoit les grains & on les faisoit cuire dans l'eau jusqu'à ce qu'elle eût pris la couleur de tisane , qui étoit en même tems détersive & nourrissante.

Une légère décoction de dattes , de jujubes , de sebestes , de pignons doux , de figes grasses , est d'un très-bon usage dans la Phthisie pulmonaire ;

on n'emploie à la fois que deux ou trois especes de ces fruits ; ils ont tous les mêmes propriétés , à quelque différence près.

Les dattes sont nourrissantes , pectorales , adoucissantes , détersives & légèrement astringentes. Les jujubes ont les mêmes qualités , à l'exception qu'elles ne sont pas astringentes. Les sebestes sont laxatives comme les pruneaux , elles ont d'ailleurs les mêmes propriétés que les jujubes. Les pignons doux sont adoucissans , humectans , rafraîchissans , détersifs & très-propres à calmer la toux. Les figues sont également pectorales.

Comme les sebestes sont laxatives , on les préfère dans les constipations ; & on se sert de dattes lorsque les malades ont des dispositions au cours de ventre.

Lorsque les crachats des phtysiques sont épais , gluans , & que l'expectoration en est difficile , on la rend plus aisée en divisant les crachats par l'usage d'une tisane de bourrache , ou bien d'une infusion d'hysope ou de thym qu'on adoucit avec du miel , ou du syrop d'érysimum : on ne se sert pas de miel quand on a des dispositions au cours de ventre.

Dans tous les tems de la suppuration des poumons , on ne doit jamais perdre de vue qu'on a des ulcères à déterger , à mondifier , à cicatrifier , & qu'il est essentiel d'approprier les tisanes à ces vues curatives. Une tisane de mille-feuille , avec les gommés arabique ou adragant , remplit ces indications & souvent avec un heureux succès. Je lui dois en partie la guérison de plusieurs de mes malades.

On varie ces différentes boissons, ou bien on les donne alternativement ; les seuls Médecins peuvent les diriger à propos, selon les différentes indications ; elles conviennent également au second & au troisième degré de la pulmonie, il ne s'agit que de les placer selon l'état de la maladie & la situation des malades.

ARTICLE IV.

Le Mouvement & le Repos.

L'exercice est essentiellement nécessaire pour concourir à la guérison de la Phthisie pulmonaire ; cependant il doit être ménagé selon le ton plus ou moins soutenu, plus ou moins élastique des fibres organiques des viscères de la poitrine. Comme dans cette maladie tout tombe dans le relâchement & en dissolution, un exercice modéré soutient le ton chancelant des membranes des vaisseaux, seconde les vues de la nature & favorise ses ressources. La mesure de ce mouvement est aisément calculée par son effet ; il est salutaire autant que les malades le supportent sans se fatiguer. S'ils le portoient plus loin, il feroit de très-mauvais effets.

Dans le premier cas, l'exercice facilite la respiration, il soutient la circulation des liquides & favorise leur distribution dans les vaisseaux des poumons ; dans l'autre il en troubleroit l'ordre & rendroit irrégulier le concours nécessaire entre les liquides & les solides. Il résulteroit de ce désordre de plus grands engorgemens dans la substance pulmonaire, & le danger deviendroit plus prochain.

L'exercice doit être plus grand & plus soutenu au premier degré de Phthisie, parce que les forces des malades n'ont encore décliné que très-peu de l'état naturel.

On doit faire de l'exercice, autant qu'il est possible, dans un air libre, pur & tempéré ; il consiste en des promenades à pied, à cheval, ou en voiture. Si ces moyens sont impraticables, on y supplée en se promenant dans les appartemens, & par des frictions seches sur tout le corps, avec des serviettes à demi usées, ou avec des brosses d'Angleterre.

Un trop grand repos favoriseroit de plus en plus le relâchement des fibres organiques, ralentiroit la circulation des liquides ; la colliquation feroit des progrès, le ton des fibres des poumons s'affoibliroit ; ce relâchement feroit suivi de plus grands engorgemens ; le mouvement alternatif de la respiration se feroit avec plus de gêne & deviendrait plus laborieux ; le pus croupiroit dans les ulceres & dans les bronches, sa qualité dégénéreroit de plus en plus, tout concoureroit à rendre la maladie plus dangereuse & moins susceptible de guérison.

A R T I C L E V.

Le Sommeil & la Veille.

Le sommeil & la veille doivent être modérés ; l'un & l'autre seroient nuisibles s'ils étoient excessifs. Pendant le sommeil la respiration est plus lente, mais plus forte & plus aisée que pendant la veille. La circulation du sang se fait d'une manière plus

égale , & les sécrétions en sont moins troublées. Pendant un sommeil modéré le chyle se purifie des humeurs excrémenteuses qui feroient obstacle à la sanguification & à la nutrition ; les pertes de substance qui ont lieu pendant la veille , sont réparées pendant le sommeil , la nutrition se fait avec une égalité moins troublée & plus rapprochée de l'ordre de la nature.

Les poumons des phtysiques qui jouissent de ces avantages sont moins agités dans le sommeil que dans la veille ; comme dans le premier la circulation des liquides est moins inégale , le pus des ulcères en est moins mal conditionné , & au réveil l'expectoration s'en fait avec plus d'aisance.

Si le sommeil des phtysiques étoit trop long , ce qui reste de ton aux fibres des solides de ce viscère s'affoibliroit de plus en plus ; la circulation des liquides en deviendroit plus lente & plus embarrassée ; les vaisseaux capillaires lymphatiques qui environnent les ulcères s'engorgeroient d'une lymphe qui , par la lenteur de sa circulation , acquerroit une densité très-propre à donner au pus une qualité irritante , & aux crachats une viscosité qui rendroit la toux plus forte , plus fréquente & l'expectoration plus difficile.

Pendant la veille il se fait constamment une déperdition de substances animales ; si les veilles sont de trop de durée ou excessives , la perte des substances est plus considérable , elle ne sauroit être réparée pendant le sommeil. Dans la veille les passions de

l'ame maîtrisent les sens & troublent les fonctions du corps ; il en survient des serremens de poitrine , des étouffemens & des foiblesses quelquefois alarmantes. Pendant le sommeil les passions se taisent , les fonctions se font en général plus régulièrement , & chez les phtyiques avec moins d'irrégularité.

A R T I C L E V I.

Ordre nécessaire des évacuations.

Il est essentiel d'entretenir dans l'ordre de la nature les évacuations ordinaires ; celles qui se font par les voies de la transpiration , par celles des garderobes , des urines & par celles de l'expectoration. Si quelque-une de ces évacuations diminue , se supprime , ou devient trop abondante , c'est toujours dans la Phthisie au préjudice des poumons ; la maladie en devient plus grave.

Les humeurs qui se séparent de la masse des liquides , par les voies de la transpiration cutanée & de la pulmonaire , sont le produit des dernières digestions , & les plus abondantes , selon *Santorius* , des matieres excrémenteuses. Si ces matieres étoient retenues même en partie dans le système des vaisseaux elles se porteroient & se fixeroient infailliblement dans les poumons des phtyiques , & par préférence dans les parties de ce viscere déjà mutilées par des tubercules , par des ulcères , & épuisées par des suppurations : tout tomberoit dans le plus grand désordre ; il n'en faudroit pas davantage pour rendre la maladie incurable & mortelle.

C'est en soutenant ou en provoquant une transpiration abondante ou de légères sueurs pendant le premier degré de pulmonie & au commencement du second, que l'on rend efficaces les différentes méthodes curatives qu'exigent les causes & les symptômes. Il n'en est pas de même vers la fin du second & dans le troisième degré, les sueurs alors sont colliquatives, elles proviennent d'un principe de corruption, & ôtent à la nature & aux Médecins les ressources nécessaires pour la guérison de cette affligeante maladie.

La liberté des garderobes est essentielle dans tous les tems de la Phthisie pulmonaire ; mais les constipations sont dangereuses dans les commencemens, & les cours de ventre sont mortels lorsqu'elle est parvenue vers la fin du second & dans tous les tems du troisième degré. Dans le premier cas les excréctions cutanées ne se font qu'imparfaitement, les vaisseaux du sang & de la lymphe sont surchargés d'humeurs excrémenteuses qui, se portant dans la substance des poumons, en augmentent les embarras, les engorgemens, les irritations. Dans le second cas on tombe dans l'épuisement par des évacuations trop abondantes qui conduisent à grands pas à une entière consommation. On trouvera dans le cours de cet ouvrage des observations relatives à ces objets.

Il en est des urines comme des garderobes ; si elles ne coulent pas assez, ce qui en est retenu passe dans les voies de la transpiration, les surcharge, cause des engorgemens qui affectent prin-

ciatement la substance pulmonaire , dans laquelle ce liquide excrémenteux est décidé de préférence par la débilité de ce viscere , & par les vices dont il est affecté. Si les urines sont trop abondantes , la colliquation des liquides s'accomplit très-promptement ; les malades succombent à l'épuisement. En favorisant le cours des urines dans le premier cas , & en diminuant leur abondance dans le second , on suivra , ou l'on remplira les indications curatives qui se présentent dans ces circonstances scabreuses.

A R T I C L E V I I .

Les passions de l'ame.

Les passions de l'ame , telles que les sollicitudes de tout genre , la crainte , la tristesse , la colere , les trop grandes contentions d'esprit , les desirs immodérés , les abus , les excès auxquels ils entraînent , mettent un trouble général dans l'ordre des fonctions , diminuent ou suspendent les secrétions , les excrétions ; en déterminent & en fixent la matiere dans la poitrine déjà en souffrance. Ce sont autant de causes propres à favoriser & à augmenter les vices que les poumons ont contractés , & à les rendre incurables.

Les ressources de l'Art sont impuissantes contre de tels abus & de tels excès ; les malades doivent en chercher le remede dans celles de la raison.

CHAPITRE VI.

Abus du lait dans la Phthisie pulmonaire.

ARTICLE PREMIER.

Abus du lait en général dans la Pulmonie : Ses effets.

J'AI traité assez au long dans mon livre d'observations de Médecine de l'abus du lait dans tous les degrés de la pulmonie ; comme ces connoissances sont essentielles pour la conservation de l'espece humaine , j'ai cru qu'il seroit utile de donner dans ce chapitre un extrait de cet ouvrage. J'y ai ajouté de nouvelles observations afférentes à cet objet important.

La nature a destiné le lait pour servir de premiere nourriture à une grande partie des animaux. Ce liquide quand il est bien conditionné a une saveur douce & agréable, on n'y découvre d'abord ni acides ni alkalis, de même que dans les autres substances animales ; on doit en présumer qu'il est analogue à ces substances , & qu'il est très-propre pour les nourrir & pour en réparer les pertes.

Le lait ne differe du chyle qu'en ce qu'il ne fournit jamais par l'analyse d'alkali volatil. Il est plus trituré que le chyle, il a déjà été digéré ; il exige moins d'action de la part des organes des digestions, que les autres alimens ; il paroît par là qu'il leur doit être préféré, lorsque ces organes ne sont pas par-

faitemment leurs fonctions. On a saisi cette idée dès le berceau de la Médecine ; il est des cas & des circonstances qui exigent qu'on ne l'abandonne pas.

Le lait rétablit des poitrines foibles ; il fortifie & soutient des viscères débiles, délicats & irritables ; il en calme les spasmes, en modere les éréthismes, favorise l'élasticité de leurs fibres membraneuses, & concourt à la liberté de leurs fonctions.

On ne donne pas seulement le lait comme aliment, on le donne aussi comme remède ; on en retire de grands avantages quand on le prend avec prudence & qu'on n'abuse pas de son usage. Le lait prévient des desséchemens, il répare des maigreurs & des pertes de substance, causées même par des Phthysies pulmonaires, pourvu que la fièvre étique soit tombée & que les malades n'éprouvent plus des mouvemens spastiques, des éréthismes phlogistiques, des météorismes dans les entrailles, des sueurs colliquatives, des cours de ventre bilieux ou sanguinolens, des hémorragies, &c. Dans tous ces cas, l'usage du lait seroit dangereux, tant comme aliment que comme remède.

Quoiqu'on ne découvre d'abord dans le lait, ni acide ni alkali, il contient cependant de ces principes, & sur-tout des acides combinés dans de si justes proportions, qu'ils ne sont point sensibles : tandis que le lait reste dans cet état, qu'il est digéré sans trop de chaleur, sans trouble, sans précipitation ; qu'il ne trouve dans les premières voies, ni dans les vaisseaux du sang des matières propres à le cor-

rompre , il ne peut que produire de bons effets ; s'il en est autrement , c'est un aliment à craindre & un remede insidieux.

Le lait se corrompt aisément, il s'aigrit de lui-même ; il se coagule quand il est battu , sans mélange d'acides. Si l'on y mêle un acide lorsqu'il est nouvellement trait , il se caille subitement. Le sang aussi se coagule , si l'on y mêle un acide pendant qu'il est chaud.

Les alkalis fixes coagulent également le lait , qui acquiert de ce mélange une couleur rousse approchant de la rouge ; cela provient de ce que les alkalis en attaquent la partie grasse.

Le lait s'alkalise dans les fièvres , il change de couleur ; on l'a vu devenir jaune du soir au lendemain. La chaleur qu'éprouve le sang par toute autre cause , produit le même effet : on voit tous les jours que la chaleur du feu accélère la coagulation du lait. Ce liquide est susceptible de ces accidens , sur-tout lorsqu'il a perdu ses combinaisons & que la partie butireuse , ou la crème , la caseuse & la séreuse sont séparées les unes des autres. La crème s'aigrit d'elle-même ; la fièvre la rend âcre , rance & nidoreuse. La partie caseuse acquiert bientôt une âcreté très-forte & se pourrit , comme il paroît par l'odeur de corne d'animaux qu'elle rend quand on la brûle. La partie séreuse quand elle est séparée des autres ne se corrompt pas aussi aisément ; on peut la donner en certaines circonstances , même dans la Phthisie , comme aliment & comme remede.

Le suc gastrique & les autres récrémens qui servent à la digestion , ne peuvent qu'être dégénérés dans la Phthisie pulmonaire ; le lait ne sauroit donc être que mal digéré dans cette maladie. Les sucs digestifs proviennent de la masse du sang , de laquelle ils ont pris leur caractère dépravé ; celui qu'ils ont donné au lait doit donc augmenter par-tout où il est mêlé avec le sang dans les voies de sa circulation , puisque par-tout il trouve les mêmes principes de corruption. Le lait ainsi altéré , devient contagieux à lui-même & à la masse générale des liquides ; les uns & les autres concourent mutuellement à augmenter leur dépravation.

Willis a observé que le sang se corrompt de lui-même , tout comme le lait ; l'un & l'autre s'aigrirent avant de se corrompre. L'acide du lait étant développé dans les vaisseaux du sang , ne peut que lui communiquer cette qualité ; le sang la communiqueroit également au lait , s'il ne l'avoit pas déjà contractée.

Fernel remarque que le lait se corrompt aisément dans des estomacs chauds & bilieux. Sennert comprend le lait grumelé dans la classe des venins. On lit dans les ouvrages de Galien que si l'on prend souvent du lait , il s'aigrit & cause des nausées avant d'être digéré. Dolé observe que si l'on fait usage de lait , on doit faire attention qu'il n'y ait pas dans l'estomac des acides développés , parce qu'il s'y coaguleroit & causeroit plus de ravage qu'on n'en obtiendrait de bons effets.

On doit conclure d'après tous ces exemples, que quelque précaution que l'on prît pour prévenir la corruption du lait dans l'estomac & dans les vaisseaux des phthisiques, on n'y réussiroit point. Lorsque la masse des liquides a dégénéré, le principe de corruption est général, il est toujours le vice dominant, & le lait ne sauroit être garanti de ses pernicieux effets.

Lorsque le lait est corrompu dans l'estomac, il occasionne des nausées, des vomissemens, de vives coliques, des diarrhées, des dysenteries; la fièvre s'ensuit, &c. Lorsqu'il est altéré ou corrompu dans les vaisseaux du sang, il rend plus graves tous les symptômes de la Phthisie pulmonaire; il précipite la colliquation de ce liquide & abrège des jours qui seroient plus de durée, si l'on ne faisoit pas usage de cet aliment perfide, ou de ce remède insidieux.

ARTICLE II.

Abus du lait au premier degré de Phthisie pulmonaire.

Le lait peut tempérer & guérir certains vices des poumons, & même prévenir la pulmonie, je l'ai déjà observé; dès que cette maladie s'établit, l'usage du lait ne sauroit être que dangereux ou funeste; si elle commence par la rupture des vaisseaux, il s'ensuit une hémorragie & une fièvre aiguë qui donnent toute exclusion à l'usage du lait. La suppuration survient ordinairement à la suite de cette fièvre, le lait rendroit le pus de plus mauvaise nature, & la maladie en deviendroit plus grave dès

son commencement. Si la pulmonie commence par l'érosion des vaisseaux, l'ulcere & la suppuration s'ensuivent ; de là le même inconvénient que le précédent concernant l'usage du lait. D'ailleurs le principe d'âcreté qui a formé l'érosion pourroit seul corrompre le lait, & en rendre l'usage dangereux, même avant la suppuration. Dans ces différens cas on ne peut distinguer le premier degré de pulmonie, puisque la suppuration qui en est le premier symptôme, indique le second degré de cette maladie.

Les tubercules des poumons sont des obstructions qui se forment par degrés ; ils commencent par une densité générale de la partie blanche du sang, ou par des concrétions lymphatiques, qui engorgent les glandes des poumons, ou les extrémités des vaisseaux lymphatiques artériels de ce viscere, & y forment des obstructions. On a déjà vu que les tubercules commencent par la mollesse & finissent par la dureté ; qu'il s'ensuit enfin des phlogoses, des inflammations, des suppurations, des fièvres étiques, des colliquations, &c.

Le premier degré de la Phthisie qui provient de tubercules, se termine par la suppuration ; jusquelà le lait est très-propre à les accroître & à les multiplier. Le principe qui coagule la lymphe, n'agit pas moins & n'a pas moins d'effet sur le lait, qu'il n'en a sur la partie blanche du sang ; d'ailleurs le lait est confondu avec elle dans la sanguification, il doit en prendre les qualités & en subir les dérangemens, les inconvéniens, &c. Le lait de lui-même en cir-

culant dans les vaisseaux des poumons, laisse dans les glandes de ce viscere, qui sont déjà engorgées, des molécules de sa partie caseuse qui augmentent les engorgemens tuberculeux, les multiplient, & concourent à rendre la maladie plus grave & plus dangereuse.

Les tubercules qui ne sont pas de nature à supurer, forment des engorgemens dans les bronches & dans les vésicules bronchiques, qui gênent, troublent, dérangent & affectent les principales fonctions de ce viscere. Si dans cet état on fait usage de lait, les molécules les plus denses de sa partie caseuse s'arrêtent dans les glandes & dans les calibres des vaisseaux capillaires dont le diamètre est diminué ou presque effacé par la compression des tubercules ; ils y forment des engorgemens qui accomplissent la Phthisie pulmonaire. Barbeirac a observé que si la Phthisie provient d'obstructions, il faut les guérir avant de prescrire l'usage du lait, crainte qu'il n'augmentât ces engorgemens.

Le lait se coagule par lui-même ; combien ne doit-il pas se coaguler plus promptement, lorsqu'il trouve dans les poumons des obstacles qui s'opposent à sa circulation, à sa distribution, à sa dépuration. Il produit de pareils effets dans les autres viscères, lorsqu'il y rencontre des obstacles semblables, lorsqu'on le prend mal à propos, ou que l'on abuse de son usage : j'en rapporte un exemple.

Le treizieme malade dont Hippocrate fait mention dans le troisieme livre des épidémies, étoit incom-

modé depuis quelque tems, cependant ses incommodités étoient supportables, il vaquoit à ses affaires; ses entrailles paroissoient volumineuses; il ressentoit depuis long-tems une douleur à la région du foie. Ce malade n'étoit pas réservé sur sa façon de vivre, il faisoit un grand usage de lait. Il lui survint de la fièvre qui fit des progrès, elle fut enfin marquée par des exacerbations; il se déclara un nombre de symptômes différens qui le conduisirent à une entière extinction.

Valésius, en interprétant le texte d'Hippocrate sur cette maladie, observe que comme le malade avoit déjà un peu de fièvre, son mauvais régime & principalement l'usage du lait augmentèrent les symptômes de sa maladie. Il ne convient pas, dit cet Auteur, de faire usage du lait avec la fièvre, principalement lorsqu'il y a des obstructions dans les viscères & tension aux hypocondres: dans tous ces cas, la partie laiteuse donne beaucoup de flatuosités, la caseuse donne des obstructions. Le lait se corrompt aisément, selon lui; & lorsqu'il se forme en grumaux, il donne des dégoûts très-dangereux. Valésius observe en même tems qu'Hippocrate s'étoit apperçu que le lait s'étant corrompu dans les entrailles de son malade, avoit donné lieu à l'augmentation des engorgemens de ses viscères, à celle de la fièvre & avoit rendu les symptômes plus graves. Il est à présumer que la maladie n'auroit pas été mortelle sans cette imprudence.

Comme le lait passe dans les poumons avec le

chile dans toute sa quantité , & avec sa qualité , les concrétions laiteuses doivent plutôt se former dans les glandes & les extrémités capillaires des vaisseaux pulmonaires que par tout ailleurs. Ce sont ces vaisseaux qui reçoivent le lait , & le distribuent dans toute la substance de ce viscere ; leurs divisions infinies forment autour des vésicules, l'important réseau, connu sous le nom de réseau de Malpigi.

Il peut aussi se former des tubercules laiteux dans les extrémités des arteres lymphatiques , qui dérivent de l'artere brochiale , & gênent leurs mouvemens systaltiques , de laquelle la substance des poumons prend sa nourriture. Cependant il est rare qu'il s'y en forme , parce que le lait ne parvient dans cette artere , qu'après avoir circulé dans les poumons , d'où il revient au cœur , avec les autres liquides , à l'aorte enfin & aux intercostales , où l'artere bronchiale prend naissance.

Lorsqu'il s'est formé des tubercules dans les poumons , ils raccourcissent les oscillations des fibres membraneuses des vaisseaux ; ce sont autant de forces irrégulières dans la substance de ce viscere , qui accomplissent les concrétions du lait déjà figé par le principe coagulant , durcissent les tubercules , & font qu'ils suppurent plus promptement que ceux des autres viscères.

Morton a observé que si les Phytiques ont des obstructions au foie , il faut éviter l'usage du lait , parce qu'il augmente les obstructions , & qu'il

cause des ulcères , des hydropisies , qui rendent la première maladie incurable.

N'est-ce pas décider formellement , en suivant l'analogie des obstructions , que le lait convient moins encore dans les tubercules des poumons , puisqu'il y trouve bien plus de causes de coagulation , de putréfaction , que dans les autres viscères.

Dessaut a toujours observé à l'ouverture des corps morts de Phthisie , des embarras considérables au foie. Il ajoute , qu'il a vu des Phthisies sans ulcères , & non jamais sans tubercules. Il est très-rare , pour ne pas dire impossible , que dans la Phthisie pulmonaire , il n'existe des engorgemens lymphatiques dans quelque'un des viscères du bas-ventre , principalement au foie , & au mésentère. Bien plus , j'ai toujours trouvé dans les dissections des morts de cette maladie , des tubercules aux poumons , quoique la Phthisie eût commencé par des ulcères : ces engorgemens , ces tubercules sont généralement lymphalico-bilieus , ou tournés en pourriture.

Il seroit superflu de donner plus d'étendue à ces observations , sur les mauvais effets du lait , au premier degré de Phthisie ; j'en ai dit assez pour les gens de l'art ; il seroit heureux que , d'après ces exemples , le public revînt de son préjugé sur l'utilité prétendue de ce remède insidieux , dans une maladie qu'on doit regarder comme une plaie du genre-humain ; je l'ai déjà observé.

ARTICLE III.

Abus du lait au second degré de Pulmonie.

La fièvre est peu sensible, quelquefois elle ne l'est pas au premier degré de pulmonie; au second elle devient considérable, alors la toux augmente, les ulcères sont formés, ils suppurent, les tubercules s'enflamment & tombent en suppuration: la chaleur est inquiétante, on crache du pus, les symptômes de la maladie deviennent de plus en plus graves, & se multiplient; le sang se corrompt insensiblement, on tombe dans le marasme.

Quel bon effet pourroit faire le lait dans cette maladie, avec tous ces symptômes, puisque chacun d'eux seroit en état de le corrompre? J'ai déjà observé que la fièvre l'alkalise, que les battemens irréguliers qu'il éprouve dans les poumons, le coagulent; que son mélange avec les acides le grumele, que les alkalis font le même effet, & qu'il est un poison, étant grumelé: que passant dans cet état dans les vaisseaux du sang & de la lymphe, il se corrompt de plus en plus, & qu'il concourt avec le pus résorbé des ulcères, à mettre le comble à la corruption de la masse générale des liquides animaux: le lait est susceptible de tous ces désordres dans la Phthisie pulmonaire.

Que le suc de l'estomac tienne dans cette maladie de l'acide, ou de l'alkali, que l'un ou l'autre de ces principes excède dans le sang ou dans la lymphe, le lait ne peut que se corrompre.

Si l'on mêle avec la salive d'une personne saine , quelques gouttes d'esprit de vitriol , elle se coagule dans l'instant du mélange , & devient blanche & gluante, semblable en tout à la salive des Phthifiques. Si l'on répand des acides dans la sérosité du sang , elle se coagule & devient blanche comme la salive des Phthifiques ; il en arrive de même au lait par le mélange des acides.

La premiere expérience insinue que la salive des Phthifiques est coagulée par les acides ; on fait que la salive est analogue au suc gastrique ; ce suc chez les Phthifiques doit être également acide : il est par conséquent en état de coaguler le lait dans ce viscere. Si la lymphe du sang , & le sang lui-même sont altérés par des acides , le lait devenu acide dans l'estomac , doit augmenter l'altération de ces liquides , dans leurs propres vaisseaux , de sorte que les uns & les autres se font dégénérer mutuellement. D'après ces expériences , quels bons effets pourroit-on espérer du lait dans la pulmonie ? si un principe alkalin excède dans les premieres voies , il accomplit également la corruption du lait , celui-ci celle du sang ; l'un & l'autre concourent à se faire dégénérer.

La communication continuelle qui se fait du suc altéré de l'estomac , & du pus des ulceres , avec le lait & le sang , fait passer ces liquides par degrés à la putréfaction , & conduit les solides à un dessèchement général.

Baglivi injecta de l'esprit de vitriol dans la ju-

gulaire gauche d'un chien ; cet animal commença d'abord par se débattre & hurler : il mourut dans un demi-quart-d'heure , après s'être extrêmement débattu. On l'ouvrit , & l'on trouva que la substance des poumons étoit totalement desséchée , le sang des vaisseaux des poumons étoit entièrement figé & noir comme un charbon. La partie du cou où l'on avoit fait l'expérience étoit noire & comme sphacelée. Il paroît par cette observation combien les acides sont destructeurs des substances animales.

Le lait aigri dans l'estomac & dans les vaisseaux des pulmoniques ne feroit pas des effets aussi prompts que ceux que produit l'esprit de vitriol étant injecté dans les vaisseaux ; ceux que feroit ce puissant acide , s'il passoit dans les voies de la digestion , feroient beaucoup moins violens , pourvu qu'on en ménageât la dose & qu'on en modérât la violence , de façon qu'il ne pût pas saisir tout-à-coup les membranes de l'estomac & les brûler. Quoi qu'il en soit , les pulmoniques ne se dessèchent-ils pas insensiblement , & leur sang ne se corrompt-il pas en totalité ? Si les acides y contribuent , comme on ne peut en douter , pourquoi s'obstiner à favoriser cet effet dangereux , & à l'augmenter par l'usage du lait ?

D'habiles Médecins , des Praticiens consommés sont souvent tombés dans les écueils où les a conduits l'ancien préjugé sur la prétendue efficacité de l'usage du lait dans la pulmonie. Un des plus renommés recommande le lait dans cette maladie ,

comme aliment & comme remède , parce que le sang tourne facilement ce liquide en sa propre substance. Quelle opinion , quelle erreur ! N'est-ce pas précipiter la fin d'un phtyrique , que de lui fournir une nourriture qui prend facilement la qualité d'un sang déjà dépravé , & qui est très-propre à accomplir sa corruption ?

On prend ordinairement des précautions quand on donne du lait aux pulmoniques , pour le garantir de la corruption ; on se sert à cet effet , d'absorbans , d'eau de chaux , d'infusion de plantes aromatiques , &c. Ces prétendus préservatifs de la corruption du lait ne sont-ils pas rendus nuls & impuissans , par l'analyse animale , ou pour mieux dire , par une infinité de foyers qui agissent sur le lait dans le corps des pulmoniques ? Ici , en y mêlant des fucs vicioux , propres à le corrompre ; là en le battant irrégulièrement ; ailleurs en l'échauffant , &c. Son principe acide pourroit-il ne pas se développer , & ne pas devenir le principe dominant en passant par toutes ces épreuves ?

Ces précautions si recommandées feroient seules soupçonner les mauvais effets que le lait est capable de produire dans la pulmonie , quand on n'auroit pas d'autres raisons pour s'en convaincre. On ne craint rien de la qualité d'un bon aliment , & on est dans une entière sécurité sur les effets d'un bon remède. On ne mêle pas avec cet aliment ni avec ce remède des correctifs contraires à leur nature. C'est cependant ainsi qu'on en agit à l'égard du

lait dont on fait faire usage dans la Phthisie pulmonaire. N'est-ce pas comme si l'on mêloit de la thériaque avec le suc de cyguë que l'on feroit prendre à un animal pour empêcher ce suc de faire sur lui l'effet d'un poison ?

Quelques jours après qu'on a mis les malades à l'usage du lait , sur-tout au second degré de pulmonie , quelques précautions que l'on prenne , les crachats deviennent plus abondans , plus fétides , & acquierent une plus mauvaise qualité ; les mêmes accidens arrivent également par l'usage du lait à ceux qui sont affligés de vieux ulcères. Je fus appelé, dans l'année 1748 , pour un jeune Officier qui portoit un ulcere baveux , à la partie moyenne latérale gauche du thorax ; il provenoit d'un abcès suppuré depuis plusieurs mois. On étoit alarmé de la durée de cet ulcere & de sa mauvaise qualité. Ce jeune homme étoit délicat & très-sage ; on lui faisoit prendre beaucoup de lait dont il faisoit pour ainsi dire sa principale nourriture. J'attribuai au lait la durée de l'ulcere & son mauvais caractère ; j'en fis cesser l'usage , & fis nourrir le malade de légumes & de farineux. Je m'apperçus dans peu de jours que le pus perdoit de sa mauvaise odeur , & que l'ulcere prenoit un meilleur caractère ; dès ce moment il se déterge à vue , dans trois semaines la cicatrice fut parfaite. Puisque le lait fait d'aussi mauvais effets sur des ulcères simples ; combien ne doit-il pas en faire de mauvais sur ceux des poumons dans la Phthisie qui est toujours compliquée d'un nombre

de causes & de symptômes, dont les moindres seroient en état de corrompre ce liquide jusqu'à la putréfaction.

Le Docteur Leich ne faisoit pas prendre du lait au second degré de Phthisie ; il en connoissoit tout le danger. Hecquet pensoit sans doute comme cet Auteur, puisqu'il observe, d'après Hippocrate, que le lait ne convient dans cette maladie que lorsque les sucres sont devenus tranquilles, & que les viscères sont bien tempérés ; ce qui ne peut avoir lieu que dans la convalescence.

Morton, qui avoit souvent occasion de s'appercevoir des mauvais effets du lait dans la pulmonie, puisqu'il l'y prodiguoit presque toujours, dit enfin que, s'il survient une diarrhée à la suite de son usage, & qu'on ne puisse pas la guérir par le moyen du laudanum ou des astringens, ou que si, l'ayant guérie, il reste encore des vomissemens, ou des embarras dans l'estomac, c'est un signe que le lait s'est coagulé comme un fromage ; dans ce cas, ajoute cet Auteur, il n'en faut plus donner de quelque espece que ce soit. Quels pernicioeux effets le lait ne doit-il pas avoir opéré dans la masse du sang, lorsqu'il cause des dérangemens si dangereux dans le canal intestinal, puisqu'ils ne peuvent provenir que du désordre général que ce liquide a accompli dans la masse du sang & dans le système des solides ? Combien ne seroit-il pas heureux alors d'en avoir pros crit l'usage ?

S'il est quelqu'un qui, avec des symptômes de Phthisie, ne tombe pas dans ces accidens, & qui vive long-tems en crachant du pus, c'est que le sang s'est dépuré, que les fonctions de l'estomac se sont rétablies, que les ulcères sont devenus calleux ou adhérens, que le pus passe directement dans les bronches sans communiquer avec le sang. Dans ces cas, on n'a plus de fièvre étiq. & l'on peut prendre du lait & cracher du pus sans danger.

Hippocrate donne, dans le 64^e aphorisme du 5^e livre, des Regles générales, pour l'usage du lait, & sur-tout dans la Phthisie pulmonaire.

Le lait, dit cet Auteur, ne convient pas dans les douleurs de tête ni dans la fièvre ; il est contraire à ceux dont les hypocondres sont météorisés, qui ont des borborigmes & de l'altération, & à ceux dont les déjections sont bilieuses. Il convient aux phthysiques qui n'ont que très-peu de fièvre, & dans les fièvres de langueur, lorsqu'il n'existe aucun des symptômes ci-dessus.

Hippocrate, en disant que le lait convient aux phthysiques qui n'ont que très-peu de fièvre, veut dire sans doute qu'il ne convient qu'à ceux qui sont en convalescence ; il a raison, le lait est nécessaire alors pour réparer la perte de substance qui s'est faite pendant la maladie. Dès que la fièvre étiq. est établie, elle fait des progrès jusqu'à la convalescence, ou jusqu'à la mort ; ce n'est donc qu'à la convalescence que l'on peut hasarder l'usage du lait ; c'est dans ce seul cas qu'il peut convenir aux phthysiques.

Le lait convient aussi dans les fièvres de langueur, dit le pere de la Médecine , pourvu qu'il n'y ait aucun des symprômes marqués dans son aphorisme. Il y a apparence que la même exception concerne aussi la Phthisie pulmonaire ; comme cette maladie ne fut jamais sans quelqu'un ou sans plusieurs de ces symptômes, Hippocrate ne peut avoir conseillé l'usage du lait que dans la convalescence.

On a vu dans l'article précédent qu'Hippocrate désapprouve l'usage qu'avoit fait du lait le treizieme malade dont il est fait mention au troisieme livre des épidémies, quoiqu'il n'eût quand il en prit qu'une fièvre lente à peine sensible ; c'est une marque non équivoque qu'il n'approuva jamais l'usage du lait dans des fièvres de cette nature.

Hecquet , en commentant l'aphorisme d'Hippocrate que je viens de rapporter, dit qu'on ne peut commettre de fautes plus graves que dans l'usage du lait dans la pulmonie, pour laquelle on le donne comme un remede souverain ; il avertit qu'on ne peut le donner dans cette maladie que lorsqu'il n'y a point de marques de colliquation.

Il faut donc conclure d'après Hippocrate & son commentateur , que , comme dans la pulmonie il y a toujours fièvre, chaleur, roideur & d'autres causes de colliquation, le lait ne peut y faire que de dangereux effets.

La pratique d'Hippocrate confirme son aphorisme; il traite dans le second livre des maladies, de trois especes de pulmonie, dont deux avec ulceres aux

poumons & avec tous les symptômes ordinaires dans ces maladies. Les remedes dont il fait usage sont dignes d'un tel maître ; mais il ne donne pas de lait. Si cet Auteur fait prendre pendant la maladie une fois ou deux du lait d'ânesse cuit, ce n'est que comme purgatif. Qu'on juge par cette sage pratique, si ce grand Médecin auroit fait dans la pulmonie un long usage d'un remede qu'il n'employoit qu'à la place d'un autre purgatif, lui qui ne redoutoit rien tant que le cours de ventre dans cette maladie.

Cette pratique d'Hippocrate a un parfait rapport avec son aphorisme ; cependant on trouve dans le livre *des affections internes* une pulmonie, dans laquelle on fait usage de lait. La sagacité d'Hippocrate & son exactitude dans les observations, sont des garans non équivoques que cette dernière pratique n'est pas de lui ; on fait qu'on a ajouté au recueil de ses ouvrages ; mais comme il est certain qu'il a fait ses aphorismes & qu'ils ne contiennent qu'un précis exact de ses observations, tout ce qui n'a pas de rapport avec eux n'est pas assurément sorti de sa plume, & on n'y doit pas de confiance.

On m'objectera sans doute, que depuis Hippocrate jusqu'à nos jours, pendant environ deux mille deux cents ans, le lait a été regardé comme un aliment de préférence dans la pulmonie, & comme un excellent remede dans cette maladie. Cela est vrai, on a cru même suivre en cela la pratique sage & éclairée de ce grand homme, mais on s'est fait illusion, on s'est trompé ; au lieu de le conseiller, Hip-

pocrate le défend. On a enseigné pendant deux mille ans , dans les écoles & dans les académies , la philosophie d'Aristote avec toutes ses erreurs. Descartes a osé secouer le joug du préjugé ; il a conduit les savans de son siècle dans la route du vrai ; Newton l'a parcourue avec avantage , & aujourd'hui cette route est éclairée par les écoles & les académies.

L'illusion que l'on se fit peu de tems après Hippocrate , sur son aphorisme concernant l'usage du lait dans la Phthisie pulmonaire , séduisit ses sectateurs , & l'erreur s'est propagée jusqu'à nos jours. Combien n'a-t-elle pas fait des victimes ? En vain de savans maîtres de l'art ont cherché à la faire connoître , on ne les a point écoutés. Je ne fais aujourd'hui que rappeler leurs judicieuses remarques & mes observations , afin que le public se préserve d'être plus long-tems la victime de ce préjugé , qui n'est pas moins funeste pour lui , que malheureux pour ceux des Gens de l'Art qui l'adoptent encore.

A R T I C L E I V.

Abus de l'usage du lait au troisieme degré de Pulmonie.

Les malades qui sont parvenus au troisieme degré de Phthisie , marchent à grand pas vers leur extinction ; des sueurs nocturnes , des cours de ventre colliquatifs , le marasme , l'engorgement œdémateux des extrémités inférieures , des hydropisies , la chute des cheveux , sont des symptômes redoutables de leur déplorable situation. Le lait , quand on a la témérité d'en faire usage sur-tout dans cet état , est le flambeau funebre qui les conduit insidieusement à une entière extinction.

Je rapporte dans cet ouvrage des histoires de guérisons extraordinaires de Phthifles, dont les unes doivent être attribuées à la seule nature, d'autres aux maîtres de l'art qui l'ont heureusement secondée, fans avoir recours à l'usage du lait dont ils connoissoient les inconvéniens, & dont on n'a jamais obtenu de bons effets, lorsqu'on s'est écarté des préceptes d'Hippocrate.

Les malades qui sont dans ce triste état ne doivent jamais désespérer de leur guérison ; la nature a des ressources au-dessus de celles des hommes ; d'ailleurs il est des momens heureux & des circonstances favorables, où des Médecins observateurs peuvent étendre avec succès le bras de la Médecine & guérir des Phthifles pulmonaires au dernier degré : j'en ai rapporté plusieurs exemples dans cet ouvrage & dans mon traité d'observations.

SECTION SECONDE.

Méthode préservative & curative de la Phthifse pulmonaire ; de l'héréditaire & de la contagieuse.

CHAPITRE PREMIER.

Méthode préservative & curative de la Phthifse pulmonaire essentielle des enfans.

LA Phthifse pulmonaire essentielle est celle qui provient d'une mauvaise disposition, ou de vices

particuliers qui n'ont été précédés d'autres maladies qui aient pu les occasionner (a).

Il naît des enfans délicats de peres robustes ; il en est qui sont malades dans le sein de leurs meres pendant qu'elles jouissent d'une bonne santé (b). Il est malheureux qu'avant de voir le jour, ou qu'en naissant pour ainsi dire, ces innocentes créatures soient exposées aux fragilités de la vie, aux maladies & aux langueurs. Une éducation physique bien entendue & constamment suivie dans l'enfance pourroit prévenir ces désavantages ou ces malheurs, & y remédier ; mais souvent une tendresse déplacée, une dangereuse adulation, défaut ordinaire des familles riches & des meres oisives, entretiennent les enfans dans une pernicieuse mollesse. Outre une infinité d'abus auxquels on les expose, il suffit qu'ils paroissent délicats, pour leur ôter même l'usage d'un air libre, dans l'idée de les mettre à l'abri de ses intempéries ; celles-ci sont cependant des moyens adoptés par la nature, pour fortifier leurs membres & pour leur former des tempéramens robustes. La délicatesse des enfans augmente-t-elle par cette privation ? On cherche des secours perfides dans une nourriture succulente ou mal entendue, propre à augmenter leur délicatesse, à se corrompre & à fournir à la masse du sang un chyle mal digéré, source ordinaire & féconde de croûtes laiteuses & d'autres éruptions cutanées de différentes especes.

(a) Voyez la première partie, Section 2. chap. 1.

(b) Voyez mon livre sur la conservation des enfans.

C'est aussi un principe d'engorgemens , d'empâtemens & d'obstructions dans les viscères du bas ventre , qui les conduisent à des langueurs qui le plus souvent affectent les poumons & y forment des tubercules , source ordinaire des Phthysies dont ils guérissent rarement. Un chyle ainsi mal digéré , mal conditionné , ne peut que circuler difficilement dans les labyrinthes infinis que forment les vaisseaux de la substance pulmonaire ; les parties les plus grossières de ce liquide s'arrêtent dans les glandes & aux extrémités des artères capillaires lymphatiques , dont les calibres échappent à la vue , elles s'y corrompent de plus en plus , y forment des engorgemens tuberculeux , y font des érosions , y établissent des ulcères , des suppurations , &c.

Les enfans sont voraces , il est très-ordinaire qu'ils mangent sans règle , sans ordre & à tous momens ; leur estomac rendre & délicat étant surchargé d'alimens , il n'est pas possible que leurs digestions ne soient imparfaites & qu'il n'en résulte un chyle mal conditionné , toujours propre à former des empâtemens , des engorgemens dans les viscères , & principalement des tubercules , des érosions & des ulcères aux poumons.

Ce sont de tels abus qui retardent la croissance des enfans délicats , la rendent lente & la font languir. Si leurs viscères , leurs membres ne se fortifient pas , on en est alarmé , on se détermine à les mettre à l'usage des consommés , du lait , & à leur permettre du vin , des boissons fortes , pour

les fortifier, dit-on, & pour les soutenir. Ces effets d'une tendresse mal entendue, accomplissent enfin de funestes langueurs.

La Phthisie des enfans commence ordinairement par des obstructions dans les viscères du bas ventre, principalement au mésentère; alors l'abdomen se météorise insensiblement, ils deviennent sujets à des diarrhées, suites ordinaires des digestions imparfaites; bientôt leur teint en est moins vermeil, il se flétrit. Il s'ensuit de petites toux seches qui paroissent d'abord gutturales; elles deviennent humides, ensuite grasses & purulentes. Ces toux des enfans sont d'autant plus dangereuses qu'ils ne savent pas cracher; ils avalent le pus, ou bien il reste dans les bronches & dans les vésicules bronchiques, il y croupit, y forme de plus grands délabrements, des suppurations plus abondantes qui accomplissent bientôt le marasme de ces tristes victimes d'une éducation mal entendue, qui ne tardent pas à subir le sort fatal, si l'on n'a pas l'attention de le prévenir. Les enfans seront bien moins exposés à ces accidens, si on les élève dans leur premier âge comme le peuple des campagnes élève les siens, en ne les emmaillotant point, en ne les laissant que légèrement couverts dans toutes sortes de tems, en les exposant avec ménagement aux épreuves du chaud & du froid & sur-tout en ne leur faisant jamais porter de corps de jonc ni de baleine. Ces corps s'opposent à la croissance de leurs membres, ils gênent le développement des viscères de la poi-

trine , du bas ventre & souvent ils font tourner leur taille, les rendent bossus & difformes (a).

C'est par une telle éducation & par un régime de vie simple que les enfans des campagnes forment des tempéramens robustes ; ils ne font point sujets aux langueurs qui font périr au moins le tiers de ceux des villes & des maisons riches , dont on abrége les jours pour vouloir trop les conserver. Si parmi les enfans du peuple qui habite les campagnes il en est qui meurent pulmoniques , c'est pour avoir trop mangé, sans règle & sans ordre ; il est toujours dangereux ou funeste de leur permettre de satisfaire leur voracité. Cependant ils n'y succombent pas aussi généralement que ceux des villes & ceux des gens riches , parce qu'ils font beaucoup plus d'exercice , & qu'on ne les nourrit pas d'alimens recherchés.

L'usage du lait confondu avec celui d'autres alimens , pris à tous instans , sans choix & sans ordre , ne sauroit être que nuisible aux enfans voraces dont les digestions ne se font jamais qu'imparfaitement. Si quelque tems après qu'ils ont mangé du lait , on fait attention à leur haleine , on lui trouvera une odeur aigre , & les rots qu'ils rendront seront acides. C'est une preuve sensible que le lait s'est corrompu dans leur estomac ; le chyle qui provient de telles digestions ne pourroit que nuire à la sanguification , à la nutrition , &c. Des digestions aussi imparfaites ou aussi vicieuses font une source féconde de croûtes laiteuses , d'obstructions dans les viscères

(a) Voyez mon Ouvrage sur la conservation des Enfans.

du bas ventre , de tubercules aux poumons , de langueurs , de Phthifies , &c. *Barchusen* a observé que les Egyptiens redoutent l'usage du lait , parce qu'il leur donne la lepre ou la gale. Ces accidens n'ont lieu sans doute chez ces peuples que lorsqu'ils abusent de cet aliment , ou qu'ils en usent mal à propos , à moins que ce ne soit par un effet de la température de leur climat , car dans toutes les parties du monde connu le lait est de sa nature un aliment salutaire , quand on en prend à propos & qu'on n'abuse pas de son usage.

Lorsqu'il s'est formé des engorgemens , des obstructions dans les viscères du bas ventre , ou des tubercules aux poumons des enfans , ils perdent de leur vivacité ordinaire , leur appétit diminue , leurs garderobes se ramolissent , les urines deviennent troubles , la couleur du visage varie , sur-tout dans les tems de la digestion. Si avec ces symptômes il survient de petites toux seches , elles annoncent des érosions ou des tubercules dans la substance des poumons.

Il n'est pas aisé de distinguer d'abord ces érosions d'avec les tubercules ; cependant en faisant attention aux symptômes des premieres voies qui les ont précédés , on pourra asseoir un jugement sur leur nature. Les engorgemens des viscères du bas ventre sont annoncés ordinairement par les symptômes que je viens d'observer ; par des aigreurs dans l'estomac & par de légères inappétences ; les tubercules par des toux seches , qui quelque tems après deviennent

humides : il s'ensuit enfin de vrais crachats purulens & la fièvre étiq̃ue qui conduit au marasme.

Lorsque les tubercules ne sont pas de nature à suppurer, la toux des enfans est toujours sèche, elle augmente de plus en plus, sans jamais devenir humide. Ils ont des inquiétudes, ils maigrissent, ils se dessèchent & ils dépérissent sans que leur appétit diminue ; lorsqu'il fléchit, ils approchent de leur dernier moment, qui est toujours précédé d'un marasme absolu.

La Phthisie des enfans qui commence par des ulcères est ordinairement occasionnée par des molécules de substances mal digérées dans les premières voies, qui, étant déposées dans les glandes ou dans les extrémités des artères capillaires lymphatiques des p̃oumons, s'y arrêtent, y acquièrent de l'âcreté par leur séjour, y causent des érosions, des phlogoses, des suppurations, &c.

Cette espèce de pulmonie peut provenir de différentes causes aussi insidieuses les unes que les autres ; tantôt ce sont des humeurs âcres qui se sont formées dans les premières voies qui les occasionnent ; tantôt des humeurs catharreses, qui étant déposées dans la substance des p̃oumons, ne peuvent qu'y faire des plaies dangereuses ou mortelles. Des croûtes laiteuses, des humeurs dartreuses, éresypellateuses, scorbutiques, scrophuleuses, psoriques, &c. fixées ou repercutées dans ce viscère, y causent également des Phthisies du plus dangereux caractère.

Lorsque chez les enfans la cause des ulcères des

poumons vient des premières voies, ils sont précédés de dérangemens dans l'ordre des digestions, de nauzées, de rots, d'une haleine putride; si ce sont des humeurs catharreuses qui les causent, ils ne s'établissent ordinairement qu'à la suite de rhumes longs, rebelles ou négligés; lorsqu'ils dépendent d'humeurs scorbutiques ou scrophuleuses, on a dû s'appercevoir d'avance de quelque signe ou de quelque symptôme qui ait caractérisé ces vices. Lorsque ces ulcères, ces suppurations se manifestent à la suite d'une métastase, d'humeurs dartreuses, éresypellateuses, psoriques ou croûteuses, ces humeurs ont marqué leur caractère à la peau avant d'être répercutées.

Dès qu'on s'apperçoit de quelque signe qui indique des engorgemens dans les viscères du bas ventre, ou des tubercules aux poumons, il faut mettre les enfans à une nourriture végétale. On les fait vomir ou avec le tartre stibié, ou avec l'ipécacuanha dont on ménage les doses selon l'âge & le tempérament; on les purge le lendemain, en observant les mêmes précautions. S'ils sont pléthoriques & sujets à des hémorragies, on leur fait quelque saignée, ménagée selon leur âge & les indications qui se présentent. On les nourrit légèrement de soupes, de bouillons faits avec des herbes & des racines potagères, telles que celles de carotte, de scorsonaire, de farsifi, de poirée, ou d'autres de la même classe. On peut leur permettre des œufs frais à la coque, des fruits fondans; leur boisson ordinaire sera d'une décoction

de chiendent & de réglisse, ou bien de toute autre plante choisie dans la classe des apéritives.

On leur fait prendre tous les matins à leur réveil une, deux ou trois onces, selon leur âge, de suc épuré, de parties égales, de chicorée sauvage & de chiendent qu'on édulcore avec du miel de Narbonne, avec du sucre ou avec du syrop des cinq racines apéritives. On réitere ces sucs le soir après la digestion d'un souper léger. Si les enfans ont l'haleine aigre, ou s'ils rendent des rots acides, on leur fait prendre deux fois par jour le matin & le soir, sans préjudice des autres remedes, de huit jusqu'à vingt grains de magnésie blanche; elle fait pendant que ces symptômes subsistent l'effet d'absorbant & de purgatif.

Comme la digestion des enfans qui sont dans cet état, ne se fait jamais parfaitement, on tiendra constamment leur ventre libre, par le moyen du syrop de Calabre que l'on rend plus ou moins purgatif selon les indications qui se présentent. Lorsque ce syrop ne suffit pas pour purger légèrement, on peut le faire prendre dans une tasse ou deux d'infusion de fleurs de pêcher, ou de roses pâles, ou bien on y ajoute quelques grains de jalap, selon l'âge & le tempérament. Le syrop de Calabre simple pris à la dose d'une ou deux onces tous les matins dans une tasse de décoction de racines de polipode de chêne, est un bon remede pour rétablir les fonctions de l'estomac, & principalement pour guérir des obstructions & des tubercules qui n'ont pas encore acquis un degré considérable de dureté.

Si après quelque tems d'usage de ces remèdes , on ne s'appërçoit pas que les symptômes de la maladie se modèrent , on dissoudra dans ce syrop quelques grains de gomme ammoniac : comme cette gomme est nauseabonde on modérera cette qualité en y ajoutant une légère infusion de canëlle.

On ne guérit que très-difficilement les tubercules qui ne sont pas de nature à suppurer ; cependant on peut y réussir par un long usage de boissons délayantes , favoneuses & apéritives , composées de plantes qui aient ces qualités , telles que toutes les especes de chicorées , la buglose , la bourrache , &c.

On fait respirer avec succès la vapeur d'une décoction de plantes émollientes , ou d'une infusion de fleurs pectorales. Comme cette espece de tubercules est produite par des humeurs excrémenteuses provenant des premieres & des secondes digestions , il ne faut pas perdre de vue les moyens de rapprocher par les secours de l'art , de l'ordre de la nature , ces fonctions essentielles , qui ne sauroient jamais se faire trop parfaitement.

La Phthisie des enfans qui dépend d'ulceres aux poumons , commence ; je l'ai déjà observé , par des érosions causées par des humeurs âcres provenant de digestions dérangées ou dépravées. Les indications les plus pressantes dans cette maladie exigent des secours propres à rétablir les fonctions de l'estomac. Si l'ulcere n'est pas encore formé , on fera vomir le petit malade en lui faisant prendre autant de grains d'ipécacuanhã en poudre , qu'il aura d'années ; si

cette dose ne suffit pas , on l'augmentera selon les indications ; on le purgera le lendemain , ou deux jours après , avec quelque syrop purgatif , avec la manne , &c. Si l'ulcere est déjà formé , on s'abstiendra de le faire vomir , on lui fera prendre pendant trois ou quatre jours de légers minoratifs pour le disposer à la purgation , supposé qu'ils ne procurent pas des évacuations suffisantes. Il convient de faire usage en même tems , d'une légère décoction de racines d'oseille , dans laquelle on fait infuser des zets ou pellicules de bigarrades ; on l'édulcore avec du sucre ou du miel , afin que les enfans en prennent avec moins de répugnance.

On doit toujours craindre la pulmonie lorsque les enfans ont des rhumes catharreux , longs & rebelles. Les engorgemens des sinus & des glandes de la tête & de la gorge , assez ordinaires dans les rhumes de cette espece , font des progrès dans la trachée-artère & jusques dans la substance des poumons ; ils y forment des érosions , des ulceres , des suppurations , qui établissent une Phthisie , sans que souvent on puisse distinguer d'autres symptômes qui l'indiquent. On n'a pas moins à craindre des rhumes qui commencent par la poitrine , lorsqu'ils sont de trop de durée.

On prévient ce dangereux effet des rhumes catharreux , par un usage fréquent d'infusions théiformes , de feuilles & de fleurs diaphorétiques & pectorales adoucies avec le miel de Narbonne , ou avec le sucre rosat. Il est d'usage de faire prendre de tems

en tems, pendant quelques matins, un grain d'ipécacuanha en poudre; si les fonctions de l'estomac ne se font pas parfaitement, on fait vomir en augmentant la dose de ce remède. On doit avoir l'attention d'entretenir la liberté du ventre & de faire prendre un léger purgatif, tous les huit ou dix jours. Si les crachats sont gluans, visqueux, & si l'expectoration en est difficile, on fera usage d'un looch composé de parties égales de syrops d'althéa & de coqueliquoc, qu'on étendra dans une infusion de fleurs pectorales & de feuilles d'hysope; on y ajoutera une petite dose d'oximel simple. Si les enfans ont des insomnies, ou des toux violentes pendant la nuit, on leur fait prendre le soir aux heures du sommeil une cuillerée à café de syrop de pavot blanc; on règle les doses de ce syrop selon leur âge & leur tempérament.

Je fus appelé dans le mois d'Octobre de l'année 1765, pour une jolie enfant âgée de six ans, qui étoit l'objet de l'adulation de sa famille, & qui jusqu'alors, n'avoit été conduite qu'à sa volonté. Je la trouvai prise d'un rhume considérable, qui la tenoit depuis près de deux mois; elle avoit déjà craché du sang plusieurs fois, & ses crachats étoient encore sanguinolens & chargés d'un pus grisâtre. La poitrine étoit serrée, & la respiration gênée, fréquente & laborieuse. Malgré l'état de langueur où étoit la malade, je fis tirer environ quatre onces de sang de l'un des bras; quelques heures après la saignée, l'expectoration étoit plus aisée, & les crachats devinrent plus abondans; cette abondance
des

des crachats augmenta au point que la petite malade en rendoit environ quatre onces par jour ; il s'ensuivit un abattement de forces si considérable , qu'on s'attendoit tous les jours à son dernier moment : c'étoit avec d'autant plus de vraisemblance , qu'elle tomboit en des foiblesses fréquentes , qui approchoient du degré de la syncope. Cet état affligeant dura près de trois mois , à compter du commencement de la maladie , jusqu'aux premiers signes de la convalescence.

Cette enfant , qui toujours avoit été volontaire , refusoit tout secours , à peine pouvoit-on l'obliger à prendre des alimens pour se sustenter. D'abord après la saignée , j'apperçus dans les garde-robes , quelque marque qui me donna lieu de craindre un cours de ventre colliquatif ; quoique ce signe fût équivoque , je crus qu'on devoit y faire attention ; je me déterminai à faire prendre toutes les deux heures une cuillerée à café de gelée de corne de cerf , avec le sucre rosat , au lieu de sucre commun , & toutes les quatre heures immédiatement après la gelée , quatre cuillerées à bouche d'une décoction d'amandes de cacao du gros caraque , faite en guise de café , dans laquelle on faisoit infuser quelques feuilles de creffon de fontaine , & un peu de canelle , on l'édulcoroit avec le syrop de consoude & avec quelques gouttes de syrop balsamique de rolu. Cette décoction , la gelée de corne de cerf , & une tisane d'orge torrifiée , tinrent lieu , pour ainsi dire , pendant près de trois semaines , d'alimens &

de remèdes. Vers le quinzième jour de cet usage, la toux étoit déjà moins fréquente, les crachats commençoient de blanchir, les garde-robes prenoient de la consistance, & les forces paroissoient moins abattues. D'après de signes aussi favorables, on osa concevoir quelque foible espérance de guérison. On continua les mêmes usages, & on fit prendre deux fois par jour, le matin & le soir, des bouillons de grenouilles, on ajoutoit pour chaque bouillon, une ou deux écrevisses, & on y jettoit pour infuser, une pincée de sommités fleuries de millepertuis, & autant de sommités de grande consoude. Lorsque tous les symptômes furent modérés au point déterminé dans l'aphorisme d'Hippocrate, pour pouvoir faire usage du lait, on mit la petite malade à celui d'anesse, qu'elle prit tous les matins coupé avec une cueillerée à bouche d'eau de chaux seconde, jusqu'à ce que tous les symptômes de pulmonie furent dissipés. Elle continua de prendre le lait sans mélange jusqu'à ce que sa convalescence fut parfaite : on la nourrit pendant tout ce tems de substances farineuses : elle est aujourd'hui dans sa dix-septième année, & elle jouit de la santé la plus parfaite.

Je fus appelé vers la fin du printems de l'année 1775, pour un écolier âgé de huit ans, pensionnaire dans un collège de Paris. Je le trouvai avec une fièvre lente très-caractérisée, provenant d'un rhume catharreux, qui dotoit déjà de plus de deux mois, & que jusqu'alors, on avoit regardé

comme un rhume très-simple. Cet enfant avoit un dégoût général pour toutes sortes d'alimens ; il crachoit du pus , & les crachats étoient sanguinolens. La peau étoit sèche , la toux fréquente & laborieuse , principalement pendant les nuits qu'il passoit sans sommeil ; la respiration étoit gênée & l'expectoration difficile. Le pere de cet enfant étoit venu d'Alençon sa patrie , sur l'avis qu'on lui avoit donné de ses légères incommodités ; il fut justement alarmé de son état ; il le fit transporter à son auberge ; il m'appela à son secours.

Le même jour je lui fis tirer quatre onces de sang de l'un des bras ; le soir il prit trois gros de syrop de diacode étendu dans deux onces d'eau de pariétaire ; la toux fut moins vive & moins fréquente pendant la nuit , mais l'enfant n'eut point de sommeil. Le lendemain , les symptômes de la maladie étoient les mêmes que la veille ; je fis réitérer la saignée à la même dose. Je mis le malade à l'usage d'une tisane légère faite avec des jujubes , dans laquelle on faisoit infuser des fleurs de russilage ; on l'émulsionnoit avec le looch de la composition du *Codex* de Paris. Le soir je fis prendre un tiers de grain d'extrait d'opium , & par-dessus environ quatre onces d'infusion de fleurs de nénufar , édulcorée avec le syrop du chantre. La nuit fut moins mauvaise , le malade eut un peu de sommeil , la toux fut moindre , & l'expectoration moins difficile. Comme le ventre n'étoit pas libre , on donna dans la journée deux lavemens simples , qui eurent tout l'effet

qu'on pouvoit en désirer. On continua les mêmes usages pendant les quatre jours suivans ; ils modérèrent les symptômes de la maladie , au point de pouvoir porter les vues curatives sur les organes de la digestion , dont le désordre étoit marqué par des inappétences. A cet effet je fis prendre , toutes les quatre heures , deux onces d'une infusion de deux pincées de roses pâles & d'un gros de rhubarbe concassée , dans laquelle on dissolvoit une once de miel de Narbonne : cet usage procura dans les vingt-quatre heures trois garderobes copieuses & très-bilieuses. Le lendemain on suspendit cette purgation , & pendant les quatre jours suivans , le malade en prit quatre onces , le matin seulement , qui procuroient deux évacuations abondantes , dont les matieres étoient de la même qualité que les précédentes : on continua pendant ces usages la tisane & le calmant ordinaires ; la toux étoit déjà très-modérée & l'expectoration moins difficile , mais les crachats étoient toujours les mêmes : on ajouta à la tisane de jujubes , de la bourache & du creffon de fontaine , qu'on y faisoit seulement infuser ; on l'édulcoroit avec du miel de Narbonne. Outre ces remedes le petit malade prenoit toutes les trois heures deux cuillerées à bouche d'un syrop en forme de look , composé de parties égales de suc de millepertuis & de lierre terrestre , avec le sucre rosat ; on y ajoutoit de la gomme arabique , & on étendoit dans chaque prise , une goutte de baume blanc du Canada.

Après deux mois de ces usages , tous les symptômes de la maladie étoient presque dissipés ; l'appétit revenoit , les digestions se faisoient sans peine & les forces se rétablissoient à vue. On purgea le petit malade avec deux onces de manne dans quatre onces d'infusion de fleurs de pêcher ; dans peu de jours il fut sans fièvre & pour ainsi dire sans toux ; on le transporta à Alençon , chez ses Parens , où l'usage du lait d'ânesse , qu'il prit pendant deux mois , le rétablit parfaitement , & au point que depuis cette maladie , il n'a pas eu même d'incommodité ; il jouit encore aujourd'hui de la santé la plus parfaite.

La diminution & la suppression des éruptions cutanées des enfans sont très-souvent suivies de toux très-importunes , qui sont ordinairement les préludes d'engorgemens tuberculeux , ou d'érosions dans la substance des poumons , qui menent très-promptement à la Phthisie. Il est essentiel , dans des circonstances aussi délicates , d'avoir recours aux moyens les plus propres à faire une diversion de ces humeurs , & sur-tout à les rappeler à la superficie. On pratique à cet effet des suppurations aux endroits mêmes où s'étoient faites les éruptions , ou si elles n'y étoient pas praticables , on les établit dans quelque une des parties les plus voisines. On y applique des cauterés , des vésicatoires , &c. dont on entretient la suppuration ; on fait usage en même tems d'infusions de plantes diaphorétiques & pectorales , tant pour modérer la toux & les irritations

que font ces humeurs étrangères sur la substance délicate des poumons , que pour les éloigner du centre , & les rappeler à la superficie par une transpiration abondante ; il n'est pas moins nécessaire d'entretenir la liberté des garderobes & même de les provoquer si elles sont tardives , ou si l'on s'aperçoit de quelque dérangement dans l'ordre des digestions. On se sert à cet effet de minoratifs les plus doux. C'est ainsi que par des diversions faites à propos , on détourne de la poitrine des humeurs qui par leur séjour , y formeroient des plaies dangereuses ou funestes. Ces moyens seroient peut-être impuissans , si on ne les mettoit en usage , que lorsque les ulceres seroient établis ; il faudroit cependant y avoir également recours , comme étant propres à y remédier.

On doit aussi dans ces circonstances avoir égard à la nature des éruptions ; elles conservent toujours leur premier caractère dans les impressions qu'elles font sur la substance des poumons. Les croûtes laiteuses proviennent, je l'ai déjà observé, d'un lait dont on abuse , qui pèche par sa qualité , ou bien de toute autre nourriture trop abondante , ou de mauvaise nature.

On tempere l'âcreté des humeurs par des boissons émollientes , composées de fleurs de coquelicoc , ou d'autres fleurs pectorales ; par des tisanes de jujubes , de sebestes , &c. Si les éruptions sont dartreuses , érysipellateuses , psoriques , ou scrophuleuses , on fait usage de décoctions propres à re-

médier à la qualité de ces vices ; les diaphorétiques , les émolliens , les plantes appropriées aux éruptions dartreuses , érétypellateuses , sont les racines de patience sauvage , de bardane , de buglose , de pissenlit , & principalement celles de garance , &c. On se sert très - à - propos , lorsque les éruptions repercutées sont scorbutiques , des infusions & des suc de chicorée sauvage , de pissenlit , de pourpier rouge , de fumeterre de tefle d'eau , de cresson de fontaine , de bécabunga , de cochléaria , d'oseille , d'alléluya , &c. On les édulcore avec du miel , ou avec quelque syrop béchique. Si les éruptions ont un caractère scrophuleux , ce qui est très-ordinaire dans les Phthies tuberculeuses , on prend des infusions de fleurs de souci , de feuilles de véronique femelle , de romarin , de chardon bénit ; des décoctions de racines de bardane , de garance , de petit houx , de gayac ; ces décoctions sont bien plus efficaces , si l'on y ajoute un noïet d'antimoine cru en poudre.

L'éducation physique des enfans qui ont la poitrine étroite , le cou allongé , qui deviennent bossus ou rachitiques , exige des attentions particulieres & les plus scrupuleuses pour les garantir de la pulmonie. Leur régime de vie doit être réglé , & on doit les entretenir dans une sobriété constante. Il faut les priver généralement de toutes sortes d'alimens qui pourroient augmenter la densité de la lymphe dont le suc nourricier prend & retient le caractère. On les nourrira d'alimens doux , émolliens & légèrement apéritifs , principalement de végétaux & de viandes.

les plus légères. On écartera de leur régime de vie les salures, les épicerics; on leur interdira totalement les boissons fortes & les liqueurs spiritueuses, & même l'usage de la biere, du cidre & du vin, jusques après leur adolescence.

Les enfans qui ont le malheur d'être affligés de pareilles infirmités, doivent faire des exercices modérés, mais jamais violens, parce qu'il leur est essentiel d'éviter les hémorragies qui décideroient des crachemens de sang, qui les conduiroient à des Phthifies d'autant plus dangereuses, qu'il ne seroit pas possible de remédier au vice local qui les occasionneroit. On a d'abord recours à la saignée dans de pareilles circonstances, à des boissons calmantes & délayantes: il seroit très-prudent de prévenir des hémoptysies par ces secours, principalement lorsque les enfans sont d'un tempérament sanguin & pléthorique.

Il est pernicieux de se servir de corps de baleine pour des enfans qui deviennent bossus, contournés, ou dont l'une des épaules s'élève plus que l'autre, dans la vue de contenir leur taille & de remédier à ces vices de conformation: ces corps ne servent qu'à faire dejetter l'épine du dos du côté opposé à la compression qu'ils font, & à augmenter ces infirmités, au lieu d'y remédier. J'ai vu plusieurs enfans mourir de pulmonie à la suite de tels abus.

On court encore de plus grands dangers par l'usage abominable de corps garnis de fer, pour comprimer avec plus de force les parties de la poitrine ou des

épaules qui se dérangent. Je fus appelé il y a environ douze ans, pour voir l'enfant unique d'un Marbrier qui avoit la poitrine relevée en bosse, serrée des côtés & une épaule plus grosse & plus haute que l'autre. Je le trouvai avec une fièvre considérable, un point de côté qui lui coupoit la respiration, & un crachement de sang alarmant : j'aperçus un corps de fer auprès de son lit ; je demandai si l'on en avoit fait usage pour le malade, on m'avoua qu'il le portoit depuis quinze jours, & que depuis ce tems-là il crachoit de tems en tems un peu de sang. Je vis alors sensiblement la cause de la maladie, j'en prévins les suites par le moyen de deux saignées, de tisanes émulsionnées, &c. On abandonna le pernicieux instrument qui avoit causé le danger où étoit l'enfant ; il jouit encore aujourd'hui d'une santé parfaite, à l'exception de quelque incommodité inséparable de l'état de la poitrine.

J'ai observé dans mon ouvrage sur la conservation des enfans, que toutes les especes de corps, de jonc, de baleine & de fer sont pernicieuses, qu'elles ne font qu'augmenter les difformités pour lesquelles on les emploie, au lieu d'y remédier ; que ces difformités sont le plus souvent des effets du maillot & de la contrainte où on les tient dans leur premier âge, que de toute autre cause ; on ne voit point de bossus dans des pays immenses où l'on ne connoît ni la torture du maillot, ni les corps de jonc ou de baleine, moins encore ceux de fer. Il n'est pas aisé de guérir la pulmonie des enfans, qui provient de

vices de conformation , mais on peut la prévenir & en garantir par un régime de vie émollient & très-sobre , par des saignées faites à propos , & en les éloignant de toutes sortes d'excès.

Lorsque les enfans phtysiques sont parvenus au second degré de pulmonie , que la suppuration & le marasme sont établis , on observe tous les moyens dont on se sert pour les adultes qui sont au second degré de cette maladie ; on les dirige selon leur âge , leur tempérament & leur délicatesse. On trouvera ces moyens dans le chapitre suivant.

C H A P I T R E I I.

Suite du Chapitre précédent.

Méthode préservative & curative de la Phthisie essentielle des Adultes.

A R T I C L E P R E M I E R.

Méthode préservative & curative de la Phthisie des Adultes , quand elle est au premier degré.

LES indispositions du premier âge , sur-tout celles qui proviennent d'une éducation physique mal entendue , influent sur tous les autres , même jusqu'à la vieillesse ; on en conserve une délicatesse de tempérament , qui rend susceptible des moindres impressions , de celles même que causent les intempéries de l'air. Il n'est pas surprenant que les Phthisies des adultes ne proviennent souvent de cette cause : les hommes d'un tempérament robuste peuvent aussi contracter cette maladie par accident.

Lorsqu'il se forme des engorgemens dans les poulmons , par quelque cause que ce soit , principalement par une suite d'abus dans le régime de vie , ils sont indiqués par des toux seches médiocres , qui font des progrès & deviennent enfin vives & fréquentes (a). Si ces malades sont pléthoriques , on doit avoir recours à la saignée de l'un des bras ; si au contraire ils sont d'un tempérament pituiteux , on commence par un vomitif. On emploie le même remede après la saignée chez les tempéramens pléthoriques ; s'il se présente des indications qui fassent soupçonner quelque vice dans les premières voies , on les prépare à la purgation par des aposèmes laxatifs , & on les purge ensuite plus efficacement.

On met ceux de ces malades qui sont d'un tempérament pituiteux à l'usage d'une tisane amere , composée principalement de plantes savonneuses , telles que les chicoracées , la bourrache , la buglose , la chicorée sauvage , la blanche , ou d'autres choisies dans la même classe , selon les indications ; on réitere de tems en tems les aposèmes laxatifs , en consultant toujours la marche de la nature , & en se conformant aux indications qu'elle présente. Outre ces secours , on emploie très-utilement de légères infusions de plantes diaphorétiques , telles que la mélisse , le chardon bénit , l'angélique , ou d'autres choisies dans la même classe : on les édulcore avec du sucre rosat , ou avec du miel.

On réitere les saignées chez les tempéramens

(a) Voyez première Partie, Section 2. Chap. 1.

pléthoriques, pour prévenir des embarras sanguins dans la substance des poumons, qui feroient faire des progrès rapides aux engorgemens lymphatiques, ou qui causeroient des hémorragies toujours dangereuses dans tous les degrés & dans tous les tems de la pulmonie. Lorsque la peau est sèche, & la chaleur mordicante, on fait prendre des bains domestiques, du petit lait & des tisanes calmantes, tempérantes & légèrement apéritives.

Si la toux a été précédée par un usage abusif de boissons fortes, de liqueurs spiritueuses, ou bien par de vives passions, on seconde l'effet de ces remèdes par des saignées ménagées, supposé que le tempérament du malade, ses forces, l'état du pouls & la consistance du sang puissent en permettre l'usage. On fait prendre en même tems des poudres tempérantes, composées avec le nitre, le camphre & le sucre, du petit lait, ou des tisanes calmantes, émollientes & pectorales, seules ou émulsionnées avec les semences de courge, de melon, de concombre, de pavot blanc, les amandes douces. On les édulcore avec les syrops d'althéa ou de ruffilage; on y ajoute ceux de *diacode* ou de karabé, dans le cas de toux violentes, trop fréquentes, ou d'insomnies; on les dose avec les attentions qu'exigent les syrops narcotiques.

Si les malades sont d'un tempérament délicat, valétudinaire, ou épuisés par des abus, nonobstant les tisanes avec les plantes savonneuses, on leur fait prendre deux bouillons par jour, le matin à jeun &

le soir après la digestion d'un souper léger, composés de racines de pissenlit, de buglose, de polipode de chêne, ou d'autres choisies dans la même classe, avec huit grenouilles écorchées, vidées, auxquelles on retranche les têtes & les pattes; ou avec quatre onces de chair de tortues; ou bien avec une quinzaine ou vingt limaçons & trois ou quatre écrevisses rougies & écrasées pour chaque bouillon. On y ajoute sur la fin quelques feuilles de plantes savonneuses & quelques tiges de cresson de fontaine, ou de bécabunga. Si les urines ne sont pas assez abondantes, on passe ces bouillons par une étamine couverte d'une couche de cerfeuil. Si malgré ce secours les urines restoient rares, on étendrait sur le filtre trente ou quarante cloportes écrasés en vie, & on feroit fondre dans chaque pinte de tisane quinze ou dix-huit grains de sel de chardon bénit. Dans le cas où l'on s'appercevrait de quelque symptôme qui indiquât des tubercules aux poulmons, ou des engorgemens lymphatiques ou bilieux dans les viscères du bas ventre, on feroit fondre dans chaque bouillon douze ou quinze grains de tartre chalybé, & on feroit prendre tous les matins à jeun immédiatement avant ces bouillons, un demi gros, deux scrupules ou un gros, selon le tempérament des malades, d'une opiate composée d'une once de conserve d'aunée, de trois gros de savon blanc, de deux gros de gomme ammoniac, d'un scrupule d'aloës foccotrin & de trois grains d'extrait d'opium, avec suffisante quantité de syrop d'érysimum. Si

l'on fait prendre cette opiate sans les bouillons , on fera boire par-dessus , deux tasses d'infusion de fleurs de genest en guise de thé qu'on édulcorera avec du sucre rosat.

Les Médecins les plus exercés dans les connoissances de la Phthisie pulmonaire , ont recommandé l'usage des eaux minérales ferrugineuses , au premier degré de cette maladie. Je leur ai vu faire de bons effets , principalement dans la Phthisie tuberculeuse , dans le tems ou les tubercules conservent encore leur mollesse ; elles seroient moins utiles s'ils étoient parvenus à leur dureté. Elles sont essentielles dans la méthode curative des tubercules qui sont propres à suppurer , elles le sont aussi dans celle de ceux qui ne suppurent jamais ; j'en traiterai avec plus d'étendue dans un chapitre particulier concernant la Phthisie tuberculeuse.

La propriété la plus remarquable des eaux ferrugineuses , est d'être toniques & stomachiques. Il paroît démontré par des expériences ingénieuses que le fer qui les minéralise , n'exerce son action que sur les membranes des premieres voies. Wanhelmont a observé , en traitant des eaux minérales de Spa qui abondent en principe martial , que la nature sépare dans les voies de la premiere digestion , la substance ferrugineuse dont elles sont imbuës , comme incapable de servir de nourriture , & qu'elle s'évacue par la voie du canal intestinal. Cette opération de la nature est sensiblement démontrée , selon cet Auteur , par la couleur noire des garde-robes qui

a toujours lieu pendant qu'on fait usage de ces eaux, couleur qu'on ne peut attribuer qu'à la substance martiale qu'elles contiennent.

Ce sentiment de Wanhelmont paroît confirmé par une expérience du docteur *With*. Cet observateur fit jeûner un chien pendant trente-six heures ; il lui présenta ensuite une livre d'un mélange de pain & de lait , dans lequel il avoit introduit une once & demie de sel de Mars , fondu dans l'eau. Le chien dévora ce mélange ; une heure après *With* mit ses entrailles à découvert, il ramassa dans le canal thorachique, près d'une demi-once de chyle dont la couleur n'éprouva aucune altération par la teinture de noix de galle ; il conclut de cette expérience qu'il n'étoit rien passé dans les voies du chyle de la substance martiale que le chien avoit avalée. Cet Auteur exact dans ses recherches, donna plus d'étendue à son expérience ; il fit fondre un quart de grain de sel de Mars dans une partie du chyle qui n'avoit pas éprouvé d'altération, & il y versa de la teinture de noix de galle ; dans l'instant de ce mélange , le chyle prit une couleur pourpre foncé. D'après cette expérience, ne paroît-il pas démontré que le fer ne pénètre pas dans les voies du chyle , même lorsqu'il est en dissolution ? J'ai déjà rapporté ces observations dans un autre ouvrage.

Le principe martial des eaux minérales n'agit donc sur les engorgemens des poumons que par son action sur les membranes des premières voies ; cette action consiste en des agacemens qu'il fait sur ces

membranes & qui se communiquent à tout le système membraneux, principalement dans la substance pulmonaire qui a une correspondance de continuité avec les plexus nerveux du ventricule, des entrailles & des viscères des régions épigastriques & hypochondriaques.

Lés eaux minérales trop chargées de substance martiale, comme le sont celles de Spa qui contiennent de six à sept grains de fer par deux livres d'eau, sont ordinairement nauséabondes ; elles provoquent des vomissemens chez les personnes délicates, troublent l'ordre des digestions, causent des constipations, retardent le cours des urines & diminuent l'insensible transpiration. Comme de tels effets seroient pernicioeux dans la pulmonie, on doit avoir attention que celles dont on fera usage dans cette maladie, ne contiennent qu'un grain ou un grain & demi de substance martiale par livre d'eau.

Les eaux martiales sont toujours imbues d'autres principes qui concourent à les minéraliser ; ces principes pénètrent par les voies du chyle, dans le torrent de la circulation des liquides & font sur les engorgemens des poumons & des viscères du bas ventre, l'effet d'appétitifs, de détersifs, &c. selon leur nature, ce qui donne plus d'étendue aux bons effets que produisent les eaux minérales ferrugineuses, au premier degré de la Phthisie pulmonaire.

Les eaux minérales légèrement purgatives doivent être regardées comme les plus efficaces, sur-tout au premier degré de la Phthisie pulmonaire ; celles qui
sont

sont en même tems ferrugineuses & purgatives , méritent la préférence sur celles qui n'ont que l'une ou l'autre de ces qualités. Les eaux minérales de Châtel - Guion ont cette double propriété ; d'ailleurs elles sont toniques , calmantes , détersives , & très-propres à remplir les différentes indications qui se présentent au premier degré de cette maladie , principalement quand elle provient d'engorgemens tuberculeux. Les principes qui minéralisent les eaux de Châtel-Guion , sont un fluide éthéré très - abondant , une terre calcaire & une terre absorbante , du sel marin tant à base alcaline qu'à base terreuse ; de la matière sciliceuse , de l'alkali minéral & un grain de substance martiale par livre d'eau.

Le principe éthéré des eaux de Châtel-Guion , doit être considéré comme un calmant du genre nerveux , propre à favoriser ses oscillations , à les rectifier , à soutenir son élasticité , & à modérer l'irritation dont il est susceptible. Il soutient les principes fixes qui minéralisent ces eaux , dans un état de division qui donne plus d'étendue à leurs propriétés. Ces principes ainsi combinés , divisés & soutenus dans l'eau , forment des sels neutres savonneux , saturés , neutralisés & perfectionnés par la nature.

C'est dans cet état de perfection que les alkalis minéraux des eaux de Châtel-Guion , sont , comme je viens de l'observer , apéritifs , détersifs , calmans , laxatifs , purgatifs , &c. Les terres calcaires , absorbantes & sciliceuses , en absorbant les aigres des premières voies , en forment de nouveaux sels

neutres , ou , pour mieux dire , un savon propre à diviser , à désobstruer , à relâcher le ton du système des solides trop relevé , à rectifier ses irrégularités & à purifier la masse des liquides. La petite quantité de matiere ferrugineuse qui est mêlée & confondue avec les autres principes , est propre à relever l'activité des fibres organiques , quand elle chancelle , & à la soutenir sans causer d'irritation (a).

Ces qualités des eaux minérales de Châtel-Guion , les rendent propres à remplir toutes les indications qui se présentent au premier degré de la Phthisie pulmonaire tuberculeuse ; il n'est pas même de purgatif plus propre que ces eaux , dans tous les tems & dans tous les degrés de cette maladie. On en fait usage comme altérantes , comme laxatives & purgatives ; lorsqu'on les prend comme altérantes , deux ou trois verres suffisent tout les matins ; on en fait la dose plus forte quand on veut les prendre comme laxatives ; les tempéramens les plus délicats peuvent , sans inconvénient , la porter jusqu'à deux livres. Elles purgent depuis deux livres jusqu'à quatre ; j'en ai fait prendre jusqu'à une livre à des enfans de l'âge de cinq ans.

Les eaux de Châtel-Guion ne sont pas seulement propres à la guérison de la Phthisie pulmonaire au premier degré , elles sont très-efficaces dans les fievres putrides : je m'en suis servi très-utilement dans une colique hépatique. Je fus appelé dans l'année 1776 , pour une femme qui souffroit cruelle-

(a) Voyez le parallele des eaux minérales , p. 17 , 11 & suiv.

ment depuis quatre jours, d'une colique de cette espece : trois pintes d'eau de Châtel-Guion, prises en guise de tisane la guérissent sans d'autres secours. Je les fais couper dans les fievers putrides & dans les malignes avec du petit lait, ou avec la tisane ordinaire ; elles entretiennent la liberté du ventre & font l'effet d'anti-septiques.

Un magistrat respectable souffroit depuis long-tems de tournemens de tête presque continuels, avec des battemens considérables au front ; ses digestions se faisoient difficilement, il en avoit maigri au point qu'il tomboit dans une cachexie nerveuse. Il me consulta pendant le printems de l'année 1778 ; je lui conseillai l'usage des bains domestiques & la boisson des eaux minérales de Châtel-Guion. Il les prit comme altérantes, comme laxatives, & de tems en tems comme purgatives ; sa santé se rétablit parfaitement dans l'espace de trois mois. Comme ce magistrat est d'un tempérament délicat & très-irritable, toutes les fois que sa santé paroît se déranger, il en est prévenu par de légers mouvemens spasmodiques dans les entrailles, il a recours aux eaux de Châtel-Guion ; ce seul usage pendant cinq à six jours le rétablit totalement.

Comme le principe éthéré minéral de ces eaux, soutient la juste combinaison des principes fixes qui les minéralisent, c'est une raison pour ne jamais les faire chauffer, quoiqu'elles soient chaudes à leur source (a). La chaleur en feroit évaporer le principe

(a) Voyez le *Traité analytique des eaux minér.* tom. 2 ch. 5. p. 133 & suiv.

volatil, ce qui troubleroit l'union & le concours des autres principes ; la propriété des eaux en dégénéreroit, & leurs effets en deviendroient moins efficaces. Si les malades étoient dans le cas de ne pouvoir pas supporter leur fraîcheur sans se nuire, on approcheroit du feu une bouteille de ces eaux exactement bouchée, jusqu'à ce qu'elles eussent pris un degré assez médiocre de chaleur pour qu'il ne pût pas en accomplir l'évaporation.

Il s'est introduit dans le public un usage abusif, concernant les eaux minérales ; c'est d'y ajouter des sels étrangers pour leur donner plus d'activité, ou pour les rendre plus purgatives. On doit observer que la moindre addition d'un sel quelconque, peut les décomposer & y former de nouvelles combinaisons dont les produits ne ressemblent en rien à ceux de l'eau minérale qu'on se propose d'employer. Si par exemple on ajoute du sel de glauber à une eau minérale qui contienne parmi ses principes du sel marin à base calcaire, ou de magnésie, l'acide du sel marin se porte sur la base calcaire, ou magnésienne, & forme du gypse ou du sel d'epsom, & l'acide marin, en se combinant avec l'alkali minéral qui faisoit la base du sel de glauber, forme du sel marin. Il n'est pas de chimiste qui ignore qu'une dissolution mercurielle dans l'acide du nitre est précipitée en turbith minéral par le sel de glauber, ou par le tartre vitriolé. J'ai exposé dans le parallèle des eaux minérales les moyens que l'on emploie comme réactifs pour les analyser ; on y verra com-

bien on doit être en garde contre l'abus que l'on commet en y ajoutant des sels étrangers, dans la vue de les rendre plus purgatives. On ne fait souvent par cette addition que les décomposer au lieu de les rendre plus efficaces. Lorsqu'on juge nécessaire d'augmenter la vertu purgative des eaux minérales, il est plus à propos d'y ajouter de la manne, à des doses convenables au tempérament des malades ; on fait alors des eaux minérales un remède utile, au lieu qu'il est très-infidèle quand on y ajoute des sels étrangers.

Les rhumes catharreux longs & rebelles, soit qu'ils affectent directement les poumons, soit qu'ils proviennent d'engorgemens des sinus de la tête ou des glandes de la gorge, se terminent souvent, surtout lorsqu'ils sont négligés, par des Phthysies pulmonaires. Quand l'humeur catharreuse est fixée dans la poitrine, on distingue dans l'expectoration que les crachats proviennent des viscères de cette cavité. Alors l'âcreté des humeurs catharreuses retenue, forme des érosions, des ulcérations dans la substance des poumons ; c'est un commencement de pulmonie. Lorsque ces humeurs catharreuses sont fixées dans les sinus de la tête, ou dans les glandes de la gorge, on a des enchiffrenemens, des pesanteurs de tête douloureuses, une voix rauque & souvent une toux plus violente que celle qui est occasionnée par des rhumes de poitrine. Ces humeurs forment également des érosions, des ulcères, à la gorge, au larynx, qui se multiplient dans le canal de l'œsophage.

artere , dans les bronches , les vésicules bronchiques & enfin dans toute la substance pulmonaire ; de là la fièvre étiq̃ue , le marasme , &c. Quand bien même de tels ulcères ne se propageroient pas au de-là du larynx , ou du commencement du canal de la trachée-artere , la Phthisie n'en seroit ni moins dangereuse ni moins funeste. J'ai souvent vu des ulcères au larynx , conduire promptement au marasme & à une entière extinction.

Il y a trois mois que je fus appelé pour un jeune Seigneur , âgé d'environ vingt-huit ans , affligé depuis six ou sept mois d'un mal de gorge très-incommode. Je le trouvai dans un état déplorable ; il étoit réduit au dernier degré de marasme ; la fièvre étiq̃ue étoit marquée tous les après midi par des exacerbations précédées de frissonnemens qui duroient deux heures ; il se déclaroit ensuite une chaleur âcre avec des inquiétudes dans tout le corps , sur-tout aux extrémités ; la déglutition , principalement celle des liquides étoit très-pénible & très-laborieuse : il suoit abondamment toutes les nuits , il rendoit dans les vingt-quatre heures , par une expectoration très-pénible , deux livres au moins de crachats séreux , glaireux & moussieux , parmi lesquels on distinguoit sensiblement du pus qui rendoit une odeur fétide ; les appendices du voile du palais , les amigdales , les autres glandes de la gorge , paroissoient lâches , flétries & imbibées d'une humeur mucueuse très-sale. La luette étoit gonflée & relâchée on distinguoit à sa racine , à ses deux côtés

& à l'arriere bouche, des aphtes fordides qui selon toute apparence se propageoient dans la trachée-artere où le malade sentoît une gêne douloureuse qui n'avoit point de relâche. Malgré ces symptômes alarmans, il ne se plaignoit jamais de l'intérieur de la poitrine : des sueurs colliquatives concouroient à accomplir le marasme.

D'après cet état du malade, je ne pouvois que porter un jugement sinistre sur cette maladie, elle étoit trop avancée pour en concevoir la moindre lueur d'espérance ; je priai de me dispenser de la suivre, je ne fus point écouté, on exigea que je vissé le malade jusqu'à la fin, pour le soulager puisqu'il n'étoit pas possible de le guérir : peu de tems après il s'éteignit dans un marasme absolu.

On auroit sans doute prévenu le moment fatal, si dès le principe de cette maladie, on l'avoit confiée à des maîtres de l'art. Un guérisseur universel avoit inspiré au malade une aveugle confiance, il l'avoit séduit par des promesses téméraires, dont une profonde ignorance étoit la seule caution : le malade en fut la victime. C'est le sort ordinaire de ceux qui se livrent, au préjudice des lumieres de la raison, au penchant où les entraîne une aveugle crédulité.

On prévient des maladies de ce caractère, en traitant méthodiquement les rhumes catharreux dont elles sont les suites ; on guérit des aphtes & des ulcérations au larynx, avant qu'elles ne soient parvenues au point d'être sales, fordides & fongueuses.

La guérison en est très difficile , lorsque les ulceres ont pululé jusques dans l'intérieur de la trachée-artere ; les remedes , à l'exception des vapeurs ; celles-ci même ne s'y arrêtent pas , ne peuvent y pénétrer , leur secours devient presque impuissant. Cependant j'ai déjà rapporté d'après *Benet* l'histoire d'un malade guéri d'ulceres à la trachée-artere , par le seul moyen de vapeurs émollientes & aromatiques qu'il inspiroit successivement : je donnerai plus d'étendue à cette observation , dans l'article suivant.

Lorsque les rhumes catharreux traînent en longueur , on doit considérer l'état des poumons ; s'ils paroissent embarrassés , engorgés ou irrités , la saignée est indispensable ; il est même essentiel de la réitérer si les mêmes indications se soutiennent. Ce secours est nécessaire non - seulement dans les progrès des rhumes catharreux , mais encore dans leurs commencemens , principalement s'il y a des signes qui indiquent une pléthore générale ou particulière à la poitrine.

On a égard ensuite à l'état des premieres voies ; si les malades ont des inappétences , des dégoûts , des nausées , des envies de vomir , ou des vomissemens , on a recours à des vomitifs que l'on réitere selon que l'exigent les indications prises de l'état des malades & de l'effet des remedes. On les met ensuite à l'usage d'apofêmes composés de racines de bardane , de polipode de chêne , de buglose , de pissenlit , de chardon marie , de chardon rolland , &c. On y ajoute des feuilles de bourrache , de langue de

cerf, de chicorée sauvage, &c. On les rend laxatifs, en y délayant quelqu'un des fyrops cathartiques, tels que ceux de roses pâles, de nerprun, de fleurs de pêcher, de pomme, ou de chicorée, composés. Si les fibres membraneuses des poumons ne paroissent pas trop irritables, ou si elles sont relâchées, on emploie par préférence aux fyrops l'infusion d'un demi gros, ou d'un gros de rhubarbe, & l'on fait fondre dans chaque aposème un gros ou deux de sel d'epsom, ou de sel de glauber. On purge ensuite plus efficacement si les indications l'exigent.

Lorsqu'on a ainsi pourvu aux premières voies, on passe aux infusions & aux sucres épurés des plantes diaphorétiques, que l'on édulcore avec le miel ou le sucre rosat. Les plantes qui ont ces qualités sont la bourrache, la buglose, la scabieuse, le scordium, l'angélique, le ceterac; tous les capillaires, les fleurs de sureau, &c.

Si les diaphorétiques que je viens d'indiquer ou d'autres de la même classe ne produisent pas l'effet qu'on s'en est proposé, on a recours à des infusions, ou à des décoctions sudorifiques, telles que celles de false-pareille, d'esquine, de sassafras, de gayac, &c. On peut raper l'esquine, le sassafras & le gayac. On ne fait alors que les infuser dans l'eau bouillante. Si on ne les coupe que par morceaux, on les fait bouillir comme la false-pareille. On prend un verre de ces tisanes au moins toutes les quatre heures, on les édulcore avec le sucre, le miel, ou avec quelque fyrop. Ces tisanes sudorifiques se-

roient dangereuses dans les dispositions à la phlogose, à l'inflammation & lorsque les malades sont sujets à des hémoptysies ; on les suspend dès que l'on s'aperçoit de quelque signe qui indique quelqu'un de ces symptômes. On en revient alors aux simples diaphorétiques végétaux, émulsionnés & édulcorés avec des fyrops béchiques ; on les rend plus calmans , si la toux est violente, en y en ajoutant quelqu'un de narcotique : la dose de ces derniers est depuis une demi-once , jusqu'à une once.

Si malgré ces secours employés & ménagés d'après de justes indications, la toux catharreuse faisoit des progrès, on auroit lieu de craindre qu'il ne se formât des érosions, & qu'il ne s'établît des suppurations aux poumons, à la trachée-artère ou aux glandes de la gorge ; il seroit essentiel dans de telles circonstances de suspendre les sudorifiques, pour en revenir aux simples diaphorétiques émulsionnés & édulcorés avec des fyrops béchiques & calmans.

J'ai vu réussir dans des cas semblables, les eaux minérales savoneuses, telles que les eaux Bonnes, celles de Bagnères, de Luchon, ou de Cauterets, seules ou coupées avec le petit lait. Ces eaux sont minéralisées à-peu-près par les mêmes principes ; cependant celles de Cauterets sont plus vives que les autres, elles conviennent moins dans les maladies de poitrine, lorsque les malades ont la fibre roide ou irritable, & lorsqu'ils sont sujets à des hémoptysies, ou à rendre des crachats sanguinolens : dans tous ces cas les eaux Bonnes sont préférables aux autres.

J'ai fait plusieurs fois l'analyse des eaux Bonnes à Paris & à leur source ; j'ai trouvé par - tout également qu'elles contiennent un foie de soufre volatil & un sel marin à base terreuse , de la nature de la magnésie ; ces principes qui les minéralisent , les rendent savonneuses , très-douces , détersives & balsamiques , très-propres à prévenir les Phthysies pulmonaires catharreuses.

Les eaux de Cauterets sont minéralisées par des principes de la même nature , mais le soufre y est plus abondant que dans les eaux Bonnes & dans celles de Luchon ; c'est pourquoi leur usage exige plus de ménagement que celui de ces dernières , toutes les fois qu'on a lieu de craindre l'irritation & les hémoptysies.

Il est alors de la prudence de couper ces eaux avec du petit lait ; on diminue insensiblement la quantité de celui - ci & on augmente celle des eaux, si les indications le permettent ; autrement on continue de les prendre coupées. La dose des eaux de Cauterets à leur source est de deux livres ou deux livres & demie , on les prend en différens tems dans la matinée , & on en continue l'usage pendant quelques jours ; d'ailleurs on les ménage selon leur effet & selon le tempérament des malades.

Comme toutes ces eaux supportent le transport sans se décomposer , on peut les prendre dans les Provinces les plus éloignées de leurs sources , à la quantité de deux livres tous les matins , à une moindre ou à une plus forte dose , selon leur effet ,

selon la portée de l'estomac des malades & selon leur situation : on les fait chauffer modérément au bain - marie.

Les eaux minérales du Mont-d'or sont regardées, d'après un préjugé presque général, comme efficaces pour la guérison de la Phthisie pulmonaire ; on doit au contraire les considérer comme dangereuses dans cette maladie, principalement lorsqu'elle est parvenue au second degré ; elles ne conviennent même au premier degré que lorsque la principale cause de la Phthisie consiste dans le dérangement des digestions.

Les eaux du Mont-d'or ont une légère odeur de lessive & un goût aigrelet vineux qui porte au nez & devient désagréable ; si l'on plonge les mains dans le bassin de cette source, on les en retire onctueuses. Il paroît par les différentes analyses qu'on en a faites qu'elles contiennent une substance martiale, de la selenité, du sel marin, de l'alkali minéral, un peu de sel de glauber, & une matiere grasse & bitumineuse.

Les principales propriétés des eaux thermales du Mont-d'or, prises intérieurement & en bains, sont de procurer la guérison des rhumatismes, des sciati-ques & des paralysies ; de rétablir le ton & le ressort des membres affoiblis par de longues douleurs. On conçoit par ces effets que de telles eaux doivent être extrêmement toniques. Elles ont principalement la propriété de provoquer des sueurs abondantes, & le dangereux défaut de renouveler des hémoptysies

& d'en causer à des malades qui n'y sont point sujets.

Si les eaux du Mont-dor étoient simplement dia-phorétiques, elles pourroient convenir au premier degré de la Phthisie pulmonaire, dans le cas où elle seroit occasionnée par des embarras naissans dans les glandes & dans les vaisseaux capillaires de la substance des poumons. Comme leur vertu sudorifique dépend de leur activité & qu'elles n'opèrent que par l'irritation, elles ne feroient qu'irriter les fibres des membranes délicates de ce viscere déjà disposées à s'enflammer. De copieuses sueurs épuiferoient une sérosité nécessaire à la circulation de la lymphe dans les labyrinthes infinis de la substance des poumons; les engorgemens glanduleux en deviendroient plus considérables & plus rebelles aux secours de l'art.

Il n'est rien de plus dangereux & de plus à craindre dans la Phthisie pulmonaire que la colliquation des liquides, & que les sueurs colliquatives qui sont l'effet de ce désordre; l'usage des eaux du Mont-d'or, au second degré de Phthisie, ne pourroit que prématurer des sueurs de cette nature & précipiter un funeste dépérissement; des hémoptysies provoquées ou renouvelées, ne pourroient être que pernicieuses dans tous les tems de cette cruelle maladie & dans tous ses degrés.

J'ai fait ces observations sur les effets des eaux du Mont-d'or, dans la Phthisie pulmonaire, pendant que j'ai exercé la Médecine en Auvergne; depuis ce tems-là je les ai vues confirmées en plusieurs occasions. Je n'ai vu ces eaux opérer de bons effets dans

les maladies de poitrine, que dans des asthmes humides & dans les symptômes avant-coureurs de la pulmonie, dont la cause provenoit de l'inertie des fibres membraneuses des premières voies.

ARTICLE II.

Méthode curative de la Phthisie pulmonaire au second degré.

Les différentes causes de la Phthisie pulmonaire, parviennent enfin au second degré de cette maladie, à former des ulcères, à enflammer des tubercules, à effectuer leur suppuration, à établir la fièvre étiq̃ue & à développer tous les symptômes qui en indiquent le caractère.

La suppuration des ulcères des tubercules est presque toujours la suite de l'inflammation qu'on distingue par l'augmentation de la fièvre, par une chaleur mordicante & par la sécheresse de la peau ; par des inquiétudes dans les membres, quelquefois par une sensation douloureuse à la poitrine, qui n'a lieu ordinairement que lorsque les ulcères sont placés vers la superficie des poumons, ou qu'ils intéressent des adhérences naturelles ou accidentelles de ce viscère. Il est à craindre dans des cas semblables que l'inflammation ne conduise à une fièvre péri-pneumonique, pleine de danger, ou à des hémoptysies dont les suites pourroient devenir très-dangereuses. Tous ces symptômes exigent des saignées proportionnées au tempérament des malades, & ménagées selon le plus ou le moins de fièvre ou d'inflammation.

On seconde l'effet des saignées par l'usage du petit lait, par des infusions de fleurs de mauve, de guimauve, de violettes de Mars, de bouillon blanc, de pié-de-chat, de tussilage, de coquelicoc ; par de légères décoctions de feuilles de laitue, de poirée, de pariétaire, &c. On édulcore ces infusions, ces décoctions, avec du sucre ou avec les syrops de capillaire, de tussilage, de violettes, de pié-de-chat, de guimauve, &c.

Si les symptômes ne diminuent pas ou ne diminuent que lentement, on émulsionne les infusions avec les semences froides, & principalement avec celle de pavot blanc ; on les édulcore avec quelque'un des syrops béchiques, & si la toux est fréquente, importune ou violente, on y ajoute le syrop de diacode ou celui de karabé, à des doses proportionnées au tempérament des malades & à la violence des symptômes qui exigent ce secours.

A mesure que la fièvre & l'inflammation diminuent, les ulceres s'établissent, prennent de l'accroissement & deviennent contagieux aux poumons ; il s'en forme de nouveaux, ou par l'effet de la contagion ou par des causes pareilles à celles qui ont produit les premiers.

Dès que la fièvre inflammatoire a pris le caractère de fièvre lente, on doit avoir recours à des boissons diaphorétiques, détersives & vulnéraires, avec une ou deux des plantes qui ont cette vertu, telles que le lotier odorant, la véronique mâle, la velote ou véronique femelle, la verge d'or, les sommités de

millepertuis, la pulmonaire, &c. On les édulcore avec la réglisse ou avec le miel, on n'emploie ce dernier que lorsqu'il n'y a pas de disposition à des cours de ventre colliquatifs; dans ce cas on se serviroit de sucre ordinaire, de sucre rosat, ou de syrop du chantre.

Les Médecins Allemands & les Anglois font usage dans cet état de la pulmonie, d'eaux minérales gaseuses, telles que celles de Seltz, qu'ils regardent comme uniques en Allemagne; ils n'en connoissent point de pareilles en Angleterre. Il n'en est pas de même en France, la plus grande partie de celles qui sourdent dans les montagnes d'Auvergne sont plus ou moins gaseuses; celles de St. Myon sont minéralisées par les mêmes principes & dans les mêmes proportions que celles de Seltz, & elles ont les mêmes propriétés (a).

Ces eaux sont en même tems calmantes & antiseptiques; on en fait prendre avec succès pour modérer, pour calmer les irritations nerveuses qu'occasionnent les ulcères phlogosés des Phtyriques. Si on les coupe avec du petit lait, elles en acquierent une qualité détersive qui concourt puissamment à la guérison de leur maladie: on en prend quelques verres tous les matins, sans préjudice des autres secours indiqués par les différens symptômes & par l'état des malades.

Les eaux minérales de Seltz, ou celles de Saint-

(a) Voyez le parallele des Eaux minérales d'Allemagne & de France, Sect. 2. art. 1. p. 53. & suiv.

Myon, prises aux repas pour boisson ordinaire sont très-propres à garantir le chyle¹ des impressions de putridité que font sur ce suc nourricier des sucs gastriques toujours mal conditionnés, principalement au second & au troisième degré de la Phthisie pulmonaire ; on peut mêler un peu de vin avec ces eaux quand on les prend au repas , supposé que l'état des malades le permette.

Si malgré ces secours les ulcères font des progrès, on le distingue par la fréquence de la toux , par l'abondance des crachats qui devient plus considérable , par le pus qui prend une mauvaise qualité, par les exacerbations de la fièvre étiq. & par les frissonnemens qui les annoncent. Ce dernier symptôme se manifeste principalement après les repas , lorsque le chyle passe dans les poumons ; ce qui démontre bien sensiblement combien ce viscère est irritable dans cet état de souffrance.

Ne se feroit-on pas trompé , lorsque l'on a pris ces exacerbations très-ordinaires chez les Phthisiques ; pour des accès de fièvres intermittentes ? La fièvre étiq. n'a point d'intermittence , ses symptômes sont toujours les mêmes dans les intervalles des exacerbations , au lieu que les symptômes des fièvres intermittentes ne se manifestent que pendant la durée des accès. Lorsque la fièvre étiq. est établie , elle l'est constamment jusqu'à la convalescence , ou jusqu'au dernier moment du malade. La cause de cette fièvre étant toujours la même , elle doit en général produire les mêmes effets. Ces effets sont plus ou moins

sensibles, plus ou moins considérables, selon les différens degrés de la putridité, que l'on distingue par les symptômes qui en résultent.

Le chyle des Phthisiques, en passant dans la substance pulmonaire, y cause d'abord des frissons, en agaçant ou en irritant les membranes des vaisseaux des parties précordiales. Il est ensuite distribué dans le torrent de la circulation du sang, sans avoir été digéré dans les poumons ; il ne peut dans cet état que mettre le désordre dans la régularité de la circulation des liquides, irriter les membranes des vaisseaux & rendre irrégulières les oscillations de leurs fibres. Ces obstacles opposés aux vues de la nature, déterminent des forces centrales plus énergiques, absolument nécessaires pour surmonter les résistances qui s'opposent à la circulation du sang ; de là, la chaleur qui succede aux frissons ; de là, les inquiétudes des membres, les oppressions, la toux plus fréquente, plus forte, plus importune, &c.

Il est des Auteurs qui conseillent l'usage du quinquina comme fébrifuge dans cet état de la Phthisie, mais n'y seroit-il pas plutôt nuisible que salutaire ? le quinquina a une qualité très-astringente, & qui paroît plus propre à augmenter la cause des exacerbations de la fièvre étique qu'à la dissiper. Le docteur Hales a fait dans sa savante Statique des animaux, une expérience bien propre à éclaircir ce problème : je la rapporte dans toute son étendue (a).

(a) Traduction de Sauvages, pag. 105 & suiv.

« J'ai fait, dit cet Auteur, une forte décoction
» de quinquina, en en faisant bouillir une livre
» dans douze pintes d'eau, jusqu'à ce qu'elle ait
» été réduite aux deux tiers; quand elle a été re-
» froidie, je l'ai filtrée plusieurs fois à travers d'un
» sac de flanelle. Les jours suivans je préparai &
» je coupai les boyaux d'une petite chienne, pour
» servir à l'expérience suivante.

« Je versai d'abord dans un tube qui étoit
» fixé à l'aorte quatre pots d'eau chaude, con-
» tenant chacun huit pouces cubiques de liqueur;
» le dernier passa en soixante-deux secondes de
» tems; je versai ensuite successivement seize pots
» de la décoction de quinquina également chaude,
» le premier desquels passa dans soixante-douze
» secondes, les suivans employèrent un tems plus
» long à passer, à proportion que les vaisseaux se
» contractoient davantage, par la vertu astringente
» de la décoction, de manière que le seizième
» pot ne s'écoula que dans l'espace de deux-cens
» vingt-quatre secondes.

» Je versai ensuite, ajoute le même Auteur,
» onze pots d'eau aussi chaude que la décoction;
» le premier passa en cent quatre-vingt-dix-huit
» minutes, & les suivans coulerent plus vite, à
» proportion que la décoction s'affoiblissoit & que
» les vaisseaux capillaires étoient par conséquent
» relâchés par l'eau; de façon que le troisième
» pot passa en quatre-vingt-seize minutes; après
» quoi les autres passerent dans le même tems,

» les vaisseaux ne s'étant pas relâchés davantage.
 » On ne devoit pas espérer que cette eau les relâ-
 » chât jusqu'à pouvoir s'écouler dans l'espace de
 » soixante-deux secondes , comme avoit fait le
 » quatrième pôt d'eau , dans cette expérience ;
 » car j'ai toujours éprouvé qu'en continuant long-
 » tems à verser de l'eau , les vaisseaux devenoient de
 » plus en plus étroits , étant comprimés par l'eau
 » qui s'insinuoit dans tout le tissu des parois in-
 » testinales , & qui les rendoit plus épaisses qu'elles
 » ne l'étoient d'abord ; ce qui fait voir que la
 » constriction des vaisseaux ne pouvoit être di-
 » minuée par l'affusion de l'eau chaude , que dans
 » la proportion qu'on a observée dans l'expérience
 » précédente , au lieu que la constriction des vais-
 » seaux due à la vertu styptique de la liqueur ,
 » comme nous l'avons vu par cette expérience & les
 » autres , étoit évidemment enlevée , par la qualité
 » laxative de l'eau qui entraînoit les parties astrin-
 » gentes , &c. »

La fièvre étique est causée & entretenue par
 le pus des ulcères , qui étant résorbé dans les vais-
 seaux du sang & de la lymphe , fait dégénérer ces
 précieux liquides , les corrompt & les réduit enfin
 en humeurs purulentes , qui conduisent les ma-
 lades à une fin fatale. Les exacerbations de cette
 fièvre , sont occasionnées , je l'ai déjà observé ,
 par un chyle cru mal conditionné , qui passant des
 poumons dans le système général des vaisseaux , y
 fait les effets d'un corps étranger très-disposé à

se corrompre de plus en plus : c'est ainsi que le chyle contracte une qualité purulente , par son mélange avec le pus des ulcères , dont la masse du sang est imbuë & dont elle a déjà pris le caractère.

Quels bons effets pourroit produire l'usage du quinquina dans ces circonstances ? la nature renouvelle ses efforts par les exacerbations de la fièvre étiq̃ue ; pour dissiper ces humeurs étrangères , le quinquina est très-propre à les retenir par sa vertu astringente. La transpiration cutanée est le moyen le plus favorable à la dépurat̃on de la masse des liquides , principalement dans la Phthisie pulmonaire , l'usage du quinquina diminueroit les calibres des pores exhalans , les effaceroit en partie , & rendroit nuls les efforts de la nature.

La matiere de la transpiration est l'excrément des dernières digestions ; celle des Phtysiques provient d'une source corrompue ; elle ne peut être que putride & contagieuse ; quels dangereux effets ne produiroit-elle pas , si elle étoit retenue ou répercutée dans les vaisseaux du sang & de la lymphe , par l'usage mal entendu d'un remède doué d'une astring̃tion telle que celle du quinquina ?

Il est généralement reconnu que l'effet des astringens est bien moins considérable & moins dangereux lorsque ces remèdes passent par les voies des digestions , que quand ils sont injectés dans les vaisseaux ; cependant quelque modéré que soit celui du quinquina , il lui reste toujours une propriété assez astringente , pour oblitérer des vaisseaux capil-

laïres, pour effacer des pores exhalans, pour retenir la transpiration insensible & pour devenir nuisible dans la Phthisie pulmonaire, sur-tout si l'on abuse de son usage.

D'après ces réflexions ne doit-on pas conclure que la fièvre étiqne ne prend point le caractère de fièvre intermittente, & que l'usage du quinquina dans cette fièvre, donné comme fébrifuge seroit toujours opposé aux vues de la nature ?

On ne doit jamais abandonner dans les différens degrés de la Phthisie pulmonaire, les infusions, les décoctions des plantes émollientes, calmantes, béchiques & détersives, sur-tout quand il y a des marques d'irritation ou de phlogose. Il n'en est pas de même des diaphorétiques, il faut y renoncer totalement dès que le marasme commence à s'établir & lorsque l'on s'apperçoit de quelque signe de colliquation : les diaphorétiques seroient alors très-insidieux, les sudorifiques le seroient davantage, ils concourroient à précipiter la dissolution des globules rouges du sang & à accomplir la colliquation.

La fétidité du pus, sa contagion, la diarrhée, les sueurs colliquatives, le marasme, l'abattement des forces, sont autant de signes que la maladie prend un caractère scorbutique qui augmente le danger dont elle menace, & qui souvent le rend inévitable. C'est dans cet état que les ulcères font des progrès, qu'il s'en forme de nouveaux, que le pus croupissant dans les poumons en corrode la substance, y forme des sinuosités, des clapiers, des

lacs qui opèrent insensiblement la destruction totale des fonctions de ce viscere. Dans ce cas alarmant on a recours aux anti-septiques, aux deterfifs, &c.

Dans toutes les especes de pulmonie, quels qu'en soient le caractère, les causes, les degrés & les symptômes, on emploie par préférence, des remedes choisis dans les différentes classes des végétaux, sans préjudice de ceux des autres regnes qui pourroient y être utiles ; on donne les végétaux en infusion, en décoction, en émulsions, en loochs, en bouillons, en fucs, en opiat, en conserves, en extraits. On se sert de ces derniers, principalement pendant l'hiver, lorsque dans cette saison on n'a pas des plantes qui aient conservé leurs vertus.

On choisit parmi les anti-septiques, la germandrée, le scordium, la petite centaurée, le marrube blanc, la tanaïsie, l'origan, la menthe, le pouliot ; le sucre, les baumes, le camphre, la myrrhe, l'oliban, &c ; parmi les toniques vulnéraires, la véronique mâle, la velote, la verge d'or, le millepertuis, l'yvette, la pimprenelle, la scolopendre, la bugle, la sanicle, la grande consoude, la brunelle, la bistorte, la pervenche, la pyrole, la renouée, le plantain, la quinte-feuille, le marrube blanc, la mille-feuille, &c. Les plantes béchiques sont le petit capillaire, le politric, le ruta-méraria, le cetérac ou dauradille, la pulmonaire, le tussilage, l'hysope, la réglisse, le coquelicoc, le pié-de-chat, l'aunée, la bourache, la buglose, le lierre terrestre, les navets, sur-tout les raves du Périgord, &c. Les fleurs qui ont cette propriété sont celles de mauve, de guimauve, de molène,

de violette de Mars, de tuſſilage, de pié-de-chat. Les fruits ſont les raiſins ſecs, les figes graſſes, les dattes, les jujubes, les ſebeſtes, les pignons doux ; on édulcore les infuſions, les décoctions, les ſucs de ces plantes avec du ſucre roſat ou avec des ſirops béchiques, tels que ceux de guimauve, de vélar, de capillaire, de tuſſilage, de tortue, &c.

Les gommés adragant & arabique ſont adoucifiantes, déterſives, béchiques & très-propres à modérer la toux & les irritations des poumons ; on les emploie très-utilement diſſoutes dans les infuſions, dans les décoctions, & les ſucs des plantes vulnérables & béchiques, dans les émulſions, les loochs, les bouillons propres à la Phthiſie pulmonaire dans ſes différens degrés. La doſe ordinaire de ces gommés eſt environ un demi gros par livre de liquide. Les habitans des Provinces qui ne ſont pas à portée de ſ'en procurer, peuvent leur ſubſtituer celles de prunier, de ceriſier, d'amandier & des autres arbres fruitiers. Elles ont à peu près les mêmes propriétés que les gommés adragant & arabique.

Une dame âgée de 48 ans, après pluſieurs hémoptiſies conſidérables, cracha enfin le pus ; elle maigriſſoit à vue, & la fièvre étiſque étoit caractérisée ; on avoit mis en uſage différens remèdes propres à ſon état ; cependant la Phthiſie faiſoit des progrès : un long uſage de mucilage de gomme adragant, dans l'infuſion de mille-feuille la guérit parfaitement.

On compoſe les bouillons avec quatre onces de longe de veau, ou autant de poulet, de tortue, de mouton, ou environ deux douzaines de limaçons,

ou sept à huit grenouilles écorchées, vuidées, auxquelles on retranche les têtes & les pattes ; on peut y ajouter, s'il est des indications qui l'exigent, trois ou quatre écrevisses rougies & écrasées. J'ai déjà observé que les bouillons de toutes ces substances animales, sont les mêmes & de même nature, ils ne peuvent être placés que dans la classe des restaurans. On les rend médicamenteux en y ajoutant quelques racines & quelques plantes appropriées à l'état des malades & aux symptômes de leur maladie, telles que les racines de chicorée sauvage, de pissenlit, de bardane, de buglose, de polipode de chêne, &c. On y ajoute quelques minutes avant d'ôter le dépôt du feu, des feuilles de trois ou quatre plantes vulnérables, telles que la pulmonaire, la bugle, la fanicle, la pervenche, les sommités de grande consoude, le lierre terrestre. On y ajoute pour infuser, du cresson de fontaine. Si l'on fait ces bouillons au bain - marie, on met tout ensemble & en même tems, on lute le pot ; il faut quatre ou cinq heures de cuisson.

On fait usage très-utilement d'un jus de navets & de veau ; on remplit le pot de couches successives de rouelles de navets & de tranches très-minces de veau, jusqu'à ce qu'il soit plein. Je fais mettre ordinairement, au milieu de ces couches, quelques plantes vulnérables de la classe de celles qui sont indiquées par les symptômes de la maladie. Si les navets n'ont pas assez de suc, on y ajoute trois ou quatre cuillerées d'eau, pour qu'ils ne soient pas

d'abord pris par le feu ; on lute le pot exactement & on fait consommer le tout sous des cendres chaudes. On prend ce suc par petites doses , dans le jour & dans la nuit , hors le tems de la digestion & celui du sommeil ; il est très propre pour modérer la toux , pour favoriser l'expectoration , & il sert en même tems d'aliment & de remède.

J'ai déjà observé que la toux est un obstacle à ce que les ulcères se cicatrisent , parce qu'ils sont tiraillés & déchirés par les concussions du thorax & par la rapidité avec laquelle l'air est chassé des vésicules pulmonaires & des bronches. Le suc nourricier que la nature fournit aux ulcères , en est écarté par la fréquence de la toux ; cette même cause empêche que le pus ne prenne une bonne qualité ; on fait que la cicatrice des ulcères ne se fait qu'à la faveur d'un bon pus bien conditionné.

On ne sauroit employer des moyens assez puissans pour seconder la nature dans une opération de cette importance ; il est donc essentiel de modérer la toux par les secours les plus prompts & les plus efficaces. On fait usage , sans préjudice des boissons ordinaires , d'émulsions & de loochs calmans , composés d'infusions de fleurs pectorales , ou de feuilles de plantes béchiques ; on fait les émulsions avec des amandes douces , des semences froides , des pignons doux , de la semence de pavot blanc , &c. On édulcore ces émulsions , ces loochs , avec des syrops béchiques ; on y ajoute ceux de diacode ou de karabé , à des doses proportionnées au tempérament des malades.

Si l'expectoration est rendue difficile par des crachats trop gluans, on substitue aux décoctions béchiques & pectorales celles de racines d'aunée, de queue de pourceau, & aux infusions celles de feuilles d'hysope & de thym; on y ajoute de l'oximel simple & l'une des deux gommés, adragant ou arabique.

On est dans l'usage mal entendu d'employer l'huile d'amandes douces dans les loochs des pulmoniques, sur-tout au second & au troisieme degré de la maladie. J'ai toujours observé que peu de tems après que les malades en ont pris ils sont fatigués par des nauzées & rendent des rots de mauvais goût. C'est une marque que l'huile devient rance dans leur estomac, ce qui doit être nécessairement, parce que la chaleur étique l'alkaliferoit, quand bien même il n'existeroit pas dans les premieres voies de principe d'alkalescence.

Il n'est rien de plus pressant, lorsque les ulceres sont en pleine suppuration, que d'employer les moyens propres à garantir la substance pulmonaire de leur contagion, afin qu'ils ne se multiplient pas, & de prémunir la masse du sang contre la corruption qu'elle contracteroit par le mélange du pus résorbé dans ses vaisseaux. Les infusions, les décoctions, les sucés, les bouillons composés de plantes vulnérables toniques & légèrement astringentes, sont propres à ces indications, mais ils ne les remplissent pas suffisamment. L'usage & des observations soutenues ont consacré les baumes naturels à cet objet important, mais on ne doit en user qu'avec ménagement.

Les baumes naturels sont de vraies résines, ou si l'on veut, des sucres résineux balsamiques, huileux & odoriférans ; ils ne diffèrent entre eux que par la différence des climats, des plantes ou des arbres qui les produisent. Le baume de la Mecque est considéré comme le plus pur & le plus précieux ; cependant il est d'un goût âcre & d'une odeur pénétrante, approchant de celle du citron, il excite des nausées. Les autres baumes ont les mêmes inconvéniens, à l'exception de ceux de Tolu & du Canada ; celui-ci est sans odeur, il a un goût de thérobentine assez doux & agréable ; il ne donne point de nausées. Le baume de Tolu a une odeur qui approche de celle du benjoin ; sa saveur est douce & agréable. C'est par ces qualités que le baume de Tolu diffère des autres baumes qui ont une saveur âcre & amère, ce qui fait qu'il est le plus propre aux usages intérieurs ; il en est de même de celui du Canada.

Quoique le baume de Tolu soit le plus doux de tous les baumes, on en fait un sirop qui le rend encore plus propre pour les maladies de la poitrine que si on le prenoit en substance. Ce sirop est composé uniquement de baume, d'eau & de sucre ; on doit le considérer comme un puissant vulnéraire anti-septique ; la dose de ce sirop est depuis deux gros jusqu'à une once ; le baume du Canada réduit en sirop auroit les mêmes vertus.

Si la Phthisie fait des progrès, malgré l'usage de ces remèdes, on a recours à des anti-septiques plus puissans, tels que l'aloës, la myrrhe, l'oliban, le

camphre & tous les aromates de la classe de ces derniers : on les donne d'abord à petites doses ; on les augmente progressivement, selon la force des symptômes, on y joint même quelque préparation de pavot, principalement lorsque la toux est quinteuse ou violente ; on doit ménager les doses de ce remède avec une savante retenue ; cependant son usage est très-essentiel, non-seulement pour procurer du repos aux malades, mais encore pour modérer la toux qui fait toujours obstacle à la guérison des ulcères ; je l'ai déjà observé.

Pringle regarde le sucre & le camphre comme de puissans anti-septiques. Il a observé que deux grains de camphre, le sont plus que soixante grains de sel marin. Cet Auteur attribue la même vertu au quinquina : Torton en a fait usage ; il paroïssoit d'abord procurer quelque soulagement, cependant la maladie faisoit des progrès jusqu'à la mort. Vogel a observé que ce remède ne fait aucun bon effet dans la disposition à la Phthisie : je m'en suis servi un nombre de fois sans en retirer le moindre avantage. Cependant Pringle a observé que le quinquina retarde la corruption de la viande bien plus que le sel commun & le nitre. Ce n'est pas une raison pour en conclure qu'il doive produire le même effet sur les animaux vivans. Lorsque j'en ai fait usage au second degré de la Phthisie, je ne lui ai vu produire d'autre effet que de causer le plus souvent des cours de ventre dangereux. La grande astriction du quinquina est très-propre à diminuer la transpiration insensible.

La matiere transpirable retenue dans les vaisseaux du sang, ne peut qu'accélérer le progrès de la corruption de ce liquide. La nature alors surchargée d'humeurs étrangères corrompues, force les voies des garde-robes, les y détermine; il s'ensuit des cours de ventre très-propres à accomplir la colliquation & à conduire la maladie au point d'être sans ressource. Je ne prétens pas donner l'exclusion à tous les astringens, dans la méthode curative de la Phthisie, au contraire, ils y sont utiles lorsqu'ils n'ont qu'une astriction modérée, telle que celle des plantes qui ont cette qualité; elles n'agissent sur les fibres nerveuses, sur les membranes des vaisseaux & sur les pores de la peau que comme toniques & détersives; par ces propriétés, elles sont anti-septiques & d'un grand secours dans cette maladie.

Lorsque la Phthisie qui vient d'ulcérations a pris un caractère scorbutique, ce qui arrive ordinairement à la fin du second ou au commencement du troisieme degré, on ajoute à l'usage des plantes, des baumes & des autres remedes vulnéraires, toniques & anti-septiques, celui des plantes anti-scorbutiques. Comme ces plantes abondent en alkali volatil, il est des circonstances où elles seroient nuisibles & où elles pourroient enflammer les ulceres; c'est pourquoi il faut les choisir parmi les plus douces, & les employer avec ménagement, quant à leurs doses & à leurs qualités. On modere l'activité des infusions, des sucres & des bouillons de ces plantes, par

le mélange d'acides végétaux , tels que l'oseille , l'alléluya , l'épine vinette , &c. Une tisane faite avec les oranges douces & le sucre , en guise de limonade , seconde parfaitement l'usage de ces remèdes.

Les plantes dont on peut faire usage dans la Phthisie qui a pris un caractère scorbutique , sont le cresson de fontaine , le cochléaria , le bécabunga , le treffle d'eau , la berle ou ache d'eau , les bourgeons de houblon , ceux de sapin , le pourpier rouge. Je suis dans l'usage de joindre quelque plante amère & savonneuse , aux anti-scorbutiques ; la chicorée sauvage , par exemple , le pissenlit , &c. J'ai rapporté des observations faites par des Médecins célèbres de guérisons de pulmonies désespérées , par un usage constant de conserve de roses , de sucre rosat , de fraises , & de tisanes ; il est vraisemblable que ces Phthisies , avoient dégénéré en scorbutiques , ou qu'elles l'étoient dans leur caractère primitif. Ces usages avoient été exigés par le goût des malades par leur propre penchant , & par conséquent ils avoient été indiqués par la nature ; on doit donc regarder ces substances comme anti-scorbutiques & y avoir recours dans des cas semblables.

Lorsque la Phthisie tuberculeuse est au second degré , les tubercules s'enflamment , la fièvre augmente & la suppuration s'établit. On a d'abord recours à la saignée que l'on réitère selon les ressources du tempérament & des forces du malade , selon que l'exigent la fièvre & l'inflammation. On seconde les effets de la saignée par une diète sévère , par

l'usage du petit lait, de tisanes d'avoine ou d'orge, par des juleps tempérans, par des émulsions calmantes & des lavemens émolliens. Il arrive quelquefois qu'il s'enflamme plusieurs tubercules en même tems, & que l'inflammation intéresse la substance des poumons ; ce sont alors des fievres péripneumoniques qui exigent les plus sérieuses attentions. On les modere par les mêmes moyens que l'on met en usage pour les autres inflammations tuberculeuses ; on observe ces moyens, on les multiplie, & on y persévère jusqu'à ce que l'inflammation soit dissipée. La fièvre alors se modere, elle devient lente ; les tubercules forment des ulcères & l'on commence à cracher le pus. Cet état exige qu'on ait recours aux infusions, aux décoctions, aux bouillons, aux fucs des plantes apéritives, vulnéraires, béchiques, & aux eaux minérales de Seltz ou de Saint-Myon que l'on coupe d'abord avec du petit lait, & dont on fait ensuite le même usage indiqué dans la méthode curative de la Phthisie qui a commencé par des ulcères ; on ajoute aux infusions, aux décoctions & aux fucs des plantes les gommés adragant ou arabique, & on les édulcore avec des fyrops pectoraux ou béchiques.

Les tubercules qui suppurent, se dissipent ordinairement par la suppuration ; cependant les ulcères qui en proviennent pénètrent souvent dans la substance des poumons, & y forment des sinuosités, des lacs, des clapiers, &c. qui exigent les mêmes secours qui sont d'usage dans la Phthisie occasionnée

immédiatement

immédiatement par des ulcères. S'il se forme de nouveaux tubercules , comme il est très-ordinaire dans cette espèce de Phthisie , ils s'enflamment lorsqu'ils sont parvenus à leur point de maturité , ils renouvellent l'inflammation & tous les symptômes. On réitere la même méthode curative que j'ai indiquée pour la guérison des premiers tubercules enflammés & de la fièvre péricneumonique , si elle a lieu.

Il est essentiel dans des circonstances aussi délicates d'employer les moyens les plus efficaces pour éviter que les tubercules ne pullulent & ne se multiplient. Comme ils prennent leur principe du caractère de la lymphe & de sa densité , il faut tenir ce fluide assez divisé pour qu'il s'écarte moins de l'ordre de la nature. Quant à son caractère , on le distingue par des indications qui lui sont particulieres & qui n'échappent pas à la sagacité des médecins ; d'ailleurs j'en ai traité en différens endroits de cet ouvrage , il seroit superflu de me répéter.

On divise la lymphe & on la rend plus coulante en faisant les infusions des plantes vulnérables & béchiques , dans de légères décoctions de racines apéritives , telles que celles de chiendent , de pissenlit , de chicorée sauvage , de garance , de chardon-roland , de chardon étoilé , &c. On ajoute également ces racines aux décoctions , aux bouillons & aux suc de ces mêmes plantes , ou d'autres telles que les symptômes de la maladie l'exigent.

On seconde l'effet de ces remèdes par l'usage

d'autres apéritifs , tels que la gomme ammoniac le sagapénium , le galbanum , le safran oriental , l'antimoine cru , &c. On prend huit ou dix grains de l'une ou de l'autre de ces gommes , quatre grains de safran & deux grains d'antimoine cru exactement porphirisé ; on en forme des bols avec le syrop des cinq racines apéritives , pour une prise , que l'on réitere tous les matins pendant autant de tems que les indications l'exigent ; on boit par-dessus une ou deux tasses d'infusion de quelque plante pectorale. On met d'ailleurs en usage dans la méthode curative de la Phthisie tuberculeuse , les mêmes moyens , les mêmes secours indiqués dans celle qui est occasionnée par des ulcères. Il faut dans l'une & l'autre espèce modérer la toux , faciliter l'expectoration , procurer du sommeil , déterger les ulcères , garantir le sang de la contagion du pus , par le moyen des anti-septiques.

Comme les tubercules , après quelque tems de suppuration , deviennent ordinairement scrophuleux , la composition précédente des gommes , de safran & d'antimoine est un remède efficace dans cet état de la maladie. On ajoute aux infusions , aux décoctions , aux bouillons , aux suc des plantes pectorales , détersives & vulnéraires , des plantes anti-scrophuleuses , telles que la fumeterre , la germandrée , la camomille , le mélilot , les sommités de petite centaurée , le cresson de fontaine , &c. On édulcore également ces boissons avec des syrops béchiques. On ne peut faire usage , pour résoudre

les tubercules phthifico-scrophuleux, que de remèdes les plus doux, par rapport à l'état de phlogose des poumons, à leur délicatesse & à leur irritabilité.

Lorsque les tubercules ne sont pas de nature à suppurer, ce que l'on distingue par la gêne de la respiration, par la longue durée d'une toux sèche, fréquente, très-importune, (a) &c. On doit faire un long & fréquent usage de boissons humectantes, délayantes, apéritives & diaphorétiques. Ces remèdes sont propres à rétablir la fluidité de la lymphe, à faciliter les sécrétions dans la substance des poumons, & à entretenir la matière des excréments dans l'ordre de la nature. Les humeurs excrémenteuses qui ont formé des engorgemens tuberculeux dans les bronches & dans les vésicules bronchiques (b), peuvent être ramolies, divisées par ce secours & devenir propres à être expulsées par les voies des crachats. On a encore la ressource des eaux minérales ferrugineuses; on peut aussi faire usage d'évaporations de plantes émollientes qu'on introduit dans la poitrine par le moyen de l'inspiration. Cette vapeur ayant pénétré dans la trachée-artère se distribue dans les vaisseaux de l'air, & peut rendre les concrétions tuberculeuses de cette nature propres à subir les loix de l'expectoration.

Si l'on n'a pas le bonheur d'obtenir ces heureux effets de l'usage des remèdes, les matières tuberculeuses qui engorgent les calibres des bronches & de leurs vésicules, sont obstacle à la distribution de

(a) Voy. prem. Partie, Sect. 4. ch. 2. (b) *Ibid.*

l'air dans les poumons & la rendent de plus en plus difficile & pénible ; la sanguification en souffre & se pervertit. Tout devient irrégulier dans ce viscere, & tombe dans le désordre ; le marasme s'établit insensiblement, il devient absolu, la respiration s'éclipse enfin, & la force de la vie s'éteint dans la langueur.

On a donné & l'on donne encore quelque confiance pour la guérison de la Phthisie pulmonaire, aux vapeurs des médicamens propres à déterger les ulcères des poumons & à les cicatrifer. On hume ces vapeurs à mesure qu'elles s'exhalent des vases dans lesquels on les a préparées, elles pénètrent dans la trachée-artère, confondues avec l'air que l'on inspire, se répandent dans les bronches, dans leurs vésicules & s'insinuent dans la substance de ce viscere, par le moyen des pores absorbans. On se sert à cet effet de lait chaud, de la décoction de plantes apéritives, détersives & vulnéraires ; de térébentine, de baumes & d'autres anti-septiques.

Comme ces vapeurs pénètrent directement dans la substance pulmonaire, elles l'imbibent, l'humectent, la dessèchent, ou font dans ce viscere des effets selon leurs propriétés. Ce moyen de guérir la Phthisie pulmonaire est presque toujours infidèle ; il est peu d'exemples de guérisons faites par cette voie ; cependant Benet a donné une observation sur les bons effets de cette méthode ; je l'ai déjà rapportée dans cet ouvrage. Un gros marchand de Londres étoit malade, dit cet Auteur, d'une Phthisie confir-

mée ; il guérit par le moyen de vapeurs & de fumigations ; six ans après sa guérison , il lui survint un abcès à la poitrine , pour avoir changé de climat , dont il mourut. On fit l'ouverture du corps , on trouva une cicatrice variqueuse dans la trachée-artère , à la partie qui avoit été ulcérée à sa première maladie , & une cicatrice calleuse à la partie des poumons qui avoit resté adhérente. Benet ajoute à cette observation , qu'il a guéri plusieurs Phthysies avec la méthode des évaporations , mais il ne donne pas les remèdes dont il a fait usage , il s'en réserve le secret. On a regardé cet Auteur comme un grand Médecin ; n'est-il pas surprenant que dans des maladies aussi dangereuses , où le bras de la Médecine paroît raccourci , il se soit comporté comme se comportent les empiriques de nos jours ; n'est-ce pas être perfide à l'humanité ?

J'ai souvent fait humer , sans inconvénient , à des malades affligés de pulmonie & d'ulcères à la trachée-artère , des vapeurs de plantes calmantes & émollientes ; cependant quelque douces , quelque ménagées qu'elles fussent , elles causoient dans les premiers jours des irritations aux poumons. Instruit par ces effets , je n'en ai jamais hasardé de plus fortes ; je les ai même toujours redoutées. J'ai rapporté l'histoire de la guérison d'un apothicaire pulmonique (a) ; des gens officieux lui conseillèrent , comme il touchoit au moment de sa convalescence , d'inspirer la vapeur du baume du Pérou , avec promesse

(a) Voy. prem. Part. Sect. 2, p. 45.

que sa guérison feroit bientôt parfaite. Le malade suivit aveuglément ce conseil téméraire, il lui en survint le jour même, un crachement de sang très-alarmant, la fièvre en devint plus forte, les crachats plus abondans, & le pus en prit une plus mauvaise qualité.

Dans la Phthisie au second degré, on éprouve souvent des sueurs nocturnes qui ne se manifestent qu'à la poitrine, & qui ne sont point colliquatives. Elles sont un effet de l'engorgement des poumons, par des mucosités ou par des crachats muqueux & gluans. Il est bien intéressant dans cette circonstance de favoriser l'expectoration, de la provoquer & de rendre les sueurs plus générales. On fait prendre à cet effet des boissons délayantes & incisives, des loochs détersifs. Pendant qu'on fait usage de ces remèdes, on doit tenir couvertes pendant la nuit les extrémités inférieures, & les entretenir dans une douce chaleur. Je les ai souvent faites exposer avec succès à la vapeur de plantes aromatiques.

Les purgatifs sont presque toujours nécessaires au premier degré de la pulmonie ; ils le sont moins au second degré, & ils sont toujours dangereux, lorsque les malades sont débilités par la longueur de la maladie ; on ne doit alors en faire usage que quand ils sont exigés par des indications pressantes. Dans ce cas de nécessité, on leur fera prendre le soir, hors le tems de la digestion, un minoratif qui procure le lendemain matin deux ou trois garde-robes ; en les purgeant avec cette précaution, on ne les affoiblit pas.

A R T I C L E I I I.

Méthode curative de la Phthisie pulmonaire au troisieme degré.

Les sueurs nocturnes & les diarrhées colliquatives marquent , dès qu'elles se déclarent , le troisieme degré de la Phthisie pulmonaire , qui est aussi indiqué par le progrès du marasme ; ce sont des symptômes redoutables , effet ordinaire de la dissolution du sang. Dès qu'ils sont établis , ils détruisent les restes de la nutrition animale ; les excréments changent de nature , le sang se décompose de plus en plus , & les solides font des progrès rapides vers la corruption. De là la chute des cheveux , l'œdeme des extrémités , la maigreur , l'atrophie , le délabrement & la destruction de toutes les fonctions animales & vitales : je l'ai déjà observé.

Dans cet état de la Phthisie , on persévère constamment dans l'usage des béchiques proposés dans l'article précédent ; on choisit parmi eux les plus énergiques , on en augmente les doses , on en rapproche les prises & on a recours à tous les moyens que l'art peut suggérer d'après les indications du moment , même aux calmans & aux aromatiques pour modérer la toux & les insomnies ; pour prévenir que le pus des ulcères ne croupisse dans les poumons & n'en augmente le désordre , car les toux violentes s'opposent à l'expectoration ; elle ne devient aisée que quand elles sont modérées. Quand ce sont des crachats trop visqueux , trop épais qui ne cedent

pas à la force de l'expectoration, on fait usage d'une légère décoction de racines d'enula-campana, de buglose, de polipode, &c ; d'infusions de marrube blanc, de paquerette, d'origan, de pouliot, d'hysope, de lierre terrestre, de fleurs de safran, &c. On peut faire infuser ces plantes, pour en rendre l'effet plus énergique dans la décoction de racines choisies dans la même classe ; ces décoctions, ces infusions doivent être très-légères, pour que l'estomac ne soit pas fatigué par leur usage : on y ajoute toujours l'une des deux gommés, l'adragant ou l'arabique. On les édulcore avec le sucre rosat, avec l'oximel simple, supposé qu'il n'y ait pas de disposition à la diarrhée ; dans ce cas, on substituerait au dernier le syrop de vinaigre, à très-petite dose.

Il est d'une égale nécessité de continuer l'usage des vulnéraires détersifs végétaux ; il est toujours précieux pour déterger les ulcères, pour les mondifier, & pour soutenir le ton des fibres membraneuses affoiblies par l'épuisement qui est l'effet constant des suppurations longues & abondantes. On ajoute à ces remèdes, je l'ai déjà observé, des anti-scorbutiques, lorsque la Phthisie provient d'ulcères, & des anti-scrophuleux lorsqu'elle a commencé par des tubercules.

Les baumes sont de puissans détersifs : on l'a vu au chapitre précédent, & au quatrième chapitre de cette section ; ils sont placés au premier rang parmi les vulnéraires ; bien plus, ils sont anti-septiques & très-propres à remplir les indications qui émanent des symptômes de la Phthisie pulmonaire, lorsqu'elle

est parvenue au troisieme degré. On seconde l'effet des baumes par le moyen d'autres anti-septiques, tels que ceux que j'ai déjà indiqués ; ce sont la myrrhe , l'oliban , le sucre , le camphre , &c. Leur usage garantit la masse du sang de la contagion du pus des ulceres , retarde le progrès de la corruption de ce liquide , & donne le tems à la nature de développer ses ressources ; c'est tout ce qu'on peut espérer de l'art de guérir dans des circonstances aussi délicates que scabreuses.

On fait prendre les syrops balsamiques dans des boissons vulnérables ; on peut aussi y dissoudre la myrrhe ; on dissout le camphre avec le jaune d'œuf ou avec le sucre , & on le fait prendre dans les infusions des plantes. On le donne également en pilules ou en bols , c'est même la préparation la plus convenable. Les baumes durs , l'oliban , ne peuvent être ordonnés qu'en pilules ou en opiate ; on fait aussi entrer la myrrhe dans ces compositions. L'aloës seroit nuisible dans les cours de ventre , principalement dans les colliquatifs ; il faut même lui donner l'exclusion dès qu'on s'apperçoit de quelque signe qui puisse les faire soupçonner.

La dose du camphre est de deux grains jusqu'à six , celle de la myrrhe depuis cinq à six grains jusqu'à un demi scrupule , celle de l'oliban est la même. Je n'ordonne jamais l'aloës dans la Phthisie au de-là d'un ou de deux grains , par rapport aux inconvéniens qui pourroient résulter de son usage. Ce sont les moindres doses de ces remèdes , on peut

les faire plus fortes lorsque les indications l'exigent : on les donne seules , ou deux ou trois ensemble , en pilules , en opiates , &c.

Il est malheureux pour l'humanité qu'on n'ait pas découvert de vrai spécifique pour remédier efficacement aux sueurs & aux cours de ventre colliquatifs. Ces symptômes se succèdent ordinairement , il est rare qu'ils aient lieu en même tems , ce qui insinue qu'ils proviennent de la même cause générale qui est sans doute la dissolution du sang. Le même remède pourroit être spécifique pour la guérison de l'un & de l'autre , en retenant , en conservant & en rétablissant l'union & le concours des principes de ce liquide que tout tend à décomposer , à pervertir & à détruire.

L'écorce de cascarille est le remède qui m'ait paru le plus propre à être employé d'après ces indications ; elle modere les sueurs nocturnes & les diarrhées colliquatives , pourvu qu'on en fasse pendant quelques jours un usage constant : il m'a réussi sur-tout dans des sueurs nocturnes qui n'étoient pas invétérées , & les malades ont guéri. Il est des Auteurs qui préfèrent la décoction de cette écorce à sa poudre , & d'autres ont plus de confiance à la poudre qu'à la décoction ; je l'ai employée de l'une & de l'autre façon , toujours avec quelque avantage. La dose de cette écorce en décoction est d'un demi gros jusqu'à un gros , & en poudre depuis douze jusqu'à vingt-quatre grains : on la réitère jusqu'à trois fois par jour.

L'écorce de *simaruba* est regardée comme très-propre à remédier à différens cours de ventre, elle modere les colliquatifs ; je n'en ai pas vu qu'elle ait guéri. Cette écorce provoque les urines, quelquefois elle cause des irritations générales & même des sueurs qui, sans doute, proviennent de ces irritations. Si l'on en fait usage dans les cours de ventre colliquatifs, il faut nécessairement en émulsionner la décoction ; si l'on se sert de la poudre, on ajoutera à chaque prise un quatrieme ou un cinquieme de grain d'opium. La dose du *simaruba* est en décoction, de trois scrupules jusqu'à six, & en substance depuis un scrupule jusqu'à un & demi ; on en fait prendre au moins deux prises par jour.

Le docteur Gaubius a publié à Leyde une dissertation, dans laquelle il annonce qu'il avoit fait l'heureuse découverte d'une racine spécifique pour la guérison des cours de ventre lyentériques & colliquatifs. Il tenoit cette racine d'une personne qui l'avoit apportée des Indes orientales où elle étoit connue sous le nom de *Rais di juan lopes*. Les expériences qu'il en fit lui réussirent parfaitement. Cette racine lui ayant manqué, il s'en procura des Indes, par le moyen d'un de ses amis qui lui apprit qu'elle venoit de *Malaca*. Gaubius renouvela ses expériences, & il céda de ce remède à quelques Médecins pour qu'ils en fissent en même tems que lui. Ces Médecins obtinrent de son usage les succès les plus heureux dans différentes especes de cours de ventre, & principalement dans les colliquatifs des Phthisies

pulmonaires. Un Phtylique entre autres , étoit affligé d'aphtes & d'une diarrhée colliquative qui avoit éludé toutes sortes de remedes, il fit usage de la racine de lopès, la diarrhée s'arrêta & les aphtes se dissipèrent si promptement & si heureusement, que dans huit jours le malade entra en convalescence ; il jouissoit d'une santé parfaite un an après, lorsque Gaubius publia sa dissertation, en 1771.

Les autres Médecins qui avoient fait des expériences sur les propriétés de ce remede, en avoient obtenu des effets surprenans principalement dans les cours de ventre colliquatifs de Phtyriques désespérés qui en avoient été rappelés à la vie. Cette racine a sans doute manqué en Hollande, puisque, je crois, qu'il n'en a pas été fait mention depuis la dissertation de Gaubius : ce seroit un service charitable & bien précieux à l'humanité, que de procurer à l'Europe les avantages d'un remede aussi salutaire.

A R T I C L E I V.

*Signes de convalescence de la Phthisie pulmonaire ;
Moyens propres à seconder la nature pour en perfectionner la guérison.*

A quel degré que soit parvenue la Phthisie pulmonaire, on peut en espérer la guérison si les symptômes se modèrent, si la respiration devient plus libre, si l'appétit se soutient ou se rétablit ; si le pus qu'on expectore devient blanc & égal, si la fièvre diminue, si la chaleur de la peau se rapproche de la chaleur naturelle, si les garde-robes se lient &

deviennent régulières, & si enfin les forces se rétablissent.

On guérissoit des Phthifies pulmonaires déjà du remède d'Arétée ; la convalescence de ces maladies, dit cet Auteur, est indiquée par une toux plus modérée, par une expectoration plus aisée, par des crachats devenus plus humides, par des garde-robes digérées, par des urines abondantes, par un son de voix plus clair & moins embarrassé, par un sommeil plus doux & plus paisible, par la diminution des douleurs de la poitrine, par une respiration plus libre, &c.

Comme la suppuration est le symptôme le plus dangereux de la Phthisie pulmonaire, *Benet* a pris de la qualité du pus les signes qui indiquent la convalescence de cette maladie. Si par les secours de l'art, dit cet Auteur, le pus de différentes couleurs se dépouille de cette variété & n'en conserve qu'une plus naturelle, si de sale il s'épure sensiblement, si d'inégal il devient très-uni ; si de sale il devient insipide, si de puant il devient inodore, si enfin l'expectoration en devient aisée, ce sont autant de signes qui doivent faire espérer une guérison prochaine.

Lorsqu'il se développe de tels signes, au second ou au troisième degré de la Phthisie pulmonaire, & lorsque les symptômes de cette maladie se modèrent successivement, on peut concevoir des espérances de guérison. On doit saisir ces précieuses indications & employer exactement les remèdes les plus propres

à les remplir, en secondant la nature par les ressources éclairées de l'art de guérir.

On donne d'abord l'attention la plus sérieuse au régime de vie, & on évite scrupuleusement de se livrer au goût & aux passions, pour ainsi dire renaissans. On fait autant que les forces le permettent des exercices modérés dans un air libre, propre à l'état des malades. On a l'attention d'éviter également de grandes veilles & un trop long repos. Il est essentiel d'entretenir une douce transpiration, & des évacuations modérées par les voies des urines & par celles des garde-robes ; il est principalement nécessaire de favoriser la liberté de l'expectoration, dans tout le tems de la convalescence. J'ai exposé tous ces moyens dans les différens articles de ce chapitre & dans ceux du chapitre cinquieme de la premiere section de cette partie.

Pour ce qui concerne les remedes pharmaceutiques, on les choisira dans la classe de ceux qui sont les plus propres au caractère de la maladie, & qui auront le plus contribué à conduire les malades à la convalescence. L'usage des eaux Bonnes, de celles de Cauterets, de Bagneres & de Luchon est comme spécifique dans la convalescence de la pulmonie, sur-tout si on les coupe au commencement avec du petit lait ; on peut même les couper avec du lait, lorsque la fièvre étiqye n'a plus lieu & que les malades n'éprouvent plus des sueurs colliquatives, des mouvemens spastiques, des éréthismes phlogistiques, des météorismes dans les entrailles, des

cours de ventre , des hémorragies , &c (a). On finit par rétablir les malades par l'usage du lait , on commence par le couper avec l'eau de chaux seconde , on le prend ensuite pur & sans mélange.

ARTICLE V.

Observations sur la guérison des Phthifies essentielles.

J'ai donné , dans le premier chapitre de la seconde section de la première partie de cet ouvrage , les histoires de sept Phthifies pulmonaires essentielles guéries radicalement. La première provenoit d'un rhume dont on ne fut pas d'abord alarmé , on le prenoit pour un rhume ordinaire ; cependant c'étoit une vraie toux phthisique , on en prit quelque inquiétude au second degré de la maladie. On m'appela enfin au secours du malade. Je trouvai le pouls fréquent , fébrile , embarrassé ; la peau étoit sèche , la chaleur mordicante & la respiration gênée ; le pus des crachats étoit sale & grisâtre. Je fis faire une saignée , je mis le malade à l'usage du petit lait & d'une infusion de fleurs béchiques édulcorée avec le syrop de capillaire. On entretenoit la liberté du ventre par le moyen de lavemens émolliens ; la respiration restoit encore gênée , malgré ces usages ; Je fis tirer six onces de sang , elle devint plus libre. La langue étoit chargée d'un limon bilieux , je fis prendre tous les matins pendant trois jours deux onces de casse dans le petit lait ; j'en vins ensuite à une infusion de plantes vulnérables diaphorétiques ,

(a) Voy. seconde Part. Sect. 1. Ch. 6.

édulcorée avec le syrop d'érysimum. Malgré ces secours la toux étoit quinteuse ; je la modérois en faisant prendre le soir à l'heure du sommeil une légère émulsion avec quelques amandes douces , la semence de pavot blanc & les pignons doux ; on l'édulcoroit avec le sucre rosat. Lorsque le malade n'avoit pas assez de sommeil , j'y ajoutois une demi-once ou fix gros de syrop de diacode. Après trois semaines ou environ de ces usages , je faisois prendre tous les matins dans le premier verre de tisane une cuillerée à café de syrop balsamique de Tolu , que je réitérois à midi & le soir ; j'en augmentai la dose jusqu'à une cuillerée à bouche. Outre ces remedes le malade prenoit tous les matins un bol composé de six grains de myrrhe en poudre , de deux grains de camphre & d'un quatrieme de grain d'opium , incorporés avec la conserve de roses. Après quelque tems de ces usages , la vivacité de la toux & sa fréquence diminuerent , le pus des crachats devenoit sensiblement plus blanc. Je substituai alors aux infusions diaphorétiques de légères décoctions de plantes vulnéraires légèrement astringentes , édulcorées avec le sucre rosat ; j'y ajoutois trois fois par jour le syrop balsamique de Tolu. La fièvre , la maigreur & la quantité du pus diminuoient à vue , & ce dernier prenoit de jour en jour la qualité d'un bon pus : l'expectoration devenoit de plus en plus aisée. Lorsque la fièvre fut totalement tombée , & qu'il n'y eut presque plus d'apparence de pus , je mis le malade au seul usage d'une infusion de marrube blanc

blanc édulcorée avec du sucre ordinaire, que par reconnoissance il continua pendant très-long-tems après sa parfaite guérison, qui date aujourd'hui de plus de quatorze ans.

Le malade de la seconde observation étoit, lorsqu'il m'appela, au cinquieme mois & au dernier degré d'une Phthisie provenant d'érosion des vaisseaux des poumons; les Médecins qui le voyoient & le Public avoient désespéré de son état, mais la nature développa ses ressources; les secours de l'Art la seconderent; il guérit & jouit depuis près de douze ans de la santé la plus parfaite.

La fièvre étoit considérable, la toux fréquente & souvent quinteuse; les crachats du matin ne présentoient qu'un pus sale & fétide; le marasme faisoit des progrès au point que je perdis d'abord toute espérance de guérison. Je portai ma première attention à calmer la toux, à modérer la fièvre, à adoucir & à tempérer l'âcreté des humeurs d'où provenoient la phlogose des poumons, les érosions & les ulceres de ce viscere. J'employai à cet effet le petit lait, des infusions de fleurs & des décoctions de plantes émollientes & béchiques, édulcorées avec le sucre rosat. Je faisois prendre plusieurs fois dans la journée, & tous les soirs aux heures du sommeil des émulsions légères avec les semences de concombre, de melon, de pavot blanc & de pignons doux, adoucies avec le sirop de guimauve; j'y ajoutois presque tous les soirs une dose modérée de sirop de diacodé, ou de celui de karabé. La

nourriture étoit de bouillons faits avec le poulet ou le veau & des navets. On donnoit fréquemment des lavemens émolliens , plutôt pour servir de bains intérieurs , que pour purger. La toux & les symptômes phlogistiques se modérèrent par ces moyens , la fièvre diminua considérablement , & le pus en devint moins sale & moins fétide.

Après environ trois semaines de ces usages , je fis prendre deux bouillons par jour , composés de grenouilles & de plantes vulnérables telles que la pulmonaire , la bugle , la fanicle , la verge d'or , &c. j'y faisois infuser de l'oseille & du creffon de fontaine pour servir d'anti-septiques. Le malade fit usage en même tems pour boisson ordinaire , d'une infusion de millefeuille légèrement émulsionnée , avec la semence de pavot blanc & les pignons doux ; j'y ajoutois le mucilage de gomme adragant. Trois fois par jour , le matin , à midi & le soir , ce malade prenoit une cuillerée à café de sirop balsamique de tolu , & par-dessus un verre de la tisane émulsionnée. Lorsque des indications pressantes exigeoient des purgatifs , on n'employoit que la casse , la manne , ou bien les sirops de chicorée ou de pommes composés.

L'usage de ces remèdes continué pendant plus de trois mois , dissipa insensiblement tous les symptômes de la maladie & remédia radicalement à ses causes ; il s'ensuivit une guérison parfaite , malgré l'imprudence que l'on avoit commise d'exposer le malade à la vapeur du baume du Pérou qui renou-

vella le crachement de sang , augmenta la toux & les autres symptômes , comme je l'ai rapporté dans le deuxieme article de ce Chapitre.

La malade de la troisieme observation avoit naturellement la poitrine foible & irritable , fruit ordinaire d'une éducation physique , trop recherchée , molle & délicate. Son tempérament étoit cependant vif & sanguin ; elle étoit fatiguée d'une toux violente , sur-tout pendant la nuit , & d'inquiétudes insupportables dans le corps & dans les extrémités ; elle avoit d'ailleurs des hémoptysies assez fréquentes. Elle me consulta de sa province ; je lui conseillai de se faire saigner de tems en tems , principalement si ses secours périodiques étoient retardés ou irréguliers , de prendre trois bains domestiques toutes les semaines , chargés d'une décoction émolliente , & de boire tous les matins une chopine ou trois demi-fetiers d'eaux minérales de Seltz , coupées avec une égale quantité de petit lait : les eaux minérales de Saint-Myon n'étoient point encore connues à Paris. Ce fut après deux mois de ces usages , que la malade vint dans cette Capitale ; elle se plaignoit encore des mêmes symptômes , qui cependant se modéroient de jour en jour. Je lui fis prendre un bain tous les matins , chargé de deux pintes de lait ; on les suspendoit pendant peu de jours , lorsqu'elle se trouvoit fatiguée. En sortant du bain , elle se reposoit dans son lit pendant deux heures , & prenoit en différens tems trois ou quatre tasses d'infusion en guise de thé , de fleurs de tussilage & de

pié-de-chat , édulcorée avec du sucre ; elle prenoit également cette infusion dans son lit les jours où elle ne se baignoit pas. La boisson ordinaire dans la journée étoit une infusion de fleurs de bouillon blanc & de mauve , émulsionnée très-légèrement avec des amandes douces & des pignons doux ; on l'édulcoroit avec le sucre. Tous les soirs , aux heures du sommeil , hors le tems de la digestion , Madame prenoit une demi-once de sirop de karabé , dans un verre de sa tisane ordinaire. Nonobstant ces remedes , je faisois tirer trois ou quatre onces de sang , huit ou dix jours avant le retour des regles , pour prévenir les hémoptysies , ce qui étoit d'autant plus nécessaire , qu'elles auroient renouvelé & perpétué la maladie & ses symptômes. La malade ne se nourrissoit que de bouillons & de soupes aux légumes potagers , de crêmes de semences & d'autres substances farineuses ; de fruits doux bien conditionnés , d'œufs frais , du poisson léger , & rarement d'un peu de volaille à son dîné. Tous les symptômes de la maladie diminuerent par ces usages ; ils étoient très-supportables après que la malade eût fait deux mois de séjour à Paris. Le pus des crachats étoit devenu blanc & net , de sale qu'il étoit auparavant ; il paroissoit avoir pris la qualité d'un bon pus. Comme dans ce tems-là la malade fut obligée de se retirer dans sa Province , elle continua la même boisson , & le soir son narcotique ordinaire. Elle prenoit d'ailleurs trois fois par jour , le matin , à midi & le soir , trois ou

quatre gouttes chaque fois de baume blanc du Canada, incorporé avec du sucre rosat, & buvoit par-dessus deux tasses d'infusion de sommités de grande consoude édulcorées avec le sucre. Sa santé se rétablit totalement par un long usage de ces remèdes qu'elle observa avec une exactitude & une constance peu ordinaires.

La vie dérégulée de la malade de la quatrième observation, les abus qu'elle avoit commis dans le régime de vie, ses passions, ses excès l'avoient conduite & plongée dans le triste état où elle étoit réduite. La peau étoit sèche, brûlante, la toux fréquente & très-importune; les crachats peu abondans, le pus de mauvais caractère, &c. Les crachats qu'elle avoit rendus dans ses premiers rhumes, n'avoient pris leur teinte sanguinolente que par un suintement de sang, au lieu que celui qu'elle avoit rendu dans son dernier accident, provenoit de la rupture de quelque vaisseau sanguin; malgré cette hémorragie, le pouls étoit plein, embarrassé & irrégulier, ce qui me déterminâ dès ma première visite à faire une saignée de quatre onces. Le lendemain on ouvrit un cautère au bras; le sur-lendemain de la première saignée, on en fit une seconde également ménagée, parce que les indications subsistoient les mêmes.

Dès les premiers jours la malade fit usage d'une infusion de fleurs béchiques édulcorée avec l'oximel simple. Tous les soirs elle prenoit une émulsion légère, à laquelle on ajoutoit le sirop de karabé. Malgré ces remèdes, la peau étoit toujours sèche & brûlante.

J'eus recours à un bain domestique chargé d'une décoction de plantes émollientes ; ce bain ne l'ayant pas affoiblie , elle en prit un autre le lendemain ; après celui-ci , la peau parut se ramollir ; elle en prit un troisième deux jours après , il s'établit une douce transpiration , & la violence de la toux se modéra. J'ajoutai alors les fleurs de sureau aux infusions béchiques , la transpiration devint plus marquée & l'expectoration moins difficile. Le tems des regles arriva , elles ne firent que marquer , la douleur de poitrine augmentoit ; je fis ouvrir la veine à la molléole , on tira environ quatre onces de sang ; trois ou quatre heures après l'écoulement se rétablit , il fut très-peu abondant , mais il l'étoit assez selon l'état de la malade. On continua la tisane & les calmans , tous les symptômes se modérèrent , & la maigreur ne paroissoit pas faire de progrès : il commençoit cependant à s'établir des exacerbations de la fièvre étiq̃ue , elles étoient annoncées tous les jours vers les quatre heures après midi par de petits frissons qui étoient suivis d'une chaleur assez vive , d'une toux plus fréquente & d'une expectoration moins aisée. J'eus recours à des décoctions de plantes savonneuses & vulnéraires astringentes , qu'on émulsionnoit légèrement avec la semence de pavot blanc & les pignons doux ; on y ajoutoit le soir le syrop de karabé.

Comme la malade étoit constipée elle faisoit usage de lavemens simples , de deux jours l'un. Lorsqu'il se présentoit quelque indication qui exigeât des

purgatifs , elle prenoit le soir une once & demie de casse mondée , qui procuroit le lendemain deux ou trois garderobes , qui , bien loin de la fatiguer , la soulageoient considérablement. Le tems des regles arriva pour la deuxieme fois , elles ne marquerent point ; je fis appliquer quatre sangsues à la vulve , vers l'orifice du vagin , je bornai l'évacuation à trois onces de sang. Quelques heures après il en coula , par les voies ordinaires , environ une once dans l'espace de vingt-quatre heures. On continua l'usage des remedes précédens ; on ajoutoit à toutes les boissons le mucilage de gomme adragant. Je m'aperçus qu'il s'établissoit des moiteurs pendant le sommeil de la nuit ; je joignis à l'usage de ces remedes , celui de bols composés , pour une prise , de cachou , de cascarille , de chaque douze grains ; de myrrhe , six grains ; de baume blanc du Canada , trois gouttes , avec le sirop d'épine-vinette. La malade prenoit ces bols deux fois par jour , le matin & le soir , & buvoit par-dessus deux tasses d'infusion de marrube blanc , édulcorée avec le sucre rosat.

Les regles manquoient pour la troisieme fois ; j'eus recours à l'application des sangsues à la vulve , on ne tira qu'environ deux onces de sang qui n'étoit point coloré ; l'écoulement naturel ne fut ensuite marqué que par une tache. Je n'hésitai pas , d'après ces indications , de faire prendre par-dessus les bols dans l'infusion de marrube , trois onces de suc épuré de parties égales de chicorée sauvage , de cresson

de fontaine & d'oseille , avec le sucre rosat. On continua l'usage de ces remedes pendant long-tems ; tous les symptômes de la maladie se mitigèrent , diminuèrent & se dissipèrent insensiblement. On appliquoit les sangsues à la vulve , à toutes les époques des regles , jusqu'à ce qu'elles revinrent naturellement ; on finit la convalescence par l'usage du lait de vache , coupé avec l'eau de chaux seconde.

La Phthisie du malade de la cinquieme observation étoit tuberculeuse ; elle avoit commencé par une toux seche très-médiocre , qui avoit fait des progrès , à proportion de ceux des tubercules qui suppurerent enfin , sans qu'on s'apperçût d'aucun crachat sanguinolent. La prompte guérison de cette maladie , qui fut radicale , me fit croire qu'il n'y avoit qu'un seul tubercule de suppuré ; s'il y en avoit d'autres , ils guérissent par le moyen des mêmes remedes , puisqu'on ne s'est apperçu d'aucun signe qui ait pu faire présumer que la poitrine restât affectée d'aucun vice local.

Le malade fit d'abord usage d'une tisane composée de plantes apéritives , béchiques & vulnéraires , édulcorée avec le miel de Narbonne ; il buvoit à ses repas d'une infusion d'esquine rapée. Il prennoit en même tems trois fois le jour , le matin , à midi & le soir , un demi gros d'un opiat composé de gomme ammoniac , de sagapenum , d'extraits d'aunée , de chardon bénit , de chaque deux gros , avec suffisante quantité de sirop balsamique de tolu. Il buvoit par-dessus chaque prise de cet opiat deux tasses à

thé d'infusion de marrube blanc , édulcorée avec du sirop d'érysimum.

Tous les symptômes de la maladie se modérèrent bientôt , & ils se dissipèrent insensiblement par le seul usage de ces remèdes : les eaux bonnes que le malade prit ensuite tous les matins , coupées avec parties égales de petit lait , accomplirent sa guérison.

Le malade de la sixième observation étoit d'une foiblesse extrême , & il crachoit difficilement. Je le mis d'abord à l'usage de cinq grains de myrrhe , incorporés avec gros comme une noisette de conserve de roses ; il en prenoit trois prises par jour , le matin , à midi & le soir ; il buvoit par-dessus environ cinq onces d'infusion de pouliot & de scordium édulcorée avec le sirop de marrube blanc. Dans les intervalles de cette infusion , il prenoit par cuillérées d'un looch composé de six onces d'infusion de fleurs pectorales , dans laquelle on dissolvoit un demi-gros de mucilage de gomme adragant , une once de sirop d'althéa de fernel , & autant de celui de pié-de-chat. La foiblesse n'empira pas pendant ces usages , elle diminuoit au contraire ; la liberté de l'expectoration se rétablit , & le pus prenoit de jour en jour une meilleure qualité. Le malade continua l'usage de la myrrhe & de la conserve de roses à l'ordinaire ; il buvoit par-dessus , au lieu de l'infusion de pouliot & de scordium , une légère décoction de pulmonaire , de bugle & de fanicle , dans laquelle on faisoit infuser à chaud quelques tiges de cresson de fontaine ; on édulcoroit

cette boisson avec le sirop de tussilage. La tisane ordinaire étoit une décoction d'orge. Depuis le commencement de cette méthode curative jusqu'à la fin, le malade prit le soir, tous les douze jours, deux onces de manne, ensuite deux onces & demie, & enfin trois onces lorsque ses forces furent rétablies : ces usages le conduisirent à une guérison parfaite.

La Phthisie de la septieme observation qui étoit très-avancée dans le second degré, lorsque je vis le malade pour la premiere fois, dépendoit sans doute dès son origine, d'ulceres aux poumons, puisque les crachats étoient de tems en tems sangui-nolens. Je le mis à l'usage d'une légère décoction de *ruta muraria* & de verge d'or, dans laquelle on faisoit infuser quelques fleurs béchiques ; on l'édulcoroit avec le miel de Narbonne. Le fixieme jour de cet usage il prit le soir deux onces de manne qui lui procurèrent le lendemain trois garde-robres bilieuses. Comme la toux étoit très-importune pendant la nuit, je lui faisois prendre tous les soirs aux heures du sommeil une demi-once de syrop de diacode & trois gros de syrop balsamique de Tolu, dans une tasse d'infusion de fleurs de nénuphar ; ce remede modéroit la toux & procuroit un sommeil assez tranquille. Malgré ces secours employés assidûment, je m'apperçus que le malade étoit menacé de sueurs nocturnes, je lui fis reprendre de la manne & je le mis à l'usage d'un opiat composé d'une once de conserve de cynorrhodon, de deux gros de cascarille, de trois gros de gomme arabique, de

trois gros de cachou ; de vingt grains de camphre & d'un demi gros d'oliban , avec le fyrop balsamique de Tolu. Il prenoit trois fois le jour de cet opiat , le matin , à midi & le soir , à la dose chaque fois de deux scrupules , & par-dessus chaque prise deux tassés d'infusion de mille-feuille édulcorée avec le fyrop du chantre. J'ajoutai le bécabunga en infusion à la décoction de ruta muraria & de verge d'or que j'émulsionnai avec les amandes douces & les pignons doux. Comme il est très-ordinaire qu'il succede des cours de ventre aux sueurs colliquatives , je fis supprimer le miel dont on se servoit pour édulcorer les décoctions du *ruta muraria* , &c. on lui substitua le fyrop de velar. La boisson ordinaire étoit une tisane d'orge mondé , dans laquelle on faisoit infuser des fleurs béchiques. Tous les symptômes de cette maladie se mitigèrent par le moyen de ces remedes , & ils se dissipèrent totalement pendant le second mois de leur usage ; au commencement du troisieme le malade entra en convalescence , sa santé depuis ce tems-là est aussi parfaite qu'on puisse le desirer.

CHAPITRE II.

Méthode préservative & curative de la Phthisie pulmonaire héréditaire.

LA Phthisie pulmonaire héréditaire conserve chez les enfans pendant quelques générations le même caractère qu'elle avoit chez leurs peres ; si chez

ceux-ci elle provenoit de principes scorbutiques , rachitiques , scrophuleux , vénériens , &c. elle est la même chez les autres , & ne peut être guérie que par des remèdes indiqués par la nature de celles de ces causes qui est le principe de la maladie. C'est une règle générale qu'on doit observer scrupuleusement dans la méthode curative de la Phthisie héréditaire , sans négliger de remplir les indications particulières que l'on doit prendre de la variété de ses symptômes. J'ai donné assez d'étendue à ces moyens dans le chapitre précédent , pour me dispenser de me répéter dans celui-ci.

C'est par un préjugé faux & dangereux que l'on s'est presque généralement prévenu que l'on ne guérit point de la Phthisie héréditaire ; j'ai rapporté (a) des observations d'Auteurs célèbres qui démontrent évidemment le contraire. Ces observations ont été faites par Cardan , Burnet , Lassiùs , Chesneau , Hoffman , Boerrhaawe , Wan-Swiéten , &c. J'en ai donné moi-même (b), je me bornerai , pour ne pas être trop prolix , à la méthode curative de la suivante.

Mademoiselle de la S... étoit née d'une mère pulmonique , on a vu l'histoire de sa maladie dans le second chapitre de la deuxième section de cet ouvrage ; elle guérit par le moyen de la saignée , par des purgatifs très-ménagés , par l'usage d'infusions de plantes diaphorétiques , de fleurs béchiques ,

(a) Première Partie , Sect. 2. Ch. 2.

(b) *Ibid.* & dans mon livre d'observation de Médecine.

édulcorées avec le sucre rosat. Elle prit en même tems des bouillons de grenouilles, avec la pulmonaire, le lierre terrestre, la fanicle & les sommités de grande consoude. On calmoit la toux de la nuit qui étoit fréquente & quinteuse, avec des doses très-modérées de syrop de karabé dans une émulsion composée de semence de pavot blanc & de pignons doux, on y ajoutoit la gomme arabique, & on finissoit de l'édulcorer avec quelque syrop béchique. La tisane ordinaire étoit composée de jujubes, de febestes & de figues grasses ; on y ajoutoit le mucilage de gomme adragant. La malade guérit par l'usage de ces remedes, avant que la Phthisie ne fût parvenue au troisième degré.

On prévient aussi la Phthisie héréditaire ; j'ai rapporté plusieurs exemples qui le confirment (a), leur fidélité est garantie par les Auteurs célèbres qui en ont donné les observations. J'en ai fait moi-même plusieurs qui n'ont pas été moins heureuses que celles de ces savans Maîtres de l'art de guérir ; la suivante en est une preuve non équivoque.

Madame la C... de ... est née d'une mere scorbutique ; les accidens ordinaires dans cette maladie avoient été retardés par une suppuration qui s'étoit établie à l'une des jambes. Deux mois ou environ après sa couche, l'ulcere se cicatrifa ; la cicatrice étoit de mauvais caractère. La Dame fut prise peu de tems après d'une toux Phthisique, la pulmonie se déclara, bientôt le marasme s'ensuivit avec les

symptômes les plus alarmans. Je fus appelé quatre jours avant sa mort ; elle finit dans la langueur , & dans des souffrances peu ordinaires dans cette maladie.

L'enfant étoit délicate , on eut peine à l'élever ; elle eut la petite vérole au couvent , vers l'âge de douze ans , il ne lui resta pas d'incommodité qu'on pût rapporter à cette maladie. Les parens de cette Demoiselle , fille unique d'une famille noble & respectable , la retirèrent auprès d'eux vers la quatorzième année de son âge : je commençai alors à lui donner mes soins , & depuis ce moment je ne l'ai pas perdue de vue. Cette fille chérie étoit d'un embonpoint médiocre , mais d'une grande délicatesse : elle prenoit souvent des rhumes & des fièvres qui n'étoient pas de durée. Sa respiration étoit gênée , elle lui manquoit dès qu'elle faisoit quelque exercice suivi , ce qui la forçoit de se reposer , même dans des promenades très-modérées. J'attribuai ces incommodités à la délicatesse de la Demoiselle , & à la cause scorbutique qui avoit tranché les jours de madame sa mere.

Je la mis à l'usage tous les matins , de deux ou trois tasses d'une légère infusion de petite sauge & de cresson de fontaine , coupée avec environ une quatrième partie de lait de chevre , qu'on édulcoroit avec le sucre ; on la nourrissoit de soupes aux herbes , de légumes potagers & de fruits de la saison , des mieux conditionnés. On ne lui permettoit que très-peu de viande , de poisson léger , ou d'œufs

frais. Elle prenoit pendant quinze jours dans le printems, l'été & l'automne de chaque année, des sucs de plantes chicoracées & anti-scorbutiques, adoucis avec le syrop d'écorce d'orange : on la préparoit à cet usage par des aposemes laxatifs. Elle faisoit constamment tous les jours des exercices modérés, à un air libre, autant qu'il étoit possible, ou que le tems le permettoit.

Les rhumes & les fievres qui étoient fréquens s'éloignerent & diminuerent insensiblement par le moyen de ces secours, le tempérament se fortifia de plus en plus ; la Demoiselle se maria à l'âge de vingt-deux ans. Dans l'année de son mariage elle devint enceinte ; la grossesse & l'accouchement furent laborieux & la couche très-malheureuse. La fièvre de lait fut prolongée, elle dégénéra en une espece de fièvre lente nerveuse ; il survint des pertes rouges qui furent suivies d'une débilité effrayante. Au moindre mouvement que la malade faisoit, ne fût-ce qu'en remuant la tête sur le chevet de son lit, elle étoit prise de spasmes & de foiblesses qui approchoient de la syncope, & dont la fréquence & la durée faisoient craindre pour ses jours.

Tous les moyens que j'avois employés pour remédier à ces symptômes ayant été impuissans, j'eus enfin recours au cachou ; la malade en prenoit cinq à six tasses par jour, préparé en guise de café. Ce remede dissipa son dégoût pour les alimens, ses digestions devenoient meilleures de jour en jour, ses forces faisoient sensiblement des progrès, & sa santé

se rétablit parfaitement après une longue convalescence. Malgré le bien-être où se trouvoit Madame la C... de ... elle continua pendant quelque tems l'usage du cachou qui lui avoit été si salutaire pendant sa maladie ; elle a eu depuis trois grossesses dont elle a soutenu courageusement les dégoûts ; ses couches ont été heureuses , & aujourd'hui la mere & ses quatre enfans jouissent d'une santé parfaite.

On voit par cet exemple que l'on peut préserver les enfans de la succession héréditaire de la pulmonie scorbutique en faisant usage , avant que cette maladie ne se déclare chez eux , du régime de vie & des remèdes les plus propres à la prévenir. Il en sera de même des autres maladies héréditaires qui auront pour principe des vices scorbutiques , dartreux , érysypellateux , psoriques , vénériens , &c. en observant le régime de vie convenable , & en faisant à propos , avec connoissance de cause , les remèdes indiqués par le caractère propre à chacune de ces maladies.

J'ai observé que les maladies héréditaires dégénèrent avec le tems ; on ne doit pas excepter les pulmonies de cette règle générale , quand on n'a pas eu le bonheur d'en borner la succession. Alors on les traite selon le caractère qu'elles ont pris en dégénérant. Ces Phthysies sont symptomatiques & plus difficiles à prévenir chez les enfans des peres qui en ont été affligés , qu'elles ne le seroient , si elles étoient essentielles ; cependant il n'est pas impossible d'en préserver ,

préserver , en faisant usage à propos du régime de vie & des remèdes propres à leur nature.

Il est des Phthifies pulmonaires héréditaires qui dépendent d'un tempérament sanguin & pléthorique devenu général dans les familles ; on prévient cette maladie en préservant d'hémorrhagies, par l'usage de la saignée , qu'on réitere de tems en tems , principalement depuis l'âge de dix - sept jusqu'à celui de trente-sept ans , tems auquel Hippocrate a borné la succession des maladies héréditaires. On seconde l'effet de la saignée par le régime de vie & des exercices modérés. Boerrhaawe a préservé par de tels moyens des Phthifies héréditaires dont on étoit déjà menacé.

C H A P I T R E I I I .

Méthode préservative & curative de la Phthisie pulmonaire , prise par contagion.

LA Phthisie pulmonaire est contagieuse ; j'ai donné des observations qui le confirment (a) ; elle se communique aux personnes saines par la transpiration cutanée des malades ou par la pulmonaire. Cette matiere transpirable sort d'un foyer de corruption qui la rend fétide & septique. Elle pénètre dans le corps & dans les viscères des personnes saines , par les pores absorbans de la peau & par l'inspiration de l'air de l'atmosphère qui environne le malade.

(a) premiere Partie, Section 2. Chap. 3.

Elle se fixe principalement dans les poumons, par l'effet de l'analogisme des substances animales de la même espèce, y fait des plaies mortelles, & y établit le principe des symptômes effrayans d'une maladie souvent funeste.

Cet effet de la Phthisie pulmonaire contagieuse peut être prévu; il n'est pas impossible d'en garantir. Lorsque cette maladie est établie elle est susceptible de guérison, pourvu que l'on fasse usage à propos des secours propres à dissiper ses causes, à modérer, à arrêter le progrès du mal & à y remédier par des moyens efficaces, dictés par l'observation.

Les exhalaisons des corps des pulmoniques, principalement celles de la poitrine que l'on rend par le mécanisme de la respiration, sont corrompues, fétides & septiques à différens degrés; elles sont de nature alkaline. Des exhalaisons de cette nature étant répandues dans l'atmosphère peuvent être neutralisées par le mélange de vapeurs antiseptiques acides. Cette combinaison rend les premières moins capables de faire dans les poumons des impressions septiques. Tous les acides, tant végétaux que minéraux, sont propres à produire cet effet. On doit préférer les végétaux, tels que celui du vinaigre dont les vapeurs s'élèvent dans l'atmosphère. On répand du vinaigre sur une pêle rougie au feu, ou sur des charbons ardents. Il faut prendre garde en faisant cette opération, que les vapeurs qui s'exhalent du vinaigre, ne soient pas trop abondantes & qu'elles n'excèdent point, ou

n'excèdent que le moins possible ce qu'il en faut pour neutraliser les exhalaisons alkales émanées des corps des malades : l'excédent des premières conserveroit leur qualité acide , porteroit à la gorge , exciteroit la toux & causeroit des hémorrhagies qu'il est essentiel d'éviter dans cet état de détresse. On répand encore plus utilement dans l'atmosphère de la chambre des malades, par le moyen d'un aspersoir, de l'eau commune acidulée avec l'huile de vitriol. On peut même par ce moyen neutraliser l'air infect des salles des hôpitaux, celui des cuisines & des lieux qui rendent des exhalaisons méphitiques ; dans ce dernier cas on y répand beaucoup d'eau ; une livre d'huile qui ne coûte que quatorze sous , suffit pour en rendre un nombre de seaux antiméphitiques : on réitère l'opération à proportion de l'abondance des matieres que l'on veut neutraliser.

Comme à chaque respiration des pulmoniques, il s'évapore de leur poitrine des exhalaisons pûtrides & septiques, il seroit difficile de les neutraliser totalement & dans l'instant par l'évaporation du vinaigre ou par l'aspersion de l'eau acidulée avec l'huile de vitriol. Il est essentiel dans cette circonstance épineuse d'avoir recours à des anti-septiques pris intérieurement, pour seconder l'effet des vapeurs & des exhalaisons acides, pour garantir la masse du sang des exhalaisons pûtrides qu'on inspire lorsqu'on communique avec l'atmosphère des malades. A cet effet on fait usage de limonade cuite, de suc de citron édulcoré avec le sucre, d'infusions d'oseille, d'alléluya, de

conserves de groseille, d'épine vinette, de roses. On peut aussi avoir recours à des pilules ou à des bols composés, pour une prise, de quatre ou cinq grains d'oliban, de trois de camphre & d'un d'aloës foccotrin avec le syrop d'écorce d'orange; on peut y ajouter, pour leur donner de la consistance, quelques grains de poudre de petite sauge; on les prend deux fois par jour, le matin à jeun & l'après midi, ou le soir hors le tems de la digestion. On boit par-dessus chaque prise une tasse ou deux d'infusion de menthe de jardin, faite en guise de thé; on l'édulcore avec le sucre rosat.

Pendant l'usage de ces préservatifs on doit se purger de tems en tems, en forme d'aposeme. J'ai tenu dans ces usages des hommes & des femmes qui avoient lieu de craindre de contracter des phthysies contagieuses, qui en ont été heureusement garantis.

Si malgré ces moyens de se garantir de la Phthysie pulmonaire, ou faute d'en faire usage, il se démontre quelque signe qui indique que des exhalaisons septiques font impression sur la substance des poumons, on a recours à la saignée de l'un des bras; on la réitère deux ou trois jours après, pour peu que le malade soit pléthorique, sur-tout si la pléthore est sanguine. On donne un vomitif, s'il paroît quelque dérangement dans l'ordre des digestions, on purge de tems en tems & on fait prendre tous les matins une pinte de petit lait, dans lequel on fait infuser quelque plante choisie dans la classe des diaphorétiques. Les après-midi & la nuit, hors le

tems de la digestion & du sommeil, on fait boire copieusement d'une tisane d'orge ou d'avoine dans laquelle on fait infuser des fleurs pectorales, on l'édulcore avec le sucre rosat. Pour peu que le malade ait des insomnies ou qu'il soit tracassé par la toux, on lui fait prendre une demi-once de syrop de pavot blanc ou de celui de karabé, on peut augmenter la dose de ces syrops jusqu'à une once, si les circonstances l'exigent.

Si les symptômes de la maladie ne cedent pas à l'usage de ces remedes, on donne pour tisane ordinaire une légère décoction de false-pareille, d'esquine ou de saffras.

Si après quelque tems de ces usages, la Phthisie fait des progrès, on renonce aux tisanes diaphorétiques; on leur substitue des infusions, des décoctions, des bouillons de plantes vulnéraires toniques; on a recours en même tems à des antiseptiques, à des sirops balsamiques, à des loochs béchiques, calmans, &c. On fait usage de ces remedes dans l'ordre déjà établi au Chapitre second de la deuxieme Section de cette Partie.

La garde-malade, qui prit une Phthisie contagieuse pour n'avoir pas quitté la femme d'un Conseiller à la Cour des Aides de Montpellier, morte de cette maladie, guérit par le secours de Riviere; le même Auteur rapporte l'observation suivante (a).

Une femme de vingt-deux ans avoit donné le sein à l'Abbé de S. Paul qui mourut phthistique; peu de

(a) Premiere Partie, Sect. 2. Chap. 3.

tems après , la nourrice subit le même sort. Sa sœur, âgée de quinze ans , qui n'étoit pas encore réglée , prit d'elle la même maladie ; elle avoit une fièvre étiq̃ue depuis trois semaines , lorsque Riviere lui fit la premiere visite ; elle avoit d'ailleurs une toux & une insomnie presque continuelles , une difficulté de respirer & un dégoût considérables ; la maigreur étoit déjà extrême. Cet Auteur la purgea d'abord avec la manne & le sirop de roses pâles dans une décoction pectorale ; le lendemain il fit ouvrir deux cauterés à la partie postérieure du cou. Il fit prendre ensuite des bouillons composés avec la racine d'esquine , les feuilles de buglose , de tussilage & de pulmonaire , que de tems en tems on rendoit purgatifs. La malade uſoit de conserve de roses rouges , & prenoit souvent pendant la nuit de sirops de violettes , de roses seches & de pavot , parties égales ; elle guérit par l'usage de ces seuls remèdes.

J'ai rapporté dans le même Chapitre , d'après Cheſneau , l'observation suivante. Un Gentilhomme âgé de 25 ans , avoit contracté de sa femme une Phthisie pulmonaire ; elle étoit déjà au second degré lorsque ce Médecin fut appelé : il le guérit par le moyen de la méthode suivante.

Le malade fut d'abord purgé avec une infusion de trois gros de ſéné & d'un gros d'agaric dans une décoction de plantes vulnérables , à laquelle on ajouta une once de manne de Calabre. Après cette purgation , il fut saigné de la céphalique ; on lui tira six onces de sang ; il commença ensuite l'usage

de la décoction suivante pour boisson ordinaire. Prenez deux onces d'esquine, coupée par morceaux, faites-la infuser pendant la nuit dans six livres d'eau de fontaine, ajoutez-y le lendemain de la pulmonaire, faites-en une décoction sur un feu lent, édulcorez, après l'avoir passée, avec deux onces de sucre & deux gros de canelle. Le malade prenoit pour béchique du sirop de pulmonaire, & l'on mettoit dans ses bouillons des feuilles de cette plante; l'usage de ces remèdes le conduisit à la convalescence; il se rétablit ensuite totalement, par le lait d'ânesse, qui le mit à l'abri de rechute.

J'ai donné dans le même Chapitre l'histoire de la Phthisie pulmonaire, d'un Abbé qui l'avoit prise par contagion d'une Dame qui étoit morte de cette maladie, en jouant tous les jours au piquet, sur une petite table vis-à-vis l'un de l'autre. D'abord que je m'aperçus du caractère de la toux qui étoit phthifique, je le fis saigner de l'un des bras, & vomir le lendemain avec vingt-quatre grains d'ipécacuanha. Le surlendemain je le purgeai avec une infusion de folicules de fené & la manne. Après la purgation je le mis à l'usage d'une décoction d'esquine & de santal citrin, dans laquelle on faisoit infuser de l'origan & des sommités fleuries de millepertuis, qu'on édulcoroit avec le miel de Narbonne. Je faisois prendre trois fois le jour immédiatement avant une prise de cette décoction, des bols composés de gomme adragant, huit grains de camphre, trois grains d'aloës soccotrin, & trois

gouttes de baume blanc du Canada, le tout incorporé avec la conserve de roses, pour une prise. Le malade buvoit toutes les quatre heures, cinq onces de cette décoction. La tisane ordinaire étoit avec l'orge mondé; on y faisoit infuser des feuilles de *ruta muraria*; on l'édulcoroit avec du sucre.

Vers le quinzième jour de cet usage, le malade se plaignit de quelque légère douleur d'entrailles, qui lui procuroit une ou deux garderobes, ces douleurs étoient assez fréquentes; je supprimai le miel de la décoction, & l'aloës des bols, en substituant au miel le sirop d'érysimum. On ajoutoit aux bols du soir trois ou quatre grains de pillules de cynoglose, ou une plus forte dose, selon que la toux étoit plus ou moins vive, ou le sommeil plus ou moins agité. Il prenoit tous les huit ou dix jours, le soir à l'heure du sommeil, à la place des autres remèdes, une once & demie de casse mondée, qui lui procuroit le lendemain deux garderobes qui ne l'affoiblissoient point. Après environ un mois de ces usages, la toux se modéroit sensiblement, les crachats diminueoient en quantité, la couleur du pus changeoit avantageusement, & il perdoit tous les jours de sa mauvaise odeur. Ce malade se rétablit enfin par ces seuls secours, contre l'attente de ses parens & de ses amis, qui avoient désespéré de sa guérison.

SECTION TROISIEME.

Méthode préservative & curative de la Phthisie pulmonaire , provenant de crachement de sang ou d'hémoptysie.

CHAPITRE PREMIER.

Méthode curative de la Phthisie pulmonaire ; provenant de rupture des vaisseaux des poumons.

J'AI exposé dans le premier chapitre de la troisieme section de la premiere partie de cet ouvrage, les différentes causes des hémoptysies qui conduisent à la Phthisie pulmonaire, & j'ai traité dans le second chapitre du crachement de sang qui provient de la rupture des vaisseaux. Les causes de celui-ci, sont un tempérament sanguin & pléthorique, des coups, des chûtes, des courses rapides, des excès de tous les genres, &c. On trouve dans le même chapitre les signes qui précèdent le crachement de sang & ceux qui sont propres à faire distinguer les différens endroits de la poitrine d'où il provient.

L'hémorrhagie de la poitrine est toujours dangereuse, principalement lorsqu'elle est considérable & qu'elle vient d'un vaisseau rompu, sur-tout si le vaisseau est artériel. De telles hémorrhagies sont suivies ordinairement de fièvre, de phlogose, d'in-

flammation ; celle-ci se termine le plus souvent par des ulcères qui conduisent les malades à la Phthisie , dont les symptômes se développent à mesure que la suppuration fait des progrès & devient considérable.

Lorsque la cause de l'hémoptysie est une pléthore sanguine , on peut prévenir la rupture des vaisseaux par le moyen de la saignée , de la diète , des bains domestiques , de boissons émollientes , délayantes , &c.

Boerrhaave a donné le régime de vie , l'exercice à cheval , & principalement la saignée , comme préservatifs des Phthisies essentielles & même des héréditaires. Cet Auteur avoit raison s'il n'étendoit cet effet de la saignée que sur les tempéramens pléthorico-sanguins ; mais ce secours ne seroit pas suffisant pour préserver de la Phthisie qui proviendrait de toute autre cause ; il en est même auxquelles elle ne conviendrait pas. Cet Auteur a préservé de cette maladie , par la saignée , un jeune homme de famille dont le père & la mère étoient morts pulmoniques ; il ajoute que ce jeune homme vécut plus de quatorze ans au de-là du terme déterminé par Hippocrate pour le développement de la Phthisie héréditaire.

Lorsque l'hémoptysie qui provient de rupture de vaisseaux est établie , il faut nécessairement avoir recours à la saignée ; on doit même la réitérer plusieurs fois selon les circonstances , sur-tout si les malades sont d'un tempérament pléthorico-sanguin. Si l'hémorrhagie cesse après la première saignée , s'il ne reste pas de douleur de poitrine , si le pouls est

égal , lent sans être plein , & si la chaleur de la peau est naturelle , on peut retarder la seconde saignée ou ne pas la faire. Si au contraire le pouls se rehausse , si la chaleur de la peau augmente , si le malade ressent une douleur sourde à la poitrine , si la toux persiste ou devient plus considérable , on ne peut se dispenser de faire une seconde saignée , quelques heures après la première , & de la réitérer même plusieurs fois si les symptômes l'exigent.

Si l'hémoptysie est considérable , on n'y remédie efficacement qu'en diminuant la quantité du sang & son effervescence. Ce n'est que par ces moyens que les levres de la plaie peuvent se rapprocher l'une de l'autre & se consolider ; c'est par ces mêmes secours que l'on prévient l'inflammation , les ulcères , la suppuration , &c. On doit recommander aux malades la tranquillité de l'esprit & de s'abstenir de parler & de marcher. Leur nourriture doit être liquide & leurs boissons froides , délayantes & calmantes ; on seconde leur effet par des émulsions légères avec les eaux distillées de laitue , de coquelicoc & les semences froides ; on y ajoute le syrop de diacode à des doses ménagées , dans le cas de toux importunes , d'insomnies , &c. J'ai eu recours à l'opium dans des hémorrhagies violentes , & j'en ai retiré des avantages sensibles.

Il est des Auteurs qui recommandent la ligature des extrémités dans les fortes hémorrhagies ; ne seroit-ce pas augmenter ou précipiter , par la résistance qu'elles opposeroient à la circulation du sang , la

force systaltique du cœur, & déterminer ce fluide dans les poumons avec plus d'abondance & de rapidité ? Ces forces ne seroient-elles pas plus propres à augmenter l'hémoptysie qu'à la diminuer ?

Les astringens, dont le peuple médecin se sert mal à propos, pour remédier à l'hémoptysie, ne peuvent que produire un très-mauvais effet en resserrant le système général des vaisseaux. La qualité stiptique de ces drogues exerce sa principale action sur les fibres membraneuses de l'estomac & des intestins ; cette action stiptique intéresse les plexus nerveux des viscères du bas ventre, & se communique au système général des membranes des vaisseaux artériels ; il en est resserré, le sang coule dans leurs calibres avec plus de rapidité, il doit s'échapper selon les loix du mécanisme, par les endroits où il trouve le moins de résistance ; c'est vraisemblablement dans les hémorrhagies, par les ouvertures des vaisseaux qui fournissent à l'écoulement. Il est rare qu'un Médecin appelé chez un malade hémoptysique, ne le trouve à l'usage de quelque remède astringent, soit végétal, soit minéral, toujours dangereux dans une maladie aussi délicate que l'hémoptysie. Les astringens minéraux sont les plus pernicieux, ils porteroient de si vives empreintes sur les membranes des premières voies qu'ils rendroient l'hémorrhagie incurable ou mortelle. Si par cas ils arrêtoient l'écoulement, ce ne seroit que par une contraction générale des vaisseaux, qui auroit infailliblement des suites dangereuses ou funestes.

Hoffman rapporte l'histoire d'une femme qui fut prise d'une hémoptysie, que sans doute, dit cet Auteur, on avoit arrêtée par des astringens ; l'hémorragie ne revint plus, & les regles qui auparavant étoient abondantes en furent supprimées ; il s'ensuivit une oppression, une toux presque continuelle & des crachats purulens, visqueux & sanguinolens : la maigreur faisoit des progrès rapides & les forces diminuoient de jour en jour.

La malade étoit dans cet état lorsqu'elle consulta Hoffman ; il lui prescrivit des remèdes qui la soulagerent, selon une lettre qu'elle lui écrivit pour le remercier des bons conseils qu'il lui avoit donnés. L'observation suivante est du même Auteur.

Une femme âgée de vingt-sept ans, fut prise d'un crachement de sang considérable ; on lui donna pour arrêter cette hémorragie des poudres stiptiques, l'hémoptysie cessa, & les regles qui auparavant étoient abondantes en furent supprimées. Ces accidens furent suivis d'une forte oppression, d'une toux presque continuelle & d'une prostration de forces considérable ; les crachats étoient visqueux, sanguinolens & purulens. Hoffman fut appelé, il trouva la malade accablée des symptômes précédens & d'une maigreur étique qui augmentoit de jour en jour ; il la soulagea par les remèdes qu'il lui prescrivit ; mais il ne dit rien de son entière guérison.

Les Médecins observateurs les plus célèbres ont toujours regardé comme nuisible l'usage des astringens dans l'hémoptysie, excepté dans des circon-

tances rares où l'on est obligé de rétablir le ton des fibres membraneuses des vaisseaux, lorsqu'elles sont affoiblies par l'hémorrhagie, au point de faire languir la circulation des liquides & de troubler leur concours respectif avec les solides. Dans ce cas alarmant le pouls devient foible & irrégulier, les pulsations des arteres sont lentes & molles, & les extrémités froides; tout tend à indiquer que le ton des solides est affoibli par l'épuisement du sang. Il est essentiel alors de faire usage d'astringens; on commence par les végétaux, & on continue par les minéraux si le cas l'exige. Les astringens alors agissent comme toniques; on les donne en infusion, en décoction, ou en suc, & on les aromatise avec des eaux distillées de roses, de menthe, de canelle, de fleurs d'orange, &c. Si l'hémoptysie ne cede pas à ces secours, on acidule légèrement ces boissons avec l'esprit de vitriol, & même avec les gouttes minérales d'Hoffman, ou avec l'eau de Rabel. Wan-Swiéten a arrêté de fortes hémorrhagies en appliquant sur les parties de la génération des linges en trois ou quatre doubles, imbibés d'eau froide: ce moyen ne doit être employé que lorsque le pouls est languissant, & il est à craindre de son usage qu'il ne reste des caillots de sang entre les levres de la plaie; ils pourroient occasionner des ulceres en se corrompant.

On doit toujours être attentif à prévenir le retour de l'hémoptysie par le régime de vie, & par la saignée, dès qu'on s'apperçoit de quelque signe de pléthore sanguine. On doit être tranquille sur ce retour,

& ne pas le craindre, si la toux est très-modérée ou si elle n'a plus lieu ; si la respiration est libre & si les forces se rétablissent sensiblement : les malades qui ne sont pas favorisés de ces avantages, sont menacés du retour de l'hémoptysie ; ils doivent observer en conséquence les moyens les plus propres à la prévenir.

Lorsque l'hémorrhagie est survenue à la suite de quelque accident violent, on doit concevoir des espérances de guérison, principalement s'il n'existe pas de vice dans la masse du sang qui puisse altérer la plaie ; s'il en existe quelqu'un, les ulcères qui proviennent de l'hémoptysie en prennent le caractère, & ne guérissent ordinairement qu'après avoir remédié à ce vice.

Lorsqu'il s'est formé des grumeaux de sang, à la fin de l'hémoptysie, entre les levres de la plaie du vaisseau rompu (a), ils se corrompent, forment des ulcères, établissent ou concourent à établir une suppuration, si la nature ou l'art ne suffisent pas pour les expulser par les voies de l'expectoration. S'ils séjournent dans les poumons, plus de deux jours, les malades ressentent un embarras à la poitrine semblable à un petit poids. Il est essentiel alors de leur faire inspirer la vapeur d'eau tiède ou de la décoction de quelque plante émolliente ; on a quelquefois réussi par ce moyen à faire cracher ces grumeaux, dont le séjour dans les poumons ne sauroit être que très-nuisible.

Le sang grumelé dans les bronches ne s'y cor-

(a) Voy. première Partie, Sect. 3. Chap. 2.

rompt pas toujours ; quelquefois il y forme des concrétions polypeuses, qu'ordinairement on rejette par l'expectoration. Ces concrétions ressemblent à des portions ou à des ramifications de vaisseaux. Il est des Auteurs qui les ont prises pour telles, mais Ruisch a observé que ces prétendues portions de vaisseaux étoient compactes & n'avoient point de calibre : cette observation a dissipé l'erreur.

Le premier degré de la Phthisie pulmonaire, qui provient de la rupture des vaisseaux, est ordinairement de peu de durée ; il finit dès que l'ulcère est établi, & dès que les crachats sont purulens. Le second degré commence à cette époque ; je viens de donner les moyens de le prévenir ; on pourra se conformer pour le reste de la méthode curative de la Phthisie qui provient de cette cause, à celle qui est établie dans le Chapitre second de la seconde Section de cette seconde Partie (a).

J'ai rapporté des observations sur des Phthisies pulmonaires, provenant de crachement de sang (b). La première est d'Ingarhias ; cet Auteur la guérit par l'usage continuel, pendant un mois, de décoction de gayac.

La seconde & la troisième sont d'Hoffman ; la malade, qui étoit le sujet de la première, guérit. Un jeune homme, qui étoit le sujet de la seconde, mourut d'une rechute. Chesneau dit avoir vu plusieurs cas semblables, & il assure qu'on ne doit jamais être totalement rassuré sur les suites d'une

(a) Article 2. (b) Première Partie, Sect. 3. Chap. 4.

hémoptysie,

hémoptysie , quand bien même elle auroit cessé depuis long-tems.

Je ne fus appelé qu'au second degré de la Phthisie de la femme-de-chambre , qui est le sujet de la quatrième observation ; ses regles commençoient à diminuer ; elle avoit la peau sèche & ardente. Je la fis saigner du bras , & je la mis à l'usage du petit lait ; eile en prenoit une pinte tous les matins. Sa boisson ordinaire étoit une infusion de fleurs de bouillon blanc & de tussilage , édulcorée avec le sirop de capillaire. Elle prit six bains domestiques dans l'espace de douze jours ; la peau devint moite , je la purgeai avec la casse & la manne. Le quinzième jour de ces usages , les secours périodiques parurent au tems de leur époque ordinaire ; ils furent plus abondans qu'il ne l'avoient été aux trois époques précédentes. Une toux fréquente troubloit le sommeil de la nuit & les crachats étoient gluans , muqueux & purulens. Je fis prendre les soirs , aux heures du sommeil , quatre grains de pilules de cynoglosse ; tous les symptômes se modérèrent. Dès le premier moment qu'on s'aperçut de ces signes favorables , la malade commença l'usage d'une tisane de mille-feuille & de pulmonaire , légèrement émulsionnée avec des amandes douces & des pignons doux ; on y ajoutoit trois fois le jour , le matin , à midi & le soir , trois gros chaque fois de sirop balsamique de Tolu : tous les douze jours elle prenoit , le soir dans son lit , une once & demie de casse , qui lui procuroit le lendemain deux ou trois garderobes ; elle s'en trouvoit extrêmement soulagée.

Après deux mois de ces remèdes , la fièvre disparut , la toux se dissipa , les crachats ne furent plus purulens , & bientôt la convalescence fut décidée. L'usage du lait coupé avec l'eau seconde de chaux que la malade prit ensuite deux fois par jour , le matin & le soir , la rétablit parfaitement.

La malade de la cinquième observation touchoit à son tems critique , les règles étoient irrégulières , & leur quantité diminuoit à chaque période. Elle fut prise d'une fièvre aiguë & d'une toux fréquente , à la suite d'une grande hémorrhagie ; la toux ne diminua pas avec la fièvre qui dégénéra en fièvre lente.étique ; lorsqu'on m'appela , la Phthisie étoit déjà bien avant dans le second degré. La malade se plaignoit alors d'inappétence & de dégoût pour toutes sortes d'alimens ; elle crachoit du pus & la fièvre avoit tous les jours des exacerbations. Je la mis à l'usage d'une légère décoction du chamédris & de poirée , dans laquelle on faisoit infuser à chaud du cresson de fontaine & du cerfeuil ; on l'édulcoroit avec le sirop de marrube ; elle en prenoit environ quatre onces toutes les quatre heures. La tisane ordinaire étoit une légère infusion de sommités fleuries de millepertuis , adoucie avec du sucre rosat. Le sixième jour de l'usage de la décoction , elle prit une once & demie de casse mondée dans l'infusion d'un gros de rhubarbe : on lui donna le soir de la purgation une demie once de sirop de pavot blanc , qui calma la toux & procura un sommeil moins agité que celui des nuits précédentes.

Ces remèdes diminuerent l'inappétence & le dégoût ; les alimens devinrent moins insupportables. La peau étoit encore sèche ; je fis continuer la décoction & la tisane ordinaires ; on ajouta le soir à cet usage deux tasses d'infusion de coquelicoc, édulcorée avec le sucre , & le lendemain matin , trois tasses d'infusion de scabieuse en guise de thé , adoucie avec le sirop de velar. Ces infusions continuées pendant huit jours procuroient tous les matins une douce transpiration ; je les suspendis, crainte qu'elles ne favorisassent des dispositions à des sueurs colliquatives.

Les symptômes de la Phthisie se modéroient insensiblement , & le pus prenoit une couleur plus favorable ; je suivis ces indications ; la malade prit ensuite trois fois par jour des bols , composés de six grains de myrrhe , trois grains de camphre , & trois gouttes de baume blanc du Canada , incorporés avec un demi-gros de conserve de cynorrhodon, pour une prise. Elle buvoit par-dessus deux tasses d'infusion de fanicle en guise de thé , adoucie avec le sucre rosat. La tisane ordinaire étoit une décoction d'orge , dans laquelle on faisoit infuser à chaud une demi-poignée de verge d'or ; on dissolvoit dans chaque pinte deux scrupules de gomme arabique. Ces usages continués pendant près de trois mois dissipèrent tous les symptômes de la Phthisie , & la malade se rétablit dans son état ordinaire. Les secours périodiques ne parurent plus ; c'étoit le tems marqué par la nature ;

ils avoient commencé à l'âge de douze ans, ils cessèrent après celui de quarante, c'étoit dans l'ordre ordinaire, il ne s'en est pas suivi d'inconvénient.

La Phthisie de la sixieme observation fut guérie par des purgatifs à petites doses, par l'usage du petit lait dans lequel on faisoit infuser des feuilles d'argentine & de pervenche. Le malade en prenoit une pinte par jour, en différens tems. Il prenoit d'ailleurs trois fois par jour, le matin, à midi & le soir, deux tasses chaque fois d'une légère décoction de sommités de grande consoude, dans laquelle on faisoit infuser des feuilles de bécabunga; on l'édulcoroit avec du syrop de pié-de-chat, & on y ajoutoit deux ou trois gros de celui de baume de Tolu. Lorsque la toux étoit forte on la modéroit aux heures du sommeil avec un verre d'émulsion, faite avec la semence de courge, celle de pavot blanc, & les pignons doux; on réitéroit cette émulsion pendant la nuit, lorsque la toux n'avoit pas été modérée par la premiere prise. Dès qu'on s'apperçut de quelque signe de convalescence, on eut recours aux eaux Bonnes; le malade en prenoit deux livres tous les matins. Ces usages continués & variés selon les indications terminèrent heureusement la maladie qui s'étoit présentée avec des symptômes alarmans.

La septieme observation présente une maladie assez extraordinaire; sa cause immédiate consistoit vraisemblablement en un ulcere qui s'étoit formé dans la membrane intérieure des côtes. On a dû attribuer sa cause éloignée au sang des regles, qui,

n'ayant pu se frayer des routes par ses voies ordinaires, s'étoit porté dans cette membrane par métastase, & y avoit rompu le vaisseau qui avoit fourni l'hémorragie. Ce sentiment paroît confirmé par le soulagement que la malade éprouva dès qu'il parut un écoulement par les vaisseaux hémorroïdaux, & que les secours périodiques se rétablirent; par la couleur du sang, par le caractère de la toux & par la guérison de la maladie qui étoit un effet de la suppression des évacuations périodiques.

Je mis d'abord la malade à l'usage des bains de jambes & de fauteuil, qu'elle prenoit alternativement, un jour l'un & l'autre le lendemain. On lui faisoit en sortant des bains des frictions seches de haut en bas, sur les reins & sur les extrémités inférieures. Il se forma, vers le sphincter de l'anüs, un gonflement hémorroïdal, j'y fis appliquer cinq sangsues; on continua les bains & les frictions pendant que dura la maladie. La malade prenoit en sortant du bain un bouillon de grenouilles, dans lequel on ajoutoit trois ou quatre plantes choisies dans la classe des vulnéraires, & immédiatement avant le bouillon, des bols composés, pour chaque prise, de douze grains de gomme ammoniac, de dix grains de sagapénüm, de deux grains de camphre avec suffisante quantité de sirop balsamique de Tolu. La tisane ordinaire étoit une légère décoction d'orge. Elle buvoit trois ou quatre fois par jour, hors le tems de la digestion, un verre d'une infusion de feuilles de mille-feuille & de fleurs de bouillon blanc, émulsionnée avec la semence de

pavot blanc. On dissolvoit dans chaque pinte deux scrupules de mucilage de gomme adragant , & on l'édulcoroit avec le sucre rosat. On lui donnoit tous les soirs aux heures du sommeil un demi grain d'extrait d'opium , trois grains de camphre & trois gouttes de baume blanc du Canada , incorporés avec la conserve de roses , & par-dessus deux tasses à thé d'une infusion de fleurs de nénuphar , avec le syrop du chanvre ; on appliquoit tous les mois vers le tems ordinaire des regles , trois sangsues à l'anus. Par le moyen d'un régime de vie très-exact & des remèdes précédens , employés , ménagés & variés selon les différentes indications , tous les symptômes de la Phthisie se dissipèrent insensiblement. Il survint un écoulement hémorrhoidal ; les regles se rétablirent dans leur tems ordinaire , & la malade reprit son état naturel.

C H A P I T R E I I.

Méthode préservative & curative de l'hémoptysie , & des ulcères provenant d'érosion des vaisseaux des poumons : Cause de la Phthisie.

LA Phthisie qui commence par des ulcères aux poumons , provient d'érosions des glandes ou des vaisseaux de la substance de ce viscere (a) ; ces érosions dépendent d'un principe phthisique , d'un principe catharreux , ou de vices particuliers que la masse du sang a contractés. Le principe phthisique

(a) Part. première, Sect. 3. Chap. 3.

est indiqué par une toux sèche qui ne devient humide qu'après qu'elle a duré quelque tems. On commence alors de cracher ; ordinairement les crachats sont d'abord sanguinolens, & quelquefois ils ne le sont point ; le pus survient ensuite, la fièvre étique s'établit, tous les autres symptômes de la Phthisie se développent, sont des progrès, &c.

La toux catharreuse qui est suivie de Phthisie commence par être humide, par des chatouillemens à la gorge, par des sifflemens, par une gêne de la respiration, &c. Si l'humeur âcre qui donne lieu à ces symptômes se modère & se dissipe en peu de jours, on est à l'abri de la Phthisie ; si elle subsiste long-tems, elle fait impression au larynx, à la trachée-artère, aux poumons, y forme des érosions, des ulcères qui conduisent rapidement à la Phthisie pulmonaire.

Les maladies scorbutiques, les vénériennes, les scrophuleuses sont quelquefois suivies de Phthisies pulmonaires ; c'est une complication qu'il est essentiel de connoître & de distinguer, sans quoi on ne sauroit en établir la vraie méthode curative. Ces pulmonies sont précédées de symptômes particuliers qui appartiennent à la maladie de laquelle ils proviennent. J'ai déjà fait connoître toutes ces causes de la Phthisie pulmonaire, dans la première partie de cet ouvrage, on peut y avoir recours.

On a vu dans le second chapitre de la seconde section de cette partie la méthode curative de la Phthisie essentielle qui provient d'érosions, d'ulcères

& de suppurations aux poulmons ; cette méthode est propre également à la guérison de toutes les especes de pulmonies qui reconnoissent la même cause immédiate ; on la varie selon les causes éloignées desquelles elles dépendent. Si c'est d'une cause scorbutique , on allie les remedes anti-scorbutiques avec ceux qui sont propres à la guérison de la Phthisie & à modérer ses symptômes ; il en est de même si la pulmonie dépend d'un principe vénérien ou d'un principe scrophuleux , dartreux , érétypellateux , &c. On allie aux anti-phthisiqes les remedes qui conviennent à la cause vénérienne , à la scrophuleuse , à la dartreuse , à l'érythellateuse , &c.

J'ai rappelé , d'après Riviere (a) , plusieurs Médecins fameux qui ont guéri des pulmonies de différens caractères ; Riviere en a guéri lui-même : plusieurs Auteurs après lui , ont donné des observations sur les heureux succès qu'ils ont eus dans cette maladie : je me bornerai à donner la méthode curative des suivantes.

La Phthisie catharreuse de l'observation d'*Hildan* étoit désespérée , elle provenoit d'une affection catharreuse (b) ; de grands Médecins & des empiriques avoient tenté inutilement de la guérir , ils avoient été obligés de l'abandonner. *Hildan* la traita tant par des remedes pris intérieurement , qu'appliqués extérieurement , principalement par un seton qu'on pratiqua à la nuque. La santé de cette phthistique se rétablit si parfaitement , qu'elle se maria , fit des enfans & continua de jouir d'une santé constante.

(a) Prem. Part. Sect. 3. Ch. 3. (b) *Ibid.*

Cet Auteur ne dit pas les remèdes dont il se servit dans la méthode curative qu'il employa dans la guérison de cette maladie.

Riviere guérit une Demoiselle devenue phthisique à la suite d'un rhume catharreux (a) ; elle étoit fatiguée par une toux violente & par des insomnies continuelles ; elle souffroit d'une douleur de poitrine & d'ardeur dans les entrailles : la fièvre étiq̃ue & la maigreur étoient considérables, on désespéroit de sa guérison, cependant sa santé se rétablit par le moyen des remèdes suivans.

Riviere commença cette méthode curative par un lavement émollient, il fit tirer ensuite sept onces de sang de l'un des bras ; après cette saignée on ouvrit deux cauterès près l'épine du dos, & il fit faire usage pendant cinq jours d'une tisane laxative, composée d'une décoction de demi-once de tamarins dans trois livres d'eau commune, réduites aux deux tiers ; on y fit infuser pendant la nuit deux gros de séné mondé, deux gros de coriandre, autant de réglisse & un gros de roses rouges ; la malade prenoit tous les matins à jeun un verre de cette tisane. Ces seuls rémèdes la soulagerent tellement que dans quinze jours elle fut en état de quitter son lit & de vaquer à ses affaires. Elle restoit encore constipée & son sommeil n'étoit pas rétabli ; Riviere lui fit prendre des bols, composés pour une prise, d'un gros de conserve de roses & d'un grain de laudanum ; ils procurerent environ cinq heures de repos : elle dormit les nuits suivantes sans le secours d'autre re-

(a) *Ibid,*

mède ; elle reprit ensuite la tisane ci-dessus & le lait d'ânesse pendant un mois, sa santé se rétablit totalement. La prompte guérison de cette maladie paroît surprenante, mais l'autorité de Riviere mérite toute confiance.

Un Marchand de Londres, guérit d'ulceres à la trachée-artère ; j'en ai rapporté l'observation d'après Benet (a), qui n'en a pas donné la méthode curative.

J'ai donné l'histoire d'une femme pulmonique, d'après mon livre d'observations de Médecine (b) ; elle guérit par le moyen de purgatifs très-ménagés, de potions, de loocs béchiques & calmans, de deux saignées, d'une tisane légère composée de pulmonaire, de sommités fleuries d'hypéricum, adoucie avec le miel de Narbonne. Outre ces remèdes, la malade prenoit trois fois par jour d'une décoction de false-pareille, d'une opiate détersive & vulnéraire, &c. Elle fit usage de ces remèdes pendant environ deux mois, & en obtint une parfaite guérison.

Je fus appelé dans le mois de Mai de l'année 1772 pour un homme âgé de vingt-cinq ans, malade depuis six mois d'un mal de gorge que l'on croyoit scrophuleux, & qui gênoit extrêmement la déglutition. Je fus surpris à ma première visite du délabrement de sa bouche ; le palais, la langue, les amygdales & la luette étoient parsemés d'aphthes phlogosées, dont une partie étoit en suppuration. J'interrogeai le malade sur sa façon de vivre, avant qu'il ne fût pris de cette maladie ; il m'avoua qu'il

(a) Prem. Part. Sect. 3. Ch. 3. (b) *Ibid.*

avoit effuyé des maladies vénériennes qu'on avoit traitées très-légèrement , & principalement un bubon qui n'avoit point suppuré. Il n'en falloit pas davantage pour démontrer que les ulcères de la bouche provenoient d'un vice vénérien , & que le malade étoit pris d'une vérole très-dangereuse. Outre les aphtes & les ulcères de la bouche , dès le commencement de la maladie , la poitrine étoit affectée , ce qui étoit rendu sensible par une toux sèche , qui ensuite étoit devenue humide , par une douleur sourde vers la partie moyenne du *sternum*. D'ailleurs les crachats purulens qui en avoient été la suite , & qui étoient encore de la même nature en étoient une preuve parlante. Le malade avoit une fièvre étiq̃ue bien caractérisée , & la maigreur étoit au point qu'il n'étoit pas possible d'oser tenter un seul bain.

Je suppléai aux bains par l'usage du petit lait que le malade prenoit tous les matins à la dose d'environ une livre & demie ; je le purgeai le soir avec une once de casse & vingt grains de rhubarbe en poudre. Il buvoit dans l'après-midi , d'une légère infusion de fleurs de nénuphar & de petit capillaire , adoucie avec le syrop de velar.

Ce malade prenoit tous les deux jours un lavement composé d'une décoction de plantes émollientes , & tous les matins cinq pilules de deux grains chacune , d'éthiops balsamique , composé de parties égales de mercure revivifié du cynabre & de baume dur du Pérou. J'ajoutois à chaque prise deux grains de camphre ; on formoit les pilules avec le sirop de capillaire.

Le Mercure s'éteint parfaitement avec le baume dur du Pérou , par une longue trituration dans un mortier de marbre ; il en résulte un éthiops balsamique très-propre à la Phthisie vénérienne , ou compliquée d'un virus vénérien.

Tous les symptômes qu'éprouvoit le malade se modérèrent sensiblement par l'usage de ces pilules ; on le continua jusqu'à une guérison parfaite , sans qu'il en arrivât aucun des inconvéniens qui sont les effets ordinaires d'un long usage de mercure.

Huit jours après que le malade eut commencé l'usage des pilules, il cessa celui de la tisane de nénuphar, j'y substituai une légère décoction de dattes & de pignons doux. On ajoutoit à chaque verre une cuillerée à café d'un fyrop fait avec le suc de lierre terrestre & le sucre rosat. Je faisois tenir dans la bouche le plus fréquemment & le plus long-tems possible d'une infusion d'hysope, de marrube blanc & d'aigremoine, adoucie avec le miel rosat ; & de tems en tems on touchoit par le moyen d'un pinceau de linge les ulcères chancreux , avec le collire de Lanfranc.

Ces usages continués & variés pendant plus de deux mois, selon les indications qui se présentoient, rétablirent la santé du malade , qu'il confirma ensuite par l'usage du lait de chevre , qu'il prit tous les matins pendant un mois.

Le jeune homme d'une maison distinguée, âgé de seize ans dont j'ai déjà donné l'histoire (a), guérit d'une Phthisie pulmonaire contractée par des abus

(a) Première Partie, Sect. 3. Ch. 3.

& des excès. Il fit un usage constant de petit lait, d'infusions, de décoctions de fleurs & de feuilles de plantes émollientes & calmantes, édulcorées avec le syrop de coquelicoc & celui de pié-de-chat. Il prenoit tous les soirs aux heures du sommeil une émulsion avec les semences de courge, de melon, de pignons doux & le syrop de nénuphar, on y ajoutoit toujours du syrop de karabé, dont on varioit les doses selon que l'exigeoient la toux & les insomnies.

Dès que les symptômes de la Phthisie furent modérés, il fit usage au lieu des infusions & des décoctions précédentes, de celles de plantes vulnéraires toniques, édulcorées avec le syrop de marrube; on y ajoutoit le matin, à midi & le soir trois gros de syrop balsamique de Tolu. Après deux mois de ces remèdes tous les symptômes se modéroient & se dissipoient sensiblement. La guérison de cette maladie fut accomplie par l'usage des eaux Bonnes, coupées avec parties égales de petit lait; il en prenoit trois ou quatre verres le matin & deux dans le reste de la journée, en différens tems, hors ceux de la digestion, sans préjudice des décoctions vulnéraires, dont il buvoit trois ou quatre verres dans la journée, aux heures les plus commodes. Lorsque la convalescence fut déclarée, sa santé se rétablit totalement par l'usage du lait de vache, qu'on coupoit avec deux onces d'eau de chaux seconde.

Morgagny a donné, dans le premier volume de ses observations anatomiques, l'histoire de la gué-

rison de la Phthisie pulmonaire scorbutique, dont étoit affligé un Seigneur âgé de trente-deux ans (a). Ce malade n'étoit pas sous les yeux de Morgagny, on ne le consulta qu'après qu'on eut employé plusieurs remedes inutilement, puisque la maladie ne faisoit qu'empirer malgré leur usage. Cet Auteur lui fit prendre tous les matins un peu de résine de térébenthine, & il le mit en même tems à l'usage de l'eau de lait, dans laquelle on faisoit infuser du mouron, du lierre terrestre, des fleurs de millepertuis & un peu d'écorce de sassafras. Après vingt jours de cet usage, il fit prendre des bouillons de vipere, de grenouilles & de queues d'écrevisse. Les taches scorbutiques & tous les autres symptômes se modérèrent. La nourriture ordinaire étoit de bouillon de poulet farci des plantes vulnérables précédentes; on en formoit une pâte avec la farine d'orge & celle d'avoine, on y ajoutoit des amandes douces. Une décoction d'esquine & de sassafras étoit la seule boisson permise aux repas. Hors des repas le malade buvoit copieusement d'une eau que Morgagny appelle *aqua brandula*; c'étoit sans doute une eau minérale gaseuse, ou acidule telle que celles de Seltz ou de Saint-Myon dont l'usage est toujours utile dans les maladies scorbutiques. Ces remedes soulagerent tellement le malade qu'ils le mirent en état de se rendre à Padouë auprès de Morgagny. Ce Médecin l'examina attentivement, il trouva que les symptômes de sa maladie étoient en partie dissipés & en

(a) *Observat. Anatomia, de morbis thoracis, tom. 1. epist. 22.*

partie beaucoup moins graves. La toux qui subsistoit encore, la qualité des crachats & la maigreur lui donnoient cependant quelque inquiétude ; malgré ces symptômes il le regarda comme étant en convalescence, & le renvoya dans sa patrie, pour prendre le lait d'ânesse, ensuite celui de vache, qui rétablirent totalement sa santé.

CHAPITRE IV.

Méthode préservative & curative de la Phthisie qui provient d'hémoptysie occasionnée par la dilatation des vaisseaux.

J'AI déjà fait connoître la cause de l'hémoptysie qui provient de la dilatation, ou anastomose des vaisseaux ; j'ai même observé qu'il est rare qu'il en survienne des Phthisies pulmonaires, & qu'au contraire cet écoulement est quelquefois d'un secours nécessaire pour préserver de maladies graves (a), malgré ces heureux effets mille fois confirmés par l'observation, il seroit dangereux de donner trop de confiance aux hémoptysies de cette espece, puisqu'on les a vues donner lieu à des épuisemens dangereux & à des Phthisies funestes.

Lorsque l'hémoptysie provient d'une simple dilatation des vaisseaux, sans qu'on puisse en attribuer la cause à des vices de la masse des liquides, elle est rarement dangereuse. On crache aisément, à la suite d'une petite toux, le sang qui a passé dans les bronches. Cependant des passions violentes,

(a) Première Partie, Sect. 3. Chap. 4.

des chûtes, des coups, une métastase d'un sang abondant dans les poumons, par la suppression de quelque écoulement menstruel ou hémorrhoidal, pourroit causer des déchirures à des bouts de vaisseaux qui ne seroient pas assez dilatés pour suffire à l'écoulement de ce fluide; il s'ensuivroit des inflammations, des ulcères, des suppurations, des Phthysies, comme il en survient à la suite de l'hémoptysie occasionnée par la rupture des vaisseaux.

Si le sang qui coule par les vaisseaux dilatés des poumons, se répandoit dans la membrane cellulaire de ce viscere, il ne pénétreroit pas dans les bronches, par conséquent il ne sauroit être évacué par la trachée-artère. Ce sang ainsi retenu dans cette membrane, y formeroit des échimoses, s'y corromproit, la corroderoit; il en surviendroient des ulcères d'autant plus dangereux que le pus ne trouveroit pas d'issue par les voies de l'expectoration.

Les scorbutiques sont sujets à des hémoptysies occasionnées par la dilatation des vaisseaux; le sang est lâche dans les maladies scorbutiques; il se dissout, ou il est déjà tombé en dissolution. Le ton des vaisseaux & leur force dépendent en partie de la résistance que les globules du sang opposent aux oscillations particulieres de leurs fibres & à leurs mouvemens systaltiques. Dans cet état de la partie rouge du sang, les calibres des vaisseaux capillaires, & leurs pores exhalans, se relâchent dans la même proportion, & donnent une libre issue à un sang qui a perdu de sa consistance.

L'hémoptysie

L'hémoptysie qui provient d'une simple dilatation des extrémités des vaisseaux capillaires , n'a lieu ordinairement que dans la pléthore sanguine générale , ou particuliere aux viscères du bas ventre , ou à ceux de la poitrine. Lorsque la pléthore n'a plus lieu , les vaisseaux dilatés se rétablissent dans l'ordre naturel par un reste de leur propre ressort , pourvu qu'on n'excite pas l'écoulement par les passions de l'ame , par des exercices immodérés , ou par des abus dans le regime de vie.

J'ai déjà observé que les hémoptysies de cette espece suppléent souvent à des évacuations naturelles ou habituelles , telles que les regles chez les femmes & les hémorroïdes chez l'un & l'autre sexe ; elles sont alors nécessaires , il seroit dangereux de les supprimer ; j'en ai rapporté plusieurs exemples ; je n'y ajouterai que l'observation suivante que nous devons à Hoffman.

Une femme de condition , dont les regles s'étoient supprimées tout-à-coup par l'effet d'une grande peur , fut prise d'une pesanteur à la poitrine , d'inquiétudes , d'anxiétés dans les entrailles , de violentes palpitations de cœur , &c. à l'époque suivante , l'écoulement fut très-médiocre , la nature y suppléa par un crachement de sang qui ne duroit que quatre jours. Cette hémoptysie devint périodique , les regles ne parurent plus , la nature continua d'y suppléer pendant neuf ans ; l'hémoptysie cessoit pendant le tems de la grossesse & revenoit après l'accouchement dans les tems ordinaires des regles ,

fans qu'il en arrivât le moindre inconvénient. Il est rare , malgré cet exemple , que la nature supplée aussi heureusement & aussi long-tems à la suppression des regles , par les voies de l'expectoration ; les membranes des vaisseaux des poumons sont très-déliques , elles se rompent aisément , & comme les hémoptysies sont contraires à l'ordre de la nature , on doit toujours prendre des précautions quand elles ont lieu , pour en prévenir le danger.

Lorsqu'à la suite d'un crachement de sang habituel ou périodique, il survient une toux sèche, des inquiétudes dans le corps , une sensation de douleur sourde à la poitrine , on doit craindre qu'il ne se soit fait quelque déchirure à l'orifice du vaisseau dilaté , ou qu'il ne se soit rompu quelque-une de ses ramifications. Ces symptômes seroient autant de signes essentiels d'une inflammation , qui seroit suivie d'ulcère & de suppuration , si l'on n'avoit pas l'attention ou le bonheur d'en prévenir les effets. Dans ce cas épineux , on employeroit les mêmes secours qui sont indiqués dans le second Chap. de cette Section.

Si , dans l'hémoptysie , le sang que fournissent des vaisseaux anastomosés , ne passe pas directement dans les bronches , il est retenu dans les membranes ; je viens de l'observer. Un tel accident seroit grave & plein de danger ; le sang extravasé croupiroit dans ces membranes , il s'y corromproit , les corroderoit , y formeroit des ulcères profonds , des clapiers , des lacs qui détruiroient insensiblement la substance pulmonaire , jusqu'à l'extinction totale de ses fonctions.

Lorsque cet accident a lieu, on ressent, dès que le sang est extravasé, un mal-aise général dans tout le corps & des inquiétudes dans les entrailles ; peu de tems après l'ulcere s'établit, on éprouve de légers frissons principalement au dos ; la fièvre se déclare & fait des progrès ; elle est marquée par tous les symptômes de la fièvre étique, principalement par des irrégularités du pouls, par une sensation à la poitrine, de douleur péripneumonique. La toux est sèche, si elle est suivie d'expectoration, les crachats sont *muqueux* ; quelquefois on apperçoit de la purulence à leur superficie, qui n'a pénétré dans les bronches que par transfudation du pus qui croupit dans les cavités qu'il a formées. On doit regarder cette espece de Phthisie comme incurable ; cependant comme la nature a des ressources supérieures à celles de l'Art, il ne conviendrait pas, dans des circonstances aussi épineuses, d'abandonner les malades à leur sort. On fait prendre des infusions, des décoctions, des suc de plantes émollientes, savonneuses & vulnéraires. On calme les inquiétudes de la nuit & on modere la toux, par des juleps, des émulsions, des calmans ; on les édulcore avec des sirops béchiques, &, selon les circonstances, on y en ajoute des narcotiques, tels que celui de pavot blanc ou de karabé, menagés selon le tempérament des malades, & selon le plus ou le moins de violence des symptômes de la maladie. On met en même tems en usage les remedes les plus propres à garantir le sang de la corruption du pus,

tels que les baumes , les plantes ameres , vulnétaires astringentes , & d'autres anti-septiques indiqués dans le Chapitre de la seconde Section de cette Partie.

Dans l'hémoptysie scorbutique , le pouls est mou , petit & lent ; les malades éprouvent de la débilité dans les membres , principalement aux extrémités inférieures ; les levres sont pâles , les gencives sales & engorgées de sang , qui quelquefois est d'une couleur livide ; l'haleine est mauvaise , &c. Lorsqu'il se forme des ulcères dans les poumons d'un scorbutique , il ressent dans la poitrine une impression désagréable , presque point douloureuse ; la toux augmente , les crachats sont d'abord sanguinolens , purulens & fétides , la fièvre étiq̃ue se déclare , le marasme s'établit , il fait des progrès ; &c.

L'usage des remèdes anti-scorbutiques est le plus prompt secours que l'on puisse donner dans la Phthisie de ce caractère ; on doit d'abord porter les vues curatives sur les premières voies & pourvoir au dérangement des digestions , par le moyen d'une tisane de tamarins que l'on rend purgative , en y faisant infuser de la rhubarbe ou des mirobolans citrins. On passe ensuite aux infusions , aux décoctions , aux bouillons , ou aux suc de plantes anti-scorbutiques , telles que la chicorée sauvage , le pissenlit , la germandrée , la fumetere , le cresson de fontaine , le cochléaria , le treffle d'eau , la berle , le pourpier rouge , &c. On ajoute aux compositions que l'on fait de ces plantes , celles qui sont reconnues , par leur qualité de vulnéraire & toniques , telles que

la bugle , la fanicle , la brunelle , la pervénche , la piloselle , la millefeuille , la grande coufoude , la quinte-feuille , la pulmonaire , le lierre terrestre , la tormentille , &c. on édulcore ces infusions , ces décoctions , ces fucs , avec le sirop de marrube , avec l'anti-scorbutique , celui d'écorce d'orange ; ou bien avec des sirops béchiques , si les indications l'exigent , tels que ceux de tussilage , de guimauve , de pié-de-chat , d'érysimum , &c. On ajoute aux tisanes le mucilage de gomme arabique , ou adragant : on a recours aux anti-septiques & aux autres moyens que j'ai proposés dans le second Chapitre de la seconde Section de cette Partie.

SECTION QUATRIEME.

Méthode préservative & curative de la Phthisie pulmonaire qui provient de tubercules aux poumons , & d'obstructions des viscères du bas-ventre.

CHAPITRE PREMIER.

Méthode préservative & curative de la Phthisie qui provient de tubercules qui ne sont pas de nature à suppurer.

ON a vu dans la quatrième section de la première partie de cet ouvrage que la Phthisie est occasionnée par des tubercules qui ne suppurent jamais , & pas

des tubercules qui suppurent. Les tubercules qui ne sont pas propres à suppurer, ont pour principe des humeurs excrémentielles provenant de la dépuration du chyle dans les poumons. J'ai déjà observé que la première dépuration & la plus abondante de cette substance alimentaire, se fait dans ce viscere ; celles de ses parties qui de leur nature ne peuvent pas être assimilées aux liquides animaux, doivent être évacuées par les voies de la transpiration, ou par celles de l'expectoration. Si l'une & l'autre de ces voies deviennent impraticables aux parties les plus grossières d'un chyle mal digéré, mal conditionné, elles restent isolées dans les bronches & dans les vésicules ; le contact de l'air & la chaleur animale les condensent de plus en plus, elles se durcissent & forment des concrétions tuberculeuses, graveleuses, pierreuses, selon leur nature, ou selon la durée de leur séjour dans le système bronchique & vésiculaire des poumons (a).

Le chyle dans l'état naturel doit être assez digéré pour ne fournir dans les voies de sa dépuration, qu'une matière transpirable ; ses parties excrémentielles qui passent dans les poumons ne participent pas à la nature des liquides animaux, elles ne s'enflamment point ; au lieu de causer des suppurations dans les vaisseaux de l'air où elles sont retenues, elles s'y condensent par le contact de cet élément & s'y durcissent par la chaleur animale ; de là, des concrétions qui n'ont point lieu lorsque les diges-

(a) Première Partie, Section 4. Chap. 1 & 2.

tions sont parfaites & que le chyle est bien conditionné.

Cette maladie doit être considérée comme une pulmonie sèche; ceux qui ont le malheur d'en être affligés sont pris d'une petite toux qui d'abord n'est pas incommode; elle fait insensiblement des progrès, la respiration devient gênée & de plus en plus difficile; le pouls est fréquent & inégal; le marasme s'accomplit insensiblement, & les malades expirent dans une entière consommation (a)

Les observations que j'ai rapportées sur cette funeste maladie démontrent évidemment sa nature & ses causes (b). Celles-ci doivent être rapportées au dérangement des digestions, principalement de celles qui se font dans les premières voies & dans la substance des poumons. On pourroit remédier au vice des premières voies & prévenir la pulmonie de cette espèce; on la guériroit même dans ses commencemens, si l'on faisoit attention aux signes qui l'indiquent. Ces signes en général paroissent équivoques, il est vrai, mais il ne devroient pas l'être chez les personnes qui sont d'un tempérament délicat & valétudinaire, dont les digestions sont pénibles, laborieuses & qui sont affectées dans tous les tems d'une toux sèche & d'une gêne dans la respiration, qui font des progrès sensibles, ils devroient l'être encore moins si ces personnes avoient le malheur d'être issues de familles sujettes à la Phthisie, ou d'avoir sucé le lait de nourrices tachées d'une telle

(a) *Ibid.*(b) *Ibid.*

origine. Lorsque les tubercules qui ne sont pas propres à suppurer se sont multipliés, ils deviennent contagieux à eux mêmes & à la matière de la transpiration qu'ils condensent dans les bronches & dans les vésicules ; tout empire enfin au point d'obstruer les vaisseaux de l'air, de diminuer & de supprimer les fonctions des poumons, jusqu'à une extinction totale.

On prévientroit les tubercules de l'espece de ceux qui ne suppurent pas, par le moyen d'un régime de vie modéré, par une diete exacte & propre à l'état des organes de la digestion, par l'éloignement de toutes sortes d'excès & de passions, par l'usage de boissons composées de plantes ameres & savonneuses, dans lesquelles on feroit fondre, pour chaque deux livres, quinze ou dix-huit grains de nitre purifié ; par la boisson d'eaux minérales ferrugineuses, par de légers purgatifs, & par la privation de boissons fortes & de liqueurs spiritueuses.

On guérit de cette maladie, principalement dans ses commencemens, par un usage constant & de durée, de boissons humectantes, délayantes, apéritives & diaphorétiques ; par la boisson d'eaux minérales gazeuses, par des purgatifs modérés, en forme d'apocemes. On a encore la ressource des évaporations de lait & de plantes émollientes qu'on introduit dans la capacité de la poitrine par le moyen de l'inspiration. Cette vapeur se répand & se distribue dans les vaisseaux de l'air, comme une douce rosée, elle humecte & ramolit les concrétions tuberculeuses

qui se forment dans leurs calibres , & les rend propres , quand elles n'ont pas acquis trop de dureté , à être rejetées par les voies de l'expectoration (a).

CHAPITRE II.

Méthode préservative & curative de la Phthisie pulmonaire provenant de tubercules qui suppurent , ou qui sont propres à suppurer.

LES tubercules qui sont propres à suppurer (b) doivent être considérés dans trois différens états, dans leur mollesse , dans leur dureté & dans leur suppuration. Ils sont annoncés dans leur mollesse par une toux sèche peu incommode, par la différence de la couleur du visage qui pâlit insensiblement par un mal-aïse dans la poitrine , auquel on ne fait pas d'abord attention , parce qu'il n'est pas considérable dans son commencement. La toux devient humide & plus fréquente , le sommeil en est interrompu. Ces derniers symptômes indiquent que les tubercules sont parvenus à la dureté ; le pouls est alors sensiblement fébrile , on ressent une légère douleur dans quelque endroit déterminé de la poitrine ; la toux est plus vive , on rend des crachats plus ou moins épais , tous les symptômes augmentent & les tubercules s'enflamment. Les urines prennent dans cet état de la pulmonie tuberculeuse , une couleur rougeâtre , les crachats sont plus abon-

(a) Voy. premiere Partie, Sect. 2. Chap. 2.

(b) Voy. premiere Partie, Sect. 4. Chap. 3.

dans , on y distingue quelques fibrilles de sang , & quelquefois on n'y en apperçoit pas ; peu de tems après ils deviennent purulens , la suppuration s'établit ; de là , tous les symptômes du progrès de la Phthisie tuberculeuse (a).

La Phthisie tuberculeuse qui provient d'une simple densité de la lymphe , ou de ce que ce liquide a dégénéré , est une Phthisie essentielle , je l'ai déjà observé ; si elle reconnoît pour cause des vices étrangers , tels que le scorbutique , le dartreux , le rachitique , le vénérien , &c. elle est symptômatique : si deux ou trois de ces vices concourent à cette maladie , elle est une Phthisie symptômatique compliquée. On connoît & l'on distingue ces vices par des signes qui sont propres à chacun d'eux & qui précèdent les symptômes de la Phthisie pulmonaire.

On a observé que ces différens principes de la Phthisie tuberculeuse sont marqués par une densité & par une âcreté de la lymphe ; ils ne different entre eux que par le caractère , ce qui paroît démontré par les tumeurs lymphatiques des glandes , des muscles des os , & principalement par les exostoses qui en sont des symptômes & des signes essentiels.

La Phthisie qui provient de ces différentes causes est caractérisée par des symptômes qui sont propres à chacune ; elle-même n'est qu'un symptôme , il seroit malheureux de la considérer comme essentielle , tous les remedes qu'on donneroit pour en obtenir la guérison , ne serviroient qu'à concourir

(a) *Ibid.*

à la rendre incurable , ou par leur effet , ou par leur inutilité.

J'ai observé que la Phthisie essentielle qui provient d'érosions , prend ordinairement vers la fin du second ou au commencement du troisieme degré, un caractère scorbutique ; on met alors en usage des remedes propres à cette nouvelle indication. Il n'en est pas de même de la Phthisie symptômatique , son caractère est marqué dès sa naissance ; on doit d'abord avoir recours à l'usage des remedes propres à cette premiere indication.

Comme les poumons sont d'une délicatesse infinie , que leurs fonctions sont des plus essentielles à la vie , & que leur altération est dangereuse & mortelle , il ne faut jamais perdre de vue , pendant la méthode curative de la maladie principale , les symptômes qui sont propres à ce viscere , tels que la toux , les phlogoses , les ulceres , le pus , ses qualités ; la liberté ou la difficulté de l'expectoration , &c. On doit également s'occuper des moyens propres à prévenir la corruption du sang , effet ordinaire de la contagion du pus , lorsqu'il est résorbé dans les vaisseaux de ce précieux liquide & confondu dans le torrent de sa circulation. On a les mêmes égards dès qu'on s'apperçoit de quelque signe qui indique sa colliquation ; les secours nécessaires dans ces circonstances épineuses , sont indiqués dans le second & troisieme chapitres de la seconde section de cette partie.

Dès le commencement des Phthisies symptômati-

ques, quelle qu'en soit la nature, il faut remédier au dérangement des fonctions de l'estomac, par le moyen des stomachiques végétaux, par des purgatifs modérés, même par des vomitifs s'il est des indications qui exigent ce secours, & principalement par un régime de vie convenable à l'état des malades. Si l'on s'apperçoit de quelque signe qui indique une pléthore sanguine, on a recours à la saignée ; si la peau est sèche & la fibre irritable, on y remédie par le moyen des bains domestiques, de boissons émollientes & légèrement apéritives ; il faut nécessairement avoir recours à ces dernières toutes les fois que la lymphe est trop dense & qu'elle forme ou qu'elle a formé des engorgemens tuberculeux. On modere la toux & on facilite l'expectoration par des remèdes béchiques, calmans, delayans, mucilagineux & même par des narcotiques, si la force de l'irritation l'exige : on mondifie les ulcères par des vulnéraires apéritifs dans leur commencement, on continue par des détersifs & des balsamiques : on prévient la contagion du pus & on s'oppose à ses effets par des anti-septiques, & on remédie à la colliquation par des vulnéraires astringens : j'ai donné assez d'étendue aux moyens d'employer utilement ces différens secours, dans la seconde section de cette partie.

Cette méthode curative est en général la plus propre à toutes les especes de Phthisie pulmonaire, aux essentielles & aux symptomatiques, mais celles-ci exigent des remèdes particuliers indiqués par

leurs différentes causes & leurs différens caractères. On allie ces remèdes , je l'ai déjà observé , avec ceux qui conviennent à la Phthisie essentielle , on les varie selon les indications que l'on prend des symptômes qui lui sont propres.

Lorsque la Phthisie symptomatique est compliquée , on prend les indications curatives de l'une & de l'autre cause , pour diriger les ressources de l'art de façon que des remèdes employés à propos y remédient en même tems ; l'observation suivante est propre à indiquer des règles générales qu'on doit observer dans ces circonstances.

Madame . . . âgée d'environ trente ans , fut prise dans le mois d'Octobre de l'année 1780 , de vives douleurs aux deux bras , qui se modérèrent quelque tems après , mais qui ne cessèrent pas ; il s'éleva à la peau , dans le mois de Décembre , des éruptions phlogistiques , larges & plates ; il se joignit à ces symptômes une toux fréquente , vive & très-importune. Peu de tems après la bouche fut infectée d'aphthes chancreuses qui durèrent tout l'hiver. Vers la fin du mois d'Avril il survint une perte en rouge très-considérable , la toux ne ceda point , au contraire , les crachats étoient purulens & sanguinolens ; la maigreur étoit déjà considérable & la fièvre étiqûe étoit décidée par tous les symptômes qui la caractérisent : les aphthes qui avoient presque disparu avec la perte , se renouvelèrent & dégénérèrent en ulcères chancreux. Ces ulcères occupoient les deux côtés de la langue , sa superficie , les amygdales , la luette , &

s'étendoient jusqu'aux appendices du voile du palais, ce qui rendoit la déglutition extrêmement pénible & douloureuse. Des ulcères de la même nature s'étoient formés & faisoient des progrès aux parties antérieures des deux aisselles, aux grands cantus des yeux, aux commissures des levres, & sur-tout à la partie moyenne externe de la lèvre inférieure ; il y en avoit encore un très-considérable aux parties naturelles vers la fourchette. Tous ces symptômes, principalement la toux violente, les insomnies qu'elle caufoit, la fièvre étiq̃ue, l'extrême maigreur, &c. avoient réduit la malade à un accablement si alarmant, qu'on désespéroit de ses jours.

M. Duber... Chirurgien de Paris, distingué par son érudition & par ses talens, suivoit cette maladie depuis qu'elle s'étoit manifestée ; il la regarda d'abord comme scorbutique, elle en avoit tout le caractère ; il ne pouvoit pas la considérer autrement. Après avoir employé les remèdes généraux, il eut recours aux anti-scorbutiques les plus indiqués par les symptômes de la maladie, qui ne fit qu'empirer par leur usage. Il passa aux anti-vénériens, d'après quelque soupçon qu'ils pourroient être utiles ; il les administra de toutes les façons le plus généralement reçues : malgré ces usages, tous les symptômes faisoient des progrès alarmans.

La malade étoit réduite à ce triste état, lorsqu'elle m'appela à son secours, le 16. du mois de Mai de l'année 1781. La méthode régulière avec laquelle cette maladie avoit été traitée, me mit dans l'incer-

titude sur ce qui nous restoit à faire. Nous tentâmes l'usage des anti-scorbutiques les plus puissans, nous fûmes obligés de les abandonner; nous reprîmes celui des mercuriels les plus énergiques, ils ne faisoient que rendre la maladie de plus en plus grave.

Comme il n'étoit pas possible de trouver d'autres causes de cette maladie que la complication d'un virus scorbutico-vénérien, nous nous déterminâmes à faire usage en même tems de remèdes anti-scorbutiques, anti-vénériens & vulnéraires. D'après ces vues, la malade prit tous les matins cinq onces de suc de chicorée sauvage, de cresson de fontaine, de trefle d'eau & d'oseille, on l'édulcoroit avec le syrop d'écorce d'orange, & trois verres par jour d'une décoction de gayac; la boisson ordinaire étoit une infusion de plantes béchiques & vulnéraires, avec le mucilage de gomme arabique. Elle prenoit le soir des pilules mercurielles gommeuses de Plenck; on ajoutoit à chaque prise deux grains de camphre; de tems en tems on faisoit quelque friction mercurielle. Après quelque tems d'usage des sucs, nous leur substituâmes une infusion dans le vin blanc, de plantes anti-scorbutiques les plus puissantes dont elle buvoit deux verres par jour, le matin & le soir; elle ne prenoit alors qu'un verre de décoction de gayac, à l'heure du jour qui lui étoit la plus commode, hors le tems de la digestion. Nous employâmes pendant cette méthode curative les topiques les plus indiqués par l'état des ulcères, & principalement par celui de la levre inférieure, qui, malgré la diminution de tous les symptômes, paroissoit

devenir cancéreux. Pendant tout le cours de la maladie, nous avons une attention scrupuleuse à calmer la toux, à favoriser l'expectoration & à procurer le sommeil, par des remèdes béciques, par des délayans, des calmans & des narcotiques, à des doses très-ménagées.

Pour ce qui concerne les pilules mercurielles, gommeuses, nous en rapprochions, éloignons ou suspendions l'usage, selon les indications prises de leur effet. Ce ne fut que dans le mois d'Octobre de la même année, qu'il nous fut permis de concevoir des espérances de guérison, que nous obtîmes enfin, malgré toute attente. Les symptômes de la poitrine diminuèrent les premiers, & tous ceux de cette maladie compliquée & rébelle se dissipèrent insensiblement.

On est assez mal-à-propos dans l'usage, lorsqu'une Phthisie vénérienne est compliquée d'un vice scorbutique, de faire des remèdes pour guérir celui-ci avant d'entreprendre la méthode curative de l'autre. J'ai eu lieu de m'apercevoir en plusieurs occasions que pendant le tems que l'on emploie à remédier à l'un de ces vices, l'autre fait des progrès rapides, devient plus difficile à guérir & quelquefois incurable. L'observation précédente en est une preuve sensible; elle paroît démontrer les avantages & la nécessité de faire usage en même tems des remèdes propres aux différentes causes compliquées de la pulmonie, de quelque nature qu'elles soient, principalement si elles sont scorbutico-vénériennes.

C H A P I T R E I I I .

Méthode préservative & curative de la vomique des poumons , & de la suppuration de ce viscere , à la suite des maladies aiguës.

LES vomiques des poumons sont de véritables abcès, d'autant plus dangereux, d'autant plus à craindre, qu'ordinairement ils se forment & se rompent, sans qu'on ait pu s'appercevoir d'aucun symptôme de leur existence. Cependant Fernel prétend que, quelquefois il est des signes qui les indiquent (a).

Pour ce qui est des maladies aiguës de la poitrine, telles que les pleurésies, les péripneumonies, &c. si elles ne sont pas jugées dans des tems déterminés par leur caractère, elles sont souvent suivies de suppurations pleines de danger. J'ai rapporté, dans le chapitre quatrième de la quatrième section de cet ouvrage, des observations qui le confirment.

La première de ces observations concerne un Marchand boutonnier qui rendit une vomique, suivie d'une suppuration énorme, qui dura plus de quatre mois & qui ne diminua qu'après qu'il eut rendu par l'expectoration, à la suite d'une toux violente & convulsive, la membrane dans laquelle elle s'étoit formée.

Comme le malade n'avoit pas encore perdu de ses forces, qu'il étoit au contraire robuste & vigou-

(a) Voy. Première Partie, Sect. 4. Chap. 1.

reux, & que la fièvre étoit considérable & la toux très-violente, je le fis saigner trois fois dans l'espace de vingt-quatre heures. Je le mis d'abord à l'eau de poulet & à l'usage du petit lait pour toute nourriture & pour toute boisson; on édulcoroit ce dernier avec le syrop de violettes. Il prenoit tous les soirs, pendant les premiers quinze jours, une demi-once & jusqu'à six gros de syrop de karabé dans un verre d'une légère émulsion faite avec des amandes douces. Ce calmant, en modérant la violence de la toux qui étoit toujours convulsive, facilitoit l'expectoration & procuroit quelques heures de sommeil. On augmenta la nourriture dès qu'on s'aperçut que la fièvre étiq̃ue prenoit la place de la fièvre inflammatoire. Je fis faire usage ensuite pendant toute la maladie d'un looch composé de parties égales de syrop de tussilage & de capillaire, avec la gomme adragant, dans une infusion de fleurs béchiques, & d'une tisane d'orge & de réglisse, dans laquelle on faisoit infuser des fleurs de pié-de-chat. On entretenoit la liberté du ventre par le moyen de lavemens émolliens. Lorsque la fièvre inflammatoire fut modérée, je fis prendre tous les douze ou quinze jours, le soir aux heures du sommeil, une once & demie de casse mondée, délayée dans du petit lait, elle procuroit le lendemain deux ou trois garde-robes qui n'affoiblissoient point.

Un mois ou environ après que le malade eut commencé l'usage de ces remèdes, il maigrissoit encore & la fièvre étiq̃ue étoit toujours la même; je lui fis

prendre deux fois par jour, le matin & le soir, un bouillon composé de huit grenouilles, écorchées, vuidées, auxquelles on retranchoit les têtes & les pattes, de trois écrevisses rouges & écrasées, & de quarante pignons doux ; on y jettoit en ôtant le pot du feu, de pulmonaire, de lierre terrestre, de sommités fleuries de millepertuis, de chaque deux pincées. Outre ces remèdes il prenoit trois fois dans les vingt-quatre heures, hors le tems de la digestion & du sommeil, cinq onces d'une légère décoction de mille-feuille, dans laquelle on faisoit infuser du cresson de fontaine, on y dissolvoit huit grains de gomme arabique & six grains de myrrhe ; on l'édulcoroit avec trois gros d'un syrop balsamique fait avec le suc de lierre terrestre, le baume blanc du Canada & le sucre. Lorsqu'il survenoit des insomnies, ou lorsque la toux étoit trop importune, on ajoutoit au looch dont on continuoît toujours l'usage, une dose très-moderée de syrop de diacode : ou bien on lui faisoit prendre le soir une émulsion édulcorée avec une demi-once ou six gros de ce syrop.

On continua tous ces usages jusqu'à ce que le malade eut expectoré le kiste, ou une partie de la membrane qui le formoit ; le reste s'étoit dissipé par la suppuration (a). Peu de tems après l'expectoration de la membrane, la toux se modéra & le pus paroissoit acquérir de plus en plus une qualité moins mauvaise. Il prit alors trois fois par jour, un gros chaque fois de conserve de roses, dans laquelle on

(a) *Ibid.*

incorporoit trois grains de camphre & deux gouttes de baume du Canada ; il buvoit par-dessus deux tasses d'une infusion en guise de thé de sommités de grande consoude, édulcorée avec le sucre rosat. La boisson ordinaire étoit une décoction d'orge, dans laquelle on ajoutoit par pinte un demi gros de gomme arabique. Pendant ces usages les symptômes de la maladie diminueoient à vue ; ils se dissipèrent enfin totalement. Le malade se rétablit dans son embonpoint ordinaire par l'usage du lait de vache, qu'il prit le matin & le soir pendant deux mois. J'observerai encore que la nourriture ordinaire pendant toute la maladie ne fut que de potages aux légumes, de substances farineuses, d'œufs à la coque ou cuits au bouillon, & de compotes de fruits doux bien conditionnés.

Ce fut par des moyens à-peu-près semblables qu'étoit guéri le malade qui avoit rendu trois vomiques en différens tems, & qui périt enfin à la suite de la quatrième (a). Sa santé s'étoit rétablie après la suppuration des trois premières : cependant après la troisième il lui resta une toux sèche qui n'étoit point incommode. Ce malade étoit dans la force de son âge, il n'aimoit point les privations, il se livra à ses passions ; il n'est pas surprenant qu'il succombât à la suite de la quatrième vomique.

Les suppurations des poumons qui sont des suites des maladies de ce viscere, sont encore plus à craindre que les vomiques, on en connoîtra tout le

(a) Voyez première Partic, Sect. 4. Chap. 4.

danger en se rappelant les observations anatomiques faites sur des corps morts de ces maladies (a), & on ne désespérera pas de les guérir d'après les histoires des guérisons qui sont rapportées dans le même chapitre. On périt cependant quelquefois à la suite des maladies de poitrine sans en avoir prévu le danger ; on a vu (b) la mort inopinée d'un homme qui étoit guéri en apparence. C'étoit sans doute l'effet d'une suppuration sourde dont le pus avoit inondé les bronches en s'y répandant subitement, & supprimé la communication de l'air de l'atmosphère avec la substance pulmonaire. A la suite de cette observation j'en ai donné cinq de guérisons parfaites de suppurations à la poitrine ; quatre de ces guérisons ont été opérées à-peu-près par les mêmes remèdes que j'ai indiqués dans la méthode curative de la Phthisie essentielle (c) : on me dispensera de me répéter.

On doit distinguer parmi ces observations celle qui concerne un magistrat qui, se croyant guéri d'une fluxion de poitrine, fut pris d'une suppuration dans laquelle le pus s'évacuoit en même tems par les voies de l'expectoration, des garde-robes & des urines. Je fus effrayé de cet événement extraordinaire ; j'appelai en consultation deux Médecins de Paris, d'une réputation méritée, qui regarderent ce malade comme étant sans espoir de guérison ; ils ne le virent plus étant pleinement persuadés de la justesse de leur pronostic.

(a) *Ibid.* (b) *Ibid.*

(c) Seconde Partie, Sect. 2. Chap. 2.

Comme l'on ne doit jamais désespérer des ressources de la nature , je cherchai à les seconder par les secours de l'art ; je mis le malade à l'usage d'une décoction d'orge , pour boisson ordinaire , dans laquelle on faisoit infuser de la scabieuse ; on l'édulcoroit avec du syrop de velar ; il prenoit toutes les quatre heures une tasse ou deux d'infusion de parties égales de scordium & de cresson de fontaine , édulcorée avec le sucre rosat : il faisoit usage le matin & le soir de bols composés de quatre grains d'oliban , de trois grains de camphre & de deux gouttes de baume blanc du Canada incorporés avec la conserve d'aunée pour une prise. Il buvoit par-dessus une tasse de l'infusion précédente. Lorsque la toux étoit trop fréquente , ou qu'elle cauçoit des insomnies on ajoutoit à ces bols un demi grain & quelquefois un grain d'opium , selon les circonstances. Il faisoit d'ailleurs usage d'un looch blanc , pour modérer la toux & pour faciliter l'expectoration. Comme le pus s'évacuoit également par les garde-robes , on favorisoit son expulsion par des lavemens émolliens , & on faisoit prendre tous les huit ou dix jours , vers les neuf heures du soir , une once ou une once & demie de manne , selon la disposition où étoit le malade.

Tous les symptômes de cette maladie extraordinaire diminuerent insensiblement par ces usages ménagés selon les circonstances & selon les différentes indications , & se dissipèrent totalement. Lorsque la convalescence fut déclarée , l'extrême maigreur donnoit encore des inquiétudes sur l'état

du malade & sur ses suites ; on y remédia par l'usage du lait de vache coupé , le matin & le soir , avec l'eau de chaux seconde : ce Magistrat jouit encore aujourd'hui d'une santé des plus parfaites.

CHAPITRE IV.

Méthode préservative & curative de la Phthisie pulmonaire , occasionnée par des obstructions des viscères du bas ventre (a).

LES obstructions des viscères du bas ventre qui donnent lieu à la Phthisie pulmonaire , proviennent ordinairement d'un chyle mal digéré , de la lymphe dégénérée , ou d'une substance bilieuse , propre à former des concrétions. Les obstructions qui proviennent d'un chyle mal digéré dans les premières voies se forment ordinairement dans le mésentère. Les parties grossières d'un chyle de ce caractère , s'arrêtent dans les glandes de ce viscère , s'y condensent par leur séjour & font insensiblement des progrès vers la dureté. Les vaisseaux lactés étant obstrués dans ces glandes , le nouveau chyle qui y aboutit , trouvant des obstacles à sa circulation , s'y arrête , s'y condense , s'y durcit & concourt à augmenter les engorgemens & à les multiplier ; de là des obstructions , des squirrhes , &c.

Les obstructions lymphatiques sont formées par une lymphe trop dense , qui a pris ce caractère d'un

(a) Voy. prem. Partie , Sect. 4. ch. 5.

régime de vie mal entendu, de quelque abus commis dans l'usage des six choses non naturelles, ou de causes étrangères, telles que les scorbutiques, les scrophuleuses, les vénériennes, &c.

La bile est une humeur épaisse, gommeuse, savonneuse, pénétrante ; peu de chose la coagule, même dans ses propres vaisseaux, sur-tout les acides excédens, & principalement les acides minéraux & le mercure sublimé. Les seules passions violentes & les excès de tous genres produisent cet effet sur la bile, ils la font même changer de couleur, de jaune elle devient pâle, verte, grisâtre, noire, &c.

La bile dans cet état, contre nature, trouble l'ordre des digestions, le pervertit, engorge les pores biliaires & la vésicule. Elle s'épaissit, se durcit de plus en plus & forme dans la substance du foie des concrétions graveleuses, pierreuses, &c. D'ailleurs dès qu'elle a pris un caractère étranger, elle le communique à la masse générale des liquides qui en dégénèrent sensiblement.

Les obstructions des viscères du bas ventre, de quelque nature qu'elles soient, dérangent la circulation des liquides dans les viscères qu'elles affectent, rendent irrégulières les oscillations des fibres des solides, & troublent l'ordre des fonctions ; de là des malaises dans les entrailles, des inquiétudes générales, des fièvres lentes, des toux, &c. Les obstructions propres à causer ces désordres pullulent & se multiplient par une espèce de contagion qui se communique aux viscères de la poitrine, d'où

réultent des tubercules , des abcès , des suppurations , des empiemes , &c. J'ai déjà donné des observations qui constatent que le pus des ulcères du bas ventre se fraie des voies dans la substance des poumons , pénètre dans les bronches pour être expectoré à la suite de la toux qu'il provoque comme corps étranger , sans que souvent il en résulte de lésion sensible dans ce viscere. J'ai donné d'autres observations qui démontrent que les suppurations des poumons ont passé dans les viscères du bas ventre & y ont causé des plaies mortelles. La nature n'indique-t-elle pas par ce mécanisme qui paroît établi contre l'ordre général , qu'il existe des communications médiatees des viscères du bas ventre avec ceux de la poitrine , & de ces derniers avec ceux du bas ventre : d'après ces exemples on ne doit pas être surpris que les vices des uns de ces viscères se communiquent aux autres. J'ai observé ailleurs qu'un chyle mal digéré est très-propre à former des tubercules dans les poumons , où se fait la premiere dépuration de cette substance alimentaire.

Lorsque les obstructions des viscères du bas ventre proviennent d'un chyle mal digéré , ou d'une lymphe trop dense , on met les malades à une diete exacte ; on leur fait prendre des apofèmes purgatifs , qu'on réitere de tems en tems. On leur fait faire usage de bouillons , de décoctions de racines de plantes choisies parmi les apéritives , telles que la bardane , le bruscus , le chardon bénit , le chardon rolland , le chardon marie , la chauffe trape , la gentiane , le

pissenlit, la patience, l'ache, l'asperge, l'arrête-bœuf, la garance, &c.

On y ajoute pour infuser les feuilles de trois ou quatre plantes savonneuses, stomachiques & apéritives, telles que la chicorée sauvage, le petit chêne, la fumeterre, le pissenlit, la bourrache, la buglose, la poirée, le cassis, le cresson de fontaine, le bécaunga. Le suc épuré de trois ou quatre de ces plantes qu'on prend le matin & le soir, à la dose chaque fois de quatre ou cinq onces, agit encore plus puissamment que les infusions & les décoctions, principalement si on les passe par un filtre couvert de quarante ou cinquante cloportes écrasés en vie; on l'édulcore avec le sirop des cinq racines apéritives. On seconde très-avantageusement l'effet de ces compositions en faisant prendre une ou deux prises par jour d'opiate ou de pilules composées de savon, de gommes, d'extraits de plantes apéritives, & de quelque préparation martiale.

Si les obstructions proviennent d'une cause scorbutique, scrophuleuse ou vénérienne, on ajoute aux secours que je viens de proposer, les remèdes adoptés pour la cure de ces maladies; souvent ils suffisent seuls pour résoudre & dissiper les obstructions qui en proviennent, principalement lorsqu'elles sont scorbutiques ou vénériennes.

Les obstructions qui sont formées par une bile trop dense, ou dont la qualité a dégénéré, ont leur siège ordinaire dans le foie & dans le mésentère; lorsqu'elles sont parvenues jusqu'à la dureté, il en

réfulte des graviers , des pierres très-propres à caufér des maladies & même des Phthifies pulmonaires : je donnerai à la fin de ce chapitre une obfervation qui le confirme.

Les plantes reconnues pour remédier à la denfité de la bile , font l'aigremoine , l'éclaire , l'eupatoire , la scolopendre , le polipode , le houblon , la racine de fougere , la ferpentaire , l'hépatique , la vervaine & généralement toutes celles qui ont une vertu apéritive & favonneufe. On les emploie en infufion , en décoction , en bouillons , en fucs , en poudre & en extraits. On en fait auffi des opiates , des pilules , auxquelles on ajoute du favon d'Alicante ou de Venife & la crème de tartre , ou le tartre chalybé.

Il eft fouvent très-à-propos d'ajouter à ces remèdes , principalement aux opiates & aux pillules des purgatifs , tels que l'aloés , le diagrede , &c. pour tenir le ventre conftamment libre ; leur effet en eft plus prompt & plus efficace.

La boiffon des eaux minérales ferrugineufes convient généralement dans les obftructions des vifceres de l'abdomen , de même que les bains domeftiques , & principalement ceux des eaux minérales favonneufes , telles que celles de Plombieres , de Luxeul , de Bains en Lorraine , de Saint-Aman dans le Hainault , du Caftéra ou de Verdufan en Gafcogne , de Bagneres en Bigorre , &c.

La Phthifie pulmonaire tuberculeufe qui dépend d'obftructions dans les vifceres du bas ventre , fe manifefte en même tems que ces obftructions ou à

leur suite ; on la distingue par les symptômes qui lui sont propres (a). On fait usage dans son premier degré des mêmes remèdes que je viens de proposer, en ayant attention à différencier ces remèdes, selon la différence des causes de la maladie. Dès que la pulmonie est parvenue au second degré, on doit suivre la méthode curative déjà établie dans la seconde partie de cet ouvrage (b), sans jamais perdre de vue la cause éloignée d'où elle a pris son principe ; ce n'est qu'après avoir remédié à cette cause qu'on peut en espérer la guérison.

J'ai donné assez d'observations sur les ravages que font les Phthysies tuberculeuses compliquées avec des obstructions dans les viscères du bas ventre (c), pour en conclure qu'elles feroient incurables, si l'on négligeoit dès le commencement de leur premier degré de remédier en même tems aux obstructions & aux tubercules.

Malgré la nécessité d'observer ces règles générales, la nature fait voir de tems en tems qu'elle a des ressources supérieures à celles de l'art, & qu'elle guérit des maladies regardées comme incurables. La guérison de la Phthysie pulmonaire de M. l'Abbé Guer... en est un exemple également extraordinaire & frappant ; j'en ai donné l'observation dans la première partie de cet ouvrage (d). Après trois ans de souffrances, ce malade étoit réduit au dernier degré de Phthysie, marqué par les symptômes les

(a) Prem. Partie, Sect. 1. Ch. 3. (b) Sect. 1. Ch. 2 & 3. art. 2 & 3.

(c) Prem. Part. Sect. 4. Ch. 5. (d) Prem. Part. Sect. 4. Ch. 4. p.

plus alarmans , cependant il guérit radicalement dans un tems où toute l'intelligence humaine ne pouvoit qu'annoncer la fin de ses jours. Je ne le vis qu'à la considération de celui qui avoit demandé mon secours. Je fus effrayé de sa maigreur extrême & surpris de ce qu'il vivoit encore , dans l'état déplorable auquel il étoit réduit. J'examinai les viscères du bas ventre , je m'aperçus d'une sensation douloureuse dans la région de la vésicule du fiel , elle étoit plus sensible en y pesant un peu plus de la main ; je soupçonnai que cette sensation étoit causée par des concrétions bilieuses , d'autant mieux que le foie me paroissoit plus volumineux que dans l'état naturel. Je m'attachai à ce symptôme , je prescrivis l'usage du suc épuré de poirée , édulcoré avec le sirop violat , à la dose de deux onces toutes les quatre heures , hors le tems du sommeil & de la digestion. Je ne fus pas peu surpris lorsque je m'aperçus , après quelques jours de cet usage , que le malade rendoit des pierres biliaires par la voie des garde-robes ; je les fis examiner de plus près , on en sépara plus de soixante dans l'espace de huit jours (a). Dès ce moment tous les symptômes de la maladie commencerent à se mitiger ; je secondai la nature en faisant succéder au suc de poirée des remedes propres à déterger les ulceres des poumons , à modérer la toux , à garantir la masse du sang de la contagion du pus. Je faisois principalement usage d'infusions , de décoctions , de suc de plantes vulnéraires , qu'on édulcoroit avec un sirop com-

(a) Voy. *Ibid.*

398 T R A I T É D E L A P H T H I S I E
posé de fucs de marrube blanc & de lierre terrestre , avec le sucre rosat ; la boisson ordinaire étoit une infusion de mille-feuille , avec le mucilage de gomme adragant. Je fis prendre ensuite des eaux Bonnes coupées avec le petit lait ; l'usage du lait de vache coupé avec l'eau de chaux seconde rétablit le malade dans son embonpoint ordinaire.

SECTION CINQUIEME.

Méthode préservative & curative de la Phthisie pulmonaire , occasionnée par des Métafastes.

CH A P I T R E P R E M I E R.

Méthode générale , préservative & curative de la Pulmonie qui provient de Métafastes.

LORSQUE les métafastes se font de l'intérieur du corps à l'extérieur , & que la matiere qui se déplace s'évacue par quelque voie , on doit les considérer comme des crises salutaires , & ne pas négliger les moyens propres à les rendre parfaites. Il est essentiel d'observer dans ces circonstances la nature de la matiere déplacée , & les parties avec lesquelles elle est déterminée ; si elle est sanguine , elle forme à la superficie des éruptions phlogistiques , où elle s'évacue par quelque voie. Si , dans le premier cas , la couleur de la peau n'est pas trop animée ; si les incommodités qui ont précédé la métafase se mo-

derent sensiblement , & si le malade ne ressent pas de mal-aise , ou des inquiétudes dans les entrailles , dans les viscères ou dans les membres , on favorise les éruptions par des infusions de plantes délayantes & diaphorétiques , par une diète exacte , par le repos du corps & la tranquillité de l'ame. Lorsque les éruptions se dissipent , on rend les boissons plus diaphorétiques , & lorsqu'elles sont dissipées , on doit provoquer & exciter le cours des urines par des infusions de plantes propres à produire cet effet. On en vient ensuite à de légers purgatifs que l'on réitere de tems en tems pour évacuer le reste des humeurs étrangères retenues dans les vaisseaux du sang de la lymphe. On observe la même méthode dans toutes les éruptions bénignes , de quelque nature qu'elles soient.

Si au contraire les éruptions phlogistiques donnent à la peau une couleur rouge & animée , si la fièvre survient , si l'on a des inquiétudes dans le corps , la crise n'est point parfaite ; on a recours à des saignées très-modérées ; si elles étoient copieuses elles diminueroient ou supprimeroient les éruptions & donneroient lieu à des maladies plus graves , telles que des métastases dans les viscères , & principalement dans les poudons. On seconde l'effet des saignées par des boissons délayantes , & par des lavemens émolliens , & même si la peau étoit trop sèche , par des bains domestiques très-ménagés. Les malades doivent observer une diète exacte & sévère , & ne se permettre pour toute nourriture que des substances liquides ou des bouillons très-légers. Ils doivent se

tenir dans un repos constant , tant en ce qui concerne les fonctions du corps que les passions de l'ame , qui , si elles étoient vives , pourroient leur devenir mortelles , en fixant dans les poumons la matiere déplacée par la métafase.

Lorsque ces symptômes sont modérés on a recours aux infusions , aux décoctions des plantes apéritives , pour déterminer par les voies de la transpiration ou des urines , les humeurs qui ont resté ou passé dans les vaisseaux du sang ou de la lymphe. Ces humeurs , de quelque nature , qu'elles soient , sont toujours étrangères à ces liquides ; dès qu'elles sont séparées de leur masse , elles sont exclues des lois de la sanguification. Les éruptions de toute autre nature qui sont accompagnées des mêmes symptômes , exigent en général les mêmes secours que l'on diversifie selon le caractère particulier à chacune d'elles.

Les métafases , dans les maladies très-aiguës , telles que les érépipellateuses , les varioliques , celles de la rougeole , les miliaires pourprées , &c. sont trop inflammatoires pour causer d'abord des phthisies pulmonaires. Celles-ci sont de la nature des maladies chroniques ; on doit les considérer quand elles proviennent de métafase , à la suite des maladies aiguës , comme maladies secondaires , auxquelles on ne feroit pas exposé sans doute , si les premières avoient été parfaitement jugées. Quand on a le malheur d'être pris de phthisie après des maladies aiguës du caractère des précédentes , elle est annoncée quelque tems avant par une guérison masquée ,

par une petite toux sèche qui devient insensiblement humide, & peu de tems après purulente. C'est enfin une phthisie des plus dangereuses qui parcourt rapidement ses différens degrés. Il est triste, si quelquefois on peut en attribuer la cause à la négligence ou à l'imprudence de n'avoir pas donné assez d'attention à la maladie aiguë qui l'a précédée. La méthode curative des phthisies de cette espece est la même que celle qui est établie dans la seconde partie de cet Ouvrage (a).

Les métastases qui se font dans les poumons, des éruptions cutanées, telles que les dartreuses, les psoriques, les scrophuleuses, les suppurations habituelles, &c. affectent la délicatesse de ce viscere, au point qu'elles l'ulcerent, le corrodent & le détruisent jusqu'à ce que ses fonctions soient totalement éteintes. On ne sauroit remédier efficacement à ces especes de phthisies que par des secours propres aux maladies dont elles ont pris leur principe & dont elles retiennent le caractère : on allie ces remèdes avec ceux qui sont indiqués par les symptômes de la phthisie dans ses différens degrés.

La diminution, ou la suppression de quelqu'une des évacuations naturelles ou habituelles, quelle qu'en soit la cause, est souvent suivie de métastases qui se fixent ordinairement dans quelqu'un des viscères, principalement dans les poumons. Les évacuations dont le dérangement occasionne le plus souvent ces accidens, sont celles des hémorroïdes,

(a) Sect. 2, Ch. 2, art. 2 & 3.

des secours périodiques des femmes, des fleurs blanches, des lochies, du lait, des suppurations des vieux ulcères, &c. La Phthisie pulmonaire est l'accident le plus fréquent & le plus à craindre à la suite du désordre de quelqu'une de ces évacuations. Il est moins difficile, dans des circonstances aussi graves, de prévenir la Phthisie pulmonaire que de la guérir. Comme les suppressions sont toujours suivies de phlogose ou d'inflammation, la saignée est toujours nécessaire pour prévenir les suites de l'une & de l'autre, on fait usage en même tems de fomentations émollientes, de bains domestiques, de boissons délayantes, de juleps tempérans, calmans, de lavemens émolliens; on observe un régime de vie doux & humectant, jusqu'à ce que la phlogose & l'inflammation soient dissipées. On fait prendre alors pendant quelques jours des aposemes laxatifs, qu'on rend ensuite purgatifs, pour faire une diversion plus efficace des humeurs qui menacent de se fixer à la poitrine. On fait usage ensuite de décoctions de plantes apéritives & diaphorétiques, dans lesquelles on fait fondre par chaque deux livres de quinze grains à un scrupule, de sel de genest, de chardon bénit, ou de nître purifié. Si les évacuations supprimées ne se rétablissent pas par ces secours, on réitere les aposemes, & on a recours aux moyens les plus propres à les provoquer, selon leur espece, sans faire violence à la nature ni à la délicatesse des viscères ou des parties qui en sont les organes. Si malgré ces secours employés par des

gens de l'art en état d'en faire usage à propos , on n'a pas le bonheur de garantir la poitrine de la Phthisie pulmonaire , on peut avoir recours à la méthode curative qui est exposée dans le deuxieme chapitre de la seconde section de cette partie.

C H A P I T R E I I.

Méthode préservative & curative de la Phthisie pulmonaire , occasionnée par la diminution , ou suppression de l'écoulement des hémorrhoides

J'AI rapporté dans le deuxieme chapitre de la cinquieme section de la premiere partie de cet Ouvrage , des observations concernant les accidens qui sont les suites des métastases occasionnées par la diminution ou la suppression du flux hémorroïdal , périodique ou habituel. Ces accidens sont ordinairement l'effet d'un sang retenu dans les vaisseaux de ce genre. Ces métastases se portent souvent & se fixent dans la substance des poumons ; lorsqu'elles sont promptes & violentes , elles causent dans ce viscere des délabremens alarmans & souvent funestes. Lorsqu'elles sont moins promptes & moins violentes , il s'ensuit des Phthisies pulmonaires , toujours dangereuses , toujours à craindre , principalement si le flux hémorroïdal ne se rétablit pas dans l'ordre ordinaire.

Un Officier général des armées du Roi , homme fort & robuste , étoit sujet à un écoulement habituel

des hémorroïdes, il n'étoit pas de jour qu'il ne rendît un peu de sang par cette voie; sa santé étoit parfaite. Cette évacuation étoit très-diminuée & comme suspendue depuis cinq à six jours, lorsque dans la nuit du 25 du mois de Mars de cette année 1782, il fut pris de frissonnemens & d'un mal-aise général. Le lendemain 26, dans la matinée, il tomba tout-à-coup dans une syncope très-alarmanante, dont il ne revint qu'à la faveur d'une expectoration, de crachats abondans, d'un sang noir, épais, gluant, corrompu très-fétide & semblable à la poix. Je fus appelé quelques heures après cet accident, la fièvre étoit très-forte & les crachats de la même nature, le pouls plein, dur, fréquent & très-lourd; le malade étoit d'un accablement extrême, & plongé dans une espece de sommeil, que les Médecins reconnoissent sous le nom de *comavigil*. J'eus d'abord recours à deux saignées du bras & successivement à trois du pied, & à l'application de sang-sues à la marge de l'anüs, que l'on réitéra jusqu'à trois fois. J'employai en même tems des boissons délayantes, des potions tempérantes, sans narcotique, des lavemens émolliens, des fomentations sur l'abdomen, parce que le malade, outre son assoupissement, ressentoit une douleur à la poitrine du côté droit sous la mamelle, & une autre à l'épaule du même côté; ces trois symptômes démontroient évidemment que la métastase du sang hémorroïdal avoit porté en même tems au foie, à la poitrine & à la tête. On appliqua dès les premiers jours un emplâtre vésicatoire à la nuque,

tant par rapport à l'affaîssement comateux, qu'à une humeur dartreuse qui se portoit de tems en tems & très-fréquemment en différens endroits de la tête & du visage. Le septieme jour, les symptômes précédens étoient les mêmes; j'observai d'ailleurs que le ton des arteres fléchissoit, que leurs pulsations tendoient à la mollesse, & que les urines prenoient un plus mauvais caractère. Dès le même jour, il se déclara un hoquet, qui devint dans la nuit très-violent & presque continuel; il fut suivi le lendemain d'un vomissement de tout ce que le malade prenoit, même par cuillerées. Le onzieme jour ces symptômes commencerent à se modérer; c'étoit l'effet des fomentations, des délayans, des calmans, des anti-spasmodiques & des anti septiques, dont on faisoit un usage constant & varié selon les circonstances. Tout ensuite alla de mieux en mieux; le seizieme jour le malade étoit hors de danger. Sa guérison fut terminée par des tisanes laxatives, par les garderobes & par des purgatifs réitérés. C'est ainsi que se termina une maladie dont la complication des symptômes étoit presque sans exemple. Tels sont les effets violens des métastases hémorroïdales; s'ils sont moins prompts lorsque les métastases sont modérées, ils n'en sont pas moins dangereux, puisqu'ils donnent lieu à la Phthisie pulmonaire (a). Le malade fut pris quelque tems après d'un cours de ventre dont il mourut.

Un jeune homme âgé de 25 ans, souffroit cruel.

(a) Voy. prem. Part. Sect. 5. p. 1.

lement d'hémorroïdes ; elles étoient si engorgées & si gonflées , qu'on fut obligé d'en faire l'opération. Un mois après l'ulcere ne se consolidoit point, le malade commença à tousser , la toux fit des progrès , elle fut suivie de crachats visqueux & purulens , la quantité en augmentoit tous les jours , il vomissoit presque tous ses alimens ; de jour en jour il perdoit ses forces, & il commençoit à s'établir une dyarrhée. Comme les remedes dont on faisoit usage ne produisoient aucun bon effet, on appella Hoffman, qui employa utilement la méthode curative suivante.

Cet Auteur ordonna d'abord l'usage d'une décoction de racine d'esquine , de fause-pareille , d'escorfonnere , de bois de sassafras , d'herbes de fani-cle , de pulmonaire , de marrube blanc ; on y ajoutoit des figes & des raisins.

Comme le malade étoit fatigué par des vomissemens fréquens , il lui conseilla l'usage de son élixir visceral , coupé avec moitié de sa liqueur anodine minérale & d'essence d'écorce d'orange.

Avec ces remedes , il faisoit prendre de la crème d'orge , avec des amandes douces , un jaune d'œuf & du sucre candi ; il y ajoutoit de tems en tems une cuillerée d'huile d'amandes douces.

Il donnoit tous les soirs un gros de pilules composées de bol d'Arménie , d'extrait de mille-feuille & de camomille , parties égales.

Il fit ouvrir deux cauterés , un à chaque bras , qui rendoient des ichorosités putrides ; outre ces secours il fit faire une saignée du pied très-ménagée.

L'usage de ces remèdes continués pendant six semaines rétablit totalement la santé du malade (a).

Le Bourgeois de campagne dont j'ai rapporté l'histoire (b), avoit les hémorroïdes si gonflées, si phlogosées, si douloureuses & si fistuleuses, que l'usage du cheval, qui lui étoit absolument nécessaire, lui étoit devenu impraticable; il n'avoit d'autre ressource que celle de l'opération. On la lui fit avec un succès si marqué, qu'il n'en résulta point d'inconvénient; au contraire, il guérit en même tems de la Phthisie pulmonaire, qui seroit devenue incurable si l'on n'avoit pas coupé le bourlet hémorroïdal. Je préparai le malade à cette opération, par une diète sévère qu'il observa pendant un mois; il ne se nourrit pendant tout ce tems, que de potages aux herbes, des légumes, de crêmes de ris, de gruau, &c. Il prenoit tous les matins un bain domestique, & après le bain, environ deux livres de petit lait clarifié, dans lequel on délayoit tous les huit jours deux onces de casse mondée. Je lui fis faire une saignée du bras le quinzième jour de ces usages; on lui en fit une seconde huit jours après, & on la réitéra la veille de l'opération. Il prenoit tous les deux jours un lavement émollient, à la suite duquel il restoit une demi-heure sur une chaise percée à la vapeur du lait, & ensuite on appliquoit sur les hémorroïdes l'onguent de linair, qui est le meilleur topique que je connoisse pour ramollir les hémorroïdes phlogosées, & pour en calmer les douleurs.

(a) Hoffman, tom. 3. p. 296. (b) Prem. Part. Sect. 5. Ch. 2.

On laissa dans l'opération, je l'ai déjà observé, un bouton hémorroïdal, par lequel il se fit ensuite un écoulement très-moderé qui étoit comme périodique. La toux diminua pendant le régime de vie que le malade observoit avant l'opération, & les crachats, à la fin, ne paroissoient presque pas purulens. La plaie fut guérie dans quinze jours, pendant lesquels le malade observa le même régime de vie qu'avant l'opération. Il fit usage pendant tout ce tems, d'une décoction de racines de polipode de chêne, dans laquelle on faisoit infuser des fleurs de tussilage & de pié-de-chat, on l'édulcoroit avec le miel de Narbonne.

Pendant ces usages, tous les symptômes de pulmonie se dissipèrent, les hémorroïdes ne furent plus incommodes; le malade jouit ensuite d'une santé parfaite. Il dut sans doute le succès de l'opération à la pureté de son sang; s'il eût été affecté de quelque vice étranger, j'aurois eu l'attention de remédier à ce vice avant de le faire opérer.

On a vu dans le même chapitre l'histoire de la Phthisie pulmonaire d'un Chirurgien de mérite très-instruit qui s'étoit fait faire l'opération de la fistule à l'anus, pour remédier à des engorgemens fistuleux des vaisseaux hémorroïdaux. Deux ans s'étoient écoulés depuis cette opération, sans qu'il en fût survenu d'incommodité. Il fut pris alors d'une toux violente, à laquelle succéda un crachement de sang; le pus vint à la suite de l'hémorragie, & bientôt le marasme s'établit, il faisoit des progrès. Ces

état avoit augmenté considérablement, lorsque quelque tems après on m'appella au secours du malade. Je le trouvai à ma première visite accablé d'une fièvre continue très-aiguë, d'une toux forte & fréquente, d'un crachement abondant de sang & de pus. Je pris les moyens les plus propres pour modérer la fièvre & la toux qui étoient dans ce moment les symptômes les plus dangereux & les plus à craindre. Quoique cette maladie fût déjà chronique, je la considérai d'abord comme très-aiguë, je fis faire deux saignées du bras, on ne tira dans chacune qu'environ six onces de sang. Le malade fit usage pour boisson ordinaire de petit lait clarifié, édulcoré avec le sirop de guimauve; deux fois le jour il prenoit une émulsion composée d'amandes douces & de semence de pavot blanc avec le sirop de tussilage: on ne lui permettoit que des bouillons de poulet très-légers, & en petite quantité: on lui donnoit chaque jour deux lavemens émolliens. Par le moyen de ces secours, les symptômes de la maladie se modérèrent, & la fièvre reprit le caractère de fièvre étiq.

Après que la fièvre aiguë eut cessé, le malade rendoit encore des crachats purulens; on appliqua des vésicatoires à l'un des bras, dont on entretint la suppuration. Il fit usage des sucres de poirée, de bourrache & de mille-feuille, édulcorés avec le sirop du chantre, d'infusion de plantes vulnérables adoucies avec le sucre rosat, & de pilules composées de sagapœnum, de galbanum, de camphre &

de baume du Canada. On avoit recours aux calmans narcotiques dans le cas d'insomnies, & à des loochs béchiques pour modérer la toux & pour faciliter l'expectoration. Un long usage de ces remedes, variés selon que l'exigeoient les différentes indications, guérit radicalement cette maladie; le malade jouit encore aujourd'hui d'une santé parfaite.

CHAPITRE III.

Méthode préservative & curative de la Pulmonie, occasionnée par la Métaïase des secours périodiques du Sexe.

LES secours périodiques des femmes sont en général des évacuations qui doivent s'établir d'après les loix de la nature (a). Ces évacuations ont lieu dans des âges déterminés, tant pour commencer que pour finir. Leur matiere est un sang surabondant dans les vaisseaux, qui doit nécessairement se faire jour par les parties de la génération. Si ce sang est retenu dans ses propres vaisseaux, il ne peut qu'engorger leurs calibres, en dilater les membranes, & les réduire à un état inflammatoire. La quantité de ce liquide s'accroît insensiblement, selon les loix de la sanguification, sa surabondance augmente, l'évacuation de son superflu devient de plus en plus nécessaire, & la rétention de plus en plus dangereuse. Dans cet état, le sang surabondant ne

(a) Voy. seconde Ptt. Sect. 3. Ch. 3.

pouvant pas se frayer des voies pour être évacué, passe dans les vaisseaux des viscères voisins, y dérange l'ordre de la circulation & celui des sécrétions; ce sont autant de principes d'engorgemens & d'obstructions propres à faire dégénérer toute la masse des liquides, à affecter le système des solides & à établir insensiblement des cacochymies, des cachexies, des Phthifies, &c.

Ces exemples ne sont que trop fréquens chez les filles, dont les règles ne paroissent pas dans le tems ordinaire, & chez les femmes lorsque cette évacuation est diminuée, suspendue ou supprimée par l'effet de quelque dérangement, de quelque accident, &c.

Les vaisseaux sanguins qui donnent le sang des règles ne conservent pas ce caractère jusques dans la cavité de la matrice; vers leurs extrémités commencent par l'expansion de leurs membranes les vaisseaux lymphatiques qui forment les trous ou les excrétoires qui fournissent ces évacuations. Le sang proprement dit, est trop dense pour pénétrer dans ces pores; ce n'est qu'aux époques des règles qu'ils sont assez dilatés par la pléthore sanguine, pour laisser échapper ce liquide goutte à goutte, jusqu'à ce que la pléthore n'ait plus lieu. Les calibres de ces vaisseaux excrétoires se resserrent alors par leur propre ressort, & ne donnent passage qu'à une rosée lymphatique, qui sert à humecter la cavité de la matrice. On doit donc regarder ces vaisseaux excrétoires comme lymphatiques, puisque ce n'est que pour l'écoulement des règles qu'ils deviennent sanguins.

Si les calibres des vaisseaux lymphatiques utérins ne sont pas assez dilatés chez les filles, dans le tems des premières époques des règles, le sang superflu est retenu dans ses propres vaisseaux, il les surcharge par sa quantité ; les vaisseaux sanguins s'engorgent successivement à proportion que la pléthore sanguine augmente, les viscères s'obstruent, les sécrétions se dérangent, se dépravent ; la masse du sang s'appauvrit & se décompose insensiblement. De-là des appétits défordonnés, des pâles couleurs, des fièvres lentes, des débilités, des foiblesses, des syncopes & enfin tous les symptômes d'une cachexie confirmée, dont les suites sont toujours dangereuses & quelquefois funestes.

Le sang surabondant des règles, retenu dans les vaisseaux des viscères de l'abdomen, se porte souvent dans les poumons par métastase, & y occasionne des engorgemens, des érosions ou des ruptures des vaisseaux, qui conduisent à des Phthysies dont on ne fauroit espérer la guérison qu'après avoir obtenu des ressources de la nature, ou des secours de l'art l'évacuation naturelle de ce fluide superflu. Ces métastases sont plus fréquentes chez les femmes dont les secours périodiques sont supprimés par de vives passions de l'âme, telles que la surprise, la colère, la crainte, la tristesse, &c. On doit aussi observer qu'il survient des Phthysies à la suite des métastases occasionnées par des obstructions, des cacochimies, &c. qui ne sont pas moins dangereuses que celles qui proviennent des passions de l'âme, parce

que le sang est altéré, décomposé & surchargé d'humours étrangères propres à rendre plus graves les impressions qu'il fait dans la substance des poumons.

Lorsque les pores excrétoires de l'*utérus* ne sont pas assez dilatés chez les filles pour permettre l'écoulement du flux menstruel, dans le tems où la nature en a établi la nécessité, on doit mettre en usage les secours les plus propres à rendre ces voies praticables. On est plus heureux dans la méthode préervative des métastases qui sont les suites de ces désordres, qu'on ne l'est dans la méthode curative des pulmonies qui en proviennent.

Dans ces circonstances on a égard à la pléthore sanguine, elle est d'abord particuliere aux viscères du bas ventre, & bientôt elle devient générale dans tout le corps. Tout est dans un état de phlogose dans ces premiers dérangemens; ils conduisent à la langueur par leur durée.

On remédie à la pléthore générale par des saignées du bras, celles du pied seroient nuisibles dans les engorgemens sanguins des viscères du bas ventre; les premières retardent le progrès des engorgemens de ces viscères, en augmentant la rapidité de la circulation du sang dans la colonne qui le porte vers les parties supérieures; cette diversion fait que ce fluide se distribue en moindre quantité dans les inférieures, & que les engorgemens déjà formés dans les viscères, en faisant moins de progrès, opposent moins de résistance aux ressources de la nature & aux secours de l'art. Les saignées du pied

feroient un effet tout opposé en déterminant par un mécanisme semblable vers le bas ventre , une plus grande quantité de sang dans les viscères en souffrance. On a recours en même tems à des bains domestiques , à des boissons délayantes , légèrement apéritives , à celle d'eaux minérales gazeuses , à un régime de vie doux & humectant , à des exercices modérés & à des amusemens agréables ; on doit sur-tout se garantir des vives passions de l'ame.

La partie rouge du sang ne peut pas être long-tems dans un état de pléthore , sans éprouver du dérangement dans ses principes. C'est là que commence l'apauvrissement de la masse de ce liquide ; sa densité diminue insensiblement , le ressort des solides fléchit dans la même proportion , la cacochymie s'établit , le désordre des fonctions en est la suite ; de là , des langueurs qui conduisent à la cachexie , à un dépérissement général qui , souvent , élude toutes sortes de secours.

Cet état d'apauvrissement de la masse du sang s'annonce par des dégoûts , par des langueurs , des oppressions , des étouffemens , des palpitations de cœur , &c. Ce dépérissement ne doit pas faire désespérer des malades qui en sont affligées , il a différens degrés , dans lesquels la nature secondée par des secours donnés à propos , parvient enfin à développer les vaisseaux excrétoires utérins. Il paroît un suintement d'humeurs lymphatiques qui prennent insensiblement une teinte jaunâtre. A la suite de ce suintement , on s'apperçoit d'un sang décoloré , en petite

quantité , qui n'est pas ordinairement de durée ; il cesse , il revient dans des tems irréguliers , & enfin après de longues langueurs les regles s'établissent dans l'état naturel.

Dès qu'on s'apperçoit de quelque signe qui annonce que le sang commence à se décomposer , il ne doit plus être question de saignées , & on modere l'usage des bains ; ce ne seroient plus des secours , mais des moyens propres à apauvrir de plus en plus la masse de ce liquide. Les remedes les plus convenables pour retarder les progrès de la dissolution du sang & du relâchement des fibres des solides , sont des infusions , des décoctions , des bouillons , des suc épurés des plantes choisies dans les classes des ameres favonneuses , des toniques , des anti-septiques & des anti-scorbutiques. Les différentes préparations martiales , principalement le safran de Mars & l'éthiops martial ; leur bon effet est constaté par un nombre d'observations. Le sang décoloré , presque dissous dans cette maladie , se rapproche sensiblement par leur usage de sa densité ordinaire , & reprend sa couleur naturelle. On fait prendre en même tems des opiates stomachiques , auxquelles on ajoute l'aloës soccotrin & l'extrait de rhubarbe ménagés de façon qu'ils ne fassent qu'entretenir la liberté du ventre sans causer d'irritation.

Les métastases des secours périodiques , diminués ou arrêtés dans leurs époques , sont souvent prompts & violentes , sur-tout lorsque ces accidens sont survenus à l'occasion de vives passions de l'âme. Les

vaisseaux des poumons sont alors engorgés subitement par un sang superflu qui a déjà dégénéré de sa nature ; leurs calibres en sont forcés , leurs membranes se rompent , se déchirent , & l'hémoptysie qui en survient est proportionnée à leur délabrement. Les saignées du pied réitérées jusqu'à plusieurs fois , l'application des sangsues à l'orifice du vagin , les lavemens émolliens , les bains , les émulsions , les boissons tempérantes , calmantes , la diete , le repos , sont dans ces momens scabreux des secours essentiels , qu'il faut mettre promptement en usage pour prévenir l'inflammation , les ulcères & la Phthisie pulmonaire qui en est la suite.

Lorsque la diminution ou la suppression des regles proviennent d'embarras chroniques dans les viscères du bas ventre , d'une lymphe trop épaisse , d'un vice scrophuleux , scorbutique , &c. les métastases en sont moins promptes & moins violentes. Les métastases de ce caractère sont indiquées d'avance par des toux seches , par un mal-aise général , par des serremens de poitrine , des oppressions , &c. Dans tous ces différens cas les remedes convenables pour en prévenir le suites , doivent être les mêmes que ceux que je viens d'indiquer pour les métastases violentes ; mais on doit avoir l'attention de les modérer selon les différens symptômes , leurs différens degrés & selon le tempérament des malades. Si malgré ces secours on ne peut pas prévenir la Phthisie pulmonaire , on emploie , pour y remédier les mêmes moyens qui sont indiqués dans la méthode curative

de la Phthisie essentielle (a), sans jamais perdre de vue le caractère de la maladie, ses causes éloignées & ses différens degrés.

CHAPITRE IV.

Méthode préservative & curative de la Pulmonie occasionnée par la Métafaste des lochies dans les poumons.

L'ÉCOULEMENT de sang & d'humeurs qui se fait par les voies de la génération, immédiatement après l'accouchement, n'est que le superflu de ces fluides dans les vaisseaux & le tissu cellulaire des viscères du bas ventre, de la matrice & des parties qui en dépendent. La nature toujours prévoyante, principalement en ce qui concerne la génération & la propagation de l'espèce humaine, dispose ainsi ces humeurs pendant la grossesse, non-seulement pour servir à la nourriture du fœtus, mais encore pour fortifier la matrice, afin qu'elle puisse s'étendre assez pour contenir commodément le fœtus dans tous les degrés de sa croissance (b). Dès le moment de l'accouchement, ces humeurs deviennent étrangères & superflues, leur séjour dans ce viscère seroit dangereux, pernicieux & mortel (c).

Peu de tems après l'accouchement, les vaisseaux & le tissu cellulaire de la matrice commencent à se

(a) Seconde Part. Sect. 2. Chap. 2.

(b) Voy. première Partie, Section 5. Chap. 4.

(c) Voy. *ibid.* & le Traité des maladies des femmes en couche, p. 76. & suiv.

resserrer par leur propre ressort ; ce mécanisme diminue le diamètre de leurs calibres ; les humeurs superflues qu'ils contiennent sont déterminées par cette compression vers les orifices encore béans des pores & des vaisseaux qui aboutissent dans la cavité de ce viscere. Les fibres membraneuses du corps de la matrice, sont dans ces circonstances d'une irritabilité extrême & d'une sensibilité très-exquise ; le moindre agacement les irrite & les met dans un état spasmodique violent ; les orifices des vaisseaux excrétoires en sont obstrués de façon qu'il ne reste plus d'issue à l'écoulement des humeurs étrangères dont ils sont engorgés. C'est de là que partent les métastases de ces humeurs dans les différens viscères , & principalement dans ceux de la poitrine.

Les causes les plus ordinaires de ces accidens sont des meurtrissures, des plaies, des déchirures, des contusions de la matrice ; le froid, les excès dans le régime de vie, les remèdes échauffans, la fièvre, l'inflammation, les vives douleurs, & principalement une peur soudaine, un saisissement, une surprise, la crainte, & généralement toutes les passions de l'ame, sur-tout quand elles sont excessives.

Les symptômes des lochies supprimées & les signes qui caractérisent leurs métastases, sont, quand elles portent à la tête, des douleurs, des pesanteurs, des propensions au sommeil ; des délires, des convulsions, des foiblesses, des syncopes, des apoplexies. Lorsqu'elles affectent les viscères de l'abdomen, ce sont une fièvre aiguë, des éréthismes

douloureux, un pouls foible & fréquent, des éruptions pourprées, des inflammations aux entrailles, des jaunisses, des cours de ventre colliquatifs. Lorsqu'elles se fixent à la poitrine, ce sont des toux violentes, des étouffemens, des palpitations de cœur, des crachemens de sang, des douleurs aux mammelles, aux lombes, des inflammations à la plevre, aux poumons, des sueurs, symptomatiques, &c.

On doit juger par la violence de ces symptômes que les métastases des lochies sont toujours redoutables, principalement quand elles se fixent dans les viscères ou dans les entrailles. Lorsqu'elles ne sont pas jugées en peu de jours par des crises parfaites, elles laissent après elles des affections chroniques toujours pleines de danger. Ce sont à la tête, des vertiges, des démençes, des folies; au bas ventre des engorgemens, des obstructions, dont les suites sont des Phthysies nerveuses, des jaunisses, des hydropisies; à la poitrine des palpitations de cœur, des polipes, des aneuvrismes, des Phthysies pulmonaires qui ne guérissent pas sans les secours de l'art. Je me bornerai à ces dernières, dans l'exposition de la méthode préservative. Pour ce qui est des moyens de les guérir, ils sont les mêmes que ceux que j'ai proposés dans le second chapitre de la seconde Section de cette Partie.

Dès qu'il se déclare à la poitrine quelque symptôme qui indique que la métastase des lochies se porte vers quelqu'un de ses viscères, on doit d'abord

avoir recours à la saignée du bras pour diminuer l'engorgement des vaisseaux des poumons , & à celle du pied dans le cas où l'abdomen ne seroit pas météorisé ; s'il l'étoit, elle seroit nuisible. On réitere les saignées selon la violence du mal & selon les forces des malades. On fait des fomentations émollientes sur l'abdomen , on met les pieds dans l'eau , le soir & le matin ; on fait usage de boissons délayantes , légèrement émulsionnées , de juleps calmans avec les eaux distillées de buglose , de pourpier , de coquelicoc , de laitue ; on y en ajoute ensuite de diaphorétiques , telles que celles de scabieuse , de mélisse , de chardon béni qu'on édulcore avec le sirop de nénuphar ou de russilage ; de tems en tems lorsque la toux est violente , & dans les insomnies , on leur substitue ceux de diacode ou de karabé. On donne chaque jour deux ou trois lavemens émolliens , toujours nécessaires dans cette maladie , tant pour débarrasser les entrailles des matieres excrémenteuses qui , en y croupissant les irritent , que pour servir de bains intérieurs à la matrice , qu'on ne doit jamais perdre de vue dans la méthode curative des métastases utérines. Je me suis servi avec succès dans ces circonstances épineuses de l'eau de casse très-légèrement émétisée ; si l'on obtient par son usage ménagé avec sagesse une espece de diarrhée , on voit bientôt tous les symptômes de la métastase diminuer , se dissiper , & l'écoulement se rétablir par ses voies ordinaires.

La nourriture doit être très-légere ; le petit lait

ou bien l'eau de poulet ou de veau sont suffisans dans les premiers jours de la maladie. Si les malades sont très-foibles on les soutient avec quelque cuillerée à bouche de gelée de poulet. Si vers le septieme jour il se déclare une légère sueur suivie de modération dans les symptômes de la maladie, on doit la considérer comme une crise salutaire qu'il est essentiel de favoriser par des infusions de plantes diaphorétiques. Si l'on donne des remedes trop forts pour provoquer les sueurs avant qu'elles ne se déclarent naturellement, on n'en obtient point; si l'on fait usage de remedes de cette nature, lorsque les sueurs ont paru, on les supprime, & l'on rend toujours plus graves les symptômes de la maladie, lorsqu'on a la témérité d'employer ces pernicioeux moyens. J'ai rapporté une observation d'Hoffman; concernant une femme en couche qui, au lieu de lochies, ne rendoit qu'une sérosité limpide; on fit usage de remedes toniques & apéritifs qui donnerent la fièvre & météoriserent l'abdomen au point que l'on craignoit pour ses jours. Hoffman fut appelé à son secours, il la fit saigner & lui fit prendre des boiffons adoucissantes, rafraîchissantes & calmantes, qui lui procurerent le septieme jour de la maladie une sueur abondante qui dura deux fois vingt-quatre heures, & la malade guérit (a).

J'ai rapporté, dans le même chapitre, une autre observation concernant une femme dont les lochies se supprimerent d'abord après l'accouchement; cette suppression fut suivie de symptômes violens qui

(a) Premiere Partie, Sect 5. Chap. 4.

avoient été occasionnés plutôt par des remèdes échauffans que par la maladie. Ces remèdes étoient la myrrhe, l'écorce d'orange, les yeux d'écrevisse, l'ambre jaune, l'huile de canelle, le sel volatil de corne de cerf : on appela un Médecin dans cet état déplorable de la malade qui alloit jusqu'à la folie. Il la fit saigner du pied, lui donna des émulsions & lui procura du sommeil. Il survint une sueur abondante qui dura huit jours ; la violence de la maladie se modéra par ces secours, mais le coup étoit frappé, il en resta une fièvre lente qui termina ses jours, vers l'équinoxe d'automne.

J'ai déjà observé que, lorsque la métastase des lochies se porte à la tête, les symptômes de l'abdomen se modèrent, & que son météorisme se dissipe. Il n'en est pas de même lorsque la métastase s'est fixée à la poitrine, le bas-ventre reste toujours météorisé, ce qui fait que la saignée du pié seroit nuisible dans celle-ci, & qu'elle est nécessaire dans l'autre.

Les sueurs & les diarrhées sont les véritables crises de la métastase des lochies ; on a vu mille exemples des bons effets des premières ; ceux des autres ne sont pas moins fréquens ni moins heureux ; j'ai inséré, dans le Chapitre que je viens de citer, une observation de Bartholin qui le confirme. La femme de ce Médecin fut guérie d'une diminution alarmante des lochies, par une diarrhée qui suppléa à l'évacuation utérine.

Je fus appelé dans le mois d'Avril de l'année 1768,

auprès d'une Dame âgée de dix-sept ans , qui avoit accouché depuis trois jours , sans qu'il eût encore paru , qu'une modique évacuation séreuse & putride. Je la trouvai accablée d'une fièvre très-violente , d'un serrement de poitrine & d'une oppression si considérables , qu'elle ne pouvoit tousser qu'avec des douleurs & des détresses cruelles. L'abdomen étoit douloureux & météorisé , principalement à la région de l'hypogastre. Je la fis saigner du bras , trois fois dans les vingt-quatre heures. On faisoit en même-tems , sur toute la capacité du bas-ventre , de fréquentes fomentations émollientes , que l'on continua jusqu'au déclin de la maladie. Comme le cas étoit grave & pressant , on lui donnoit toutes les quatre heures un demi-lavement composé d'une décoction de graine de lin , de racines de guimauve & de feuilles de molene , plutôt pour lui servir de bains intérieurs , que de purgatifs. La boisson ordinaire étoit le petit lait , & une décoction de graine de lin , dans laquelle on faisoit infuser des fleurs de mauve & de nénufar. On ajoutoit le soir , à un petit verre de cette tisane , une demi-once de sirop de karabé.

L'usage de ces remèdes diminua la violence des symptômes de la poitrine , & le sixième jour , le bas-ventre étoit moins tendu & moins douloureux. La peau restoit toujours sèche , quoique moins brûlante ; cependant je ne voyois point de disposition à la sueur , ni au cours de ventre. Comme je prévoyois que la malade ne guériroit pas sans le secours

de l'une & de l'autre de ces évacuations , je la mis à l'usage d'une eau de casse , très-légèrement émé-tisée , qui procura le jour même deux garderobes très-fétides ; on continua ce remede , on en obtint tout l'effet qu'on pouvoit désirer. Les symptômes de la maladie devenoient moins graves de jour en jour ; dès le neuvieme , on s'aperçut d'un suintement de sérosités rougeâtres , qui étoit trop modique pour procurer du soulagement : je fis appliquer cinq sangsuës à l'orifice du vagin qui donnerent à-peu-près quatre onces de sang. Le suintement devint plus abondant & plus sanguinolent , il se soutint le même pendant quelques jours ; ce ne fut ensuite qu'une espece d'ichorosité rousâtre en très-petite quantité. On continua toujours l'eau de casse , en observant scrupuleusement les ménagemens qu'exigeoit l'état de la malade , qui entra en convalescence vers le quinzieme jour de la maladie ; elle a fait depuis d'autres couches très-heureuses : elle jouit encore aujourd'hui d'une santé des plus parfaites.

CHAPITRE V.

Méthode préservative & curative de la Pulmonie , provenant de Métafases du lait dans les viscères de la poitrine.

LE lait étant sorti des voies qui lui sont propres , se porte par métastase dans différentes parties du corps , & principalement dans les viscères de la

poitrine, où il ne peut que produire des effets graves & très-dangereux (a). Lorsque ces métastases se fixent dans les poumons, & que le lait se répand dans ce viscere, il en survient un absorbement général, des étouffemens, des apoplexies; lorsque les métastases sont moins promptes & moins violentes, ce sont des phlogoses, des inflammations, des fievres aiguës; si elles ne causent que de simples engorgemens dans quelques glandes des poumons, il ne s'ensuit d'abord que des phlogoses, des toux, des oppressions; la matiere laiteuse se condense ensuite, se durcit & forme des tubercules, ou si elle se corrompt, elle produit des érosions, des ulceres; de-là tous les symptômes d'une pulmonie confirmée. Les inflammations des poumons qui sont des effets de métastases considérables, parcourent tous les tems des maladies aiguës inflammatoires; si à la fin elles ne sont pas parfaitement jugées, elles dégénèrent en Phthisies pulmonaires. J'ai donné des observations qui confirment les effets de ces différentes métastases, dans le cinquieme chapitre de la cinquieme section de la premiere partie de cet Ouvrage.

La premiere de ces observations concerne une femme-de-chambre qui fut étouffée tout-à-coup, le vingt-unieme jour de son accouchement, par une métastase de lait dans les poumons, dans un tems où elle se croyoit totalement rétablie de sa couche.

La seconde observation regarde une dame qui fut affligée d'une métastase laiteuse inflammatoire

(a) Voy. Partie prem. Sect. 5. Chap. 5. & le Traité des maladies des femmes en couche.

dans les poumons six semaines après son accouchement. La troisieme a été prise de la Phthisie pulmonaire d'une autre dame , qui ne s'apperçut de son état que sept mois après qu'elle fut relevée de sa couche , quoiqu'il en existât des signes non équivoques un mois après ses relevailles.

Ces trois femmes avoient étouffé leur lait ; la premiere n'avoit aucun symptôme qui pût faire prévoir l'apoplexie dont elle mourut subitement ; il y a apparence qu'elle avoit commis quelque faute dans le régime de vie , ou qu'elle avoit été saisie de quelque vive affection de l'ame. Il se pourroit encore qu'on n'avoit pas fait assez d'attention aux évacuations nécessaires , pendant la couche , pour dissiper le lait chassé des seins & résorbé dans les vaisseaux de tous genres par la violence de sa suppression dans les réservoirs qui lui sont propres. Cet exemple frappant est bien fait pour faire tenir sur leurs gardes , des meres qui n'allaitent pas leurs enfans , & les gens de l'art auxquels elles ont confié leur santé. Je ne donnerai pas plus d'étendue aux effets de la suppression du lait & aux différentes raisons qui devroient déterminer les meres à nourrir leurs enfans ; je les ai présentées avec assez d'étendue dans le traité des fleurs blanches , & dans celui des maladies des femmes en couche.

La malade de la seconde observation se croyoit guérie , lorsque six semaines après son accouchement elle alla dans une maison de campagne pour y perfectionner sa convalescence. Ce fut cependant quel-

ques jours après qu'elle fut frappée de la métastase laiteuse qui se fixa dans les poumons, avec des symptômes alarmans ; c'étoient un serrement douloureux de la poitrine , une toux qui n'avoit presque point de relâche, une fièvre violente, des détresses & des inquiétudes générales dans tout le corps. Ces symptômes se modérèrent par l'effet des saignées du bras réitérées , par l'usage d'infusions & de décoctions de plantes délayantes & calmantes , par des loochs béchiques , par des émulsions légères composées avec des amandes douces & des semences de pavot blanc, de concombre & de melon , & le sirop de coquelicoc , auxquelles on ajoutoit de tems en tems du sirop de karabé à des doses très-modérées, dans la vue d'appaîser la toux, & de favoriser le sommeil de la nuit : on tenoit le ventre libre par le moyen de lavemens émolliens.

Dès que je m'aperçus de la diminution des symptômes de la maladie, j'eus recours à l'eau de casse émétisée , pour déterminer une diversion de l'humeur laiteuse ; j'y ajoutois de tems en tems de la manne pour rendre la diversion plus efficace , sans préjudice des infusions , des décoctions , des émulsions dont l'usage étoit déjà établi. Quelques jours après je modèrai l'usage des laxatifs , dans l'espérance qu'il se manifesteroit quelque disposition à des crises, par la voie des urines ou par celles des sueurs ; je m'aperçus bientôt que les urines devenoient abondantes & laiteuses ; je remplis cette indication par des infusions de feuilles & de

décoctions de racines de plantes diurétiques , dans lesquelles on faisoit fondre vingt grains de sel de genest pour deux livres de ces infusions. Pendant ces usages la malade prenoit chaque sixieme jour dans la matinée , de deux livres jusqu'à deux & demie , d'eaux minérales de Châtel-Guion , qui faisoient en même tems l'effet de diuretiques & de laxatifs par les garderobes. Ces usages suffirent seuls pour rétablir la santé de la malade , qui a continué jusqu'aujourd'hui d'être sans altération.

La pulmonie de la malade de la troisieme observation étoit au troisieme degré lorsqu'elle commença à faire usage de remedes propres à son état. Je la purgeai d'abord avec une infusion d'un gros de rhubarbe , dans laquelle on fit fondre deux onces de manne. Le lendemain de cette purgation on établit un cautere au bras , & elle commença l'usage des bouillons de grenouille qu'elle prenoit deux fois par jour , le matin & l'après-midi. On ajoutoit à ces bouillons des feuilles de pulmonaire , de bugle & de mille-feuille ; comme il se déclaroit déjà des sueurs nocturnes colliquatives , j'eus recours à la décoction de deux scrupules de cascarille pour chaque prise que la malade prenoit deux fois par jour , le matin & le soir aux heures les plus commodes ; on ajoutoit à chaque prise trois gros de sirop balsamique de Tolu. La boisson ordinaire étoit une décoction d'orge édulcorée avec le sirop de ruisseau. Après quinze jours de ces usages , les sueurs nocturnes se modererent , la toux étoit moins im-

portune & les fonctions de l'estomac se faisoient moins imparfaitement. Je continuai l'usage de la cascarille, & je fis prendre en forme d'opiate, immédiatement avant la prise du soir, quinze grains de conserve de cynorrhodon, quatre gouttes de baume blanc du Canada, dix grains de cachou brut, & trois grains de pilules de cynoglose. Après six semaines de tous ces usages, les symptômes de la Phthisie s'étoient presque dissipés, & dans les quinze jours suivans la malade entra en convalescence, qu'elle confirma par l'usage du lait de vache, coupé avec les eaux minérales de Saint-Myon; elle reprit en peu de tems son embonpoint ordinaire, qu'elle conserve encore aujourd'hui dans toute sa perfection. J'eus attention pendant tout le tems de la maladie à entretenir la liberté du ventre, par le moyen de lavemens & de minoratifs très-ménagés.

C H A P I T R E V I.

Méthode préservative & curative de la Pulmonie, causée par la Métaflase des fleurs blanches, dans les poudrons.

LES fleurs blanches sont rarement du même caractère; elles ont différentes qualités, selon les causes qui les produisent; ces causes sont si variées & si multipliées, qu'il n'est pas possible d'en faire le détail dans ce Chapitre. Je publiai dans l'année 1766, deux volumes in-12 sur cette maladie; on

peut y avoir recours. J'ai déjà observé (a) que les fleurs blanches considérées en général, sont des suintemens ou des écoulemens par les parties naturelles des femmes, d'humeurs séreuses, lymphatiques, chyleuses, laiteuses, muqueuses, qui prennent différens caractères, différentes couleurs, différentes odeurs, différens degrés d'âcreté, de fétidité selon la différence de leurs causes, & selon qu'elles sont plus ou moins invétérées.

Le suintement des fleurs blanches, lorsqu'il n'est que séreux & peu abondant, est supportable pendant plusieurs années; s'il provient de quelque désordre dans les viscères du bas ventre, de quelque cause étrangère, ou s'il est abondant, il débilite les malades, les affoiblit, & déränge l'ordre des fonctions animales. Bientôt le teint pâlit, il s'établit insensiblement des lassitudes spontanées, & des inquiétudes dans les membres. Il survient des nausées, des cardialgies, des douleurs aux lombes; l'appétit diminue peu-à-peu, le dérangement des fonctions de l'estomac fait des progrès, les forces déclinent, les yeux se bouffissent, l'abdomen se météorise & il s'établit une fièvre lente: les parties par lesquelles se fait l'écoulement en sont corrodées & s'ulcerent, tous les symptômes empirent, & tout concourt enfin à décider une cachexie incurable.

Les fleurs blanches ne parviennent pas toujours à ce degré qui fait désespérer des malades, elles les supportent souvent pendant le cours d'une longue

(a) Part. première, Sect. 5. Chap. 7.

vie sans que leurs jours en soient abrégés ; cependant quelque soit le caractère de cet écoulement , les métastases en sont toujours dangereuses , principalement lorsqu'elles se fixent dans la substance des poumons.

Les causes éloignées des métastases des fleurs blanches , sont les mêmes que celles des métastases des secours périodiques ; les causes prochaines des uns & des autres , sont leur diminution & leur suppression.

Lorsque la métastase des fleurs blanches s'est fixée dans les poumons , il survient une toux sèche , une difficulté de respirer , une pesanteur dans le diaphragme , un mal-aise dans tout le corps , un sommeil interrompu , des battemens de cœur , des ulcères , des suppurations , une fièvre lente qui dégénère en étiq̃ue , des sueurs nocturnes , le marasme , &c.

Une observation anatomique rapportée dans la première partie de cet Ouvrage (a) , donne un tableau bien frappant du délabrement que causent dans les poumons & dans les autres viscères de pareilles métastases ; il insinue en même tems combien la méthode curative en est scabreuse & pleine d'écueils , lorsque le suintement ou l'écoulement des fleurs blanches ne se rétablit pas par les voies ordinaires.

J'ai rapporté dans le même Chapitre d'autres observations propres à donner des espérances de gué-

(a) Sect. 5. Chap. 6.

rifon des pulmonies de cette nature , même quand elles font parvenues à un degré qui paroît défefpéré; elles font faites pour donner de la confiance aux reffources de l'art de guérir.

Ileft effentiel d'employer toutes fortes de moyens pour prévenir les métaftafes des fleurs blanches , dès qu'on s'apperçoit de quelque figne qui indique qu'elles pourroient avoir lieu. Ces fignes font leur diminution & leur fuppreffion , des inquiétudes dans les entrailles , des borborigmes ; des douleurs aux reins , des mouvemens fpafmodiques , un pouls vaporeux , irrégulier , &c. Dès qu'on s'apperçoit de quelqu'un de ces fignes , les plus prompts fecours confiftent à mettre les pieds dans l'eau modérément chaude jufqu'à un pouce au-deffus des malleoles. On fait des frictions fèches de haut en bas, fur l'abdomen, fur la région des reins, fur les cuiffes & fur les jambes. On a fouvent prévenu l'effet des métaftafes à la poitrine par l'application de ventoufes , fur les parties internes des cuiffes, près du trajet des gros vaiffeaux; ce fecours eft trop négligé dans ce fiecle. Cependant la Médecine n'en a pas d'auffi efficace dans de pareilles circonftances. Pendant que l'on emploie ces remedes , on doit faire un fréquent ufage d'infufions de plantes délayantes & diurétiques; on y fait fondre par pinte de quinze à vingt grains de nître purifié, de fel de genêt, ou de chardon bénit. On ordonne des eaux minérales gazeufes qui ne foient que très-peu martiales , telles que celles de Pougues de Seltz ou de Saint-Myon. On prend ces eaux le matin à jeun ,

jeun , à de fortes doses , pour qu'elles s'infiltrerent dans les pores des entrailles , d'où elles se fraient des routes directes vers les vaisseaux émuigens , & de ceux-ci vers les reins & la vessie. C'est l'effet ordinaire des eaux minérales de cette qualité , lorsque les premières voies en sont surchargées ; c'est un puissant secours pour favoriser l'écoulement des fleurs blanches , & pour le rétablir lorsqu'il diminue ou qu'il tend à se supprimer. On seconde cette méthode curative par l'usage de lavemens émolliens , par celui d'eaux minérales purgatives , ou par des aposemes qui aient cette propriété , par des exercices modérés & soutenus , & par un régime de vie convenable à l'état & au tempérament des malades.

Si malgré ces secours préservatifs la métastase se fixe dans les poumons , on saigne de l'un des bras , & quelques heures après on fait une saignée du pied , pourvu que le bas ventre ne soit pas météorisé ; dans ce cas on réitéreroit la saignée du bras. Les bains des pieds , les boissons délayantes , les calmantes , & tous les autres secours que l'on donne dans les maladies inflammatoires des poumons , sont convenables dans de pareilles circonstances.

Il arrive quelquefois que la métastase des fleurs blanches dans les poumons est très-lente , & qu'on ne s'en apperçoit que par la diminution de l'écoulement , & par une petite toux qui paroît d'abord ne pas mériter d'attention , mais qui en faisant des progrès , quoique peu rapides , conduit au déve-

loppement fuccessif de tous les symptômes de la Phthisie pulmonaire. Ces especes de métastases sont d'autant plus insidieuses que souvent les malades ne s'en apperçoivent que lorsque la Phthisie est confirmée.

Dans tous ces cas , tant préservatifs que curatifs , il est très-à-propos d'établir un ou deux cauterés aux cuisses. On peut les supprimer, malgré le préjugé du public , lorsque la cause de la maladie & ses symptômes sont totalement dissipés,

Il est essentiel dans la méthode curative de la Phthisie , occasionnée par la métastase des fleurs blanches , de ne pas perdre de vue le caractère qu'elles avoient avant leur déplacement ou leur métastase ; si elles provenoient d'une cacochymie qui eût son principe dans le dérangement des digestions , on allieroit des remèdes stomachiques à ceux qui feroient indiqués par les symptômes de la pulmonie. Si elles reconnoissoient tout autre principe , soit vénérien , soit scorbutique , &c. on ne sauroit guérir la pulmonie , sans avoir remédié à celle de ces causes dont les fleurs blanches étoient compliquées (a).

CHAPITRE VII.

Méthode préservative & curative de la Pulmonie, occasionnée par la Métastase du pus des ulcères & de la matiere des tumeurs.

J'AI rapporté dans la première partie de cet Ouvrage (b) huit observations concernant des Phthisies

(a) Prem. Part. Sect. 2. Ch. 2. (b) Sect. 5. Chap. 8.

pulmonaires, occasionnées par le pus des vieux ulcères & par la matiere des tumeurs répercutées & fixées dans les poulmons. La pulmonie est toujours pleine de danger, mais elle ne l'est jamais autant que lorsqu'elle provient de ces causes, ou d'autres éruptions cutanées de mauvais caractère, telles que les dartreuses, les psoriques, &c. On ne guérit pas cette maladie, à moins qu'on ne soit assez heureux que de détourner de la substance molle & délicate des poulmons des humeurs toujours propres à irriter, à corroder, à ulcérer ce viscere.

La premiere observation est prise d'un Chirurgien qui portoit depuis vingt ans une fistule à l'anus qui se cicatrifa d'elle-même; il s'ensuivit une Phthisie pulmonaire dont il mourut.

La deuxieme observation est faite sur un homme âgé de quarante ans, qui fut plus heureux que le précédent; on lui coupa le bourlet hémorroïdal pour le guérir d'une fistule; un mois après cette opération, il survint des symptômes qui caractérisoient une Phthisie pulmonaire, dont Hôffman le guérit par le moyen des remedes suivans.

Cet Auteur ordonna d'abord pour boisson ordinaire une décoction de racine d'esquine, de falsepareille, de scorfonnerie, de bois de sassafras, de feuilles de pulmonaire, de marrube blanc dans laquelle on ajoutoit des raisins & des figues.

Comme le vomissement étoit un des symptômes de cette maladie, il le fit passer avec parties égales de son élixir viscéral & de sa liqueur minérale

anodine ; il y ajoutoit un peu d'essence d'écorce d'orange. Il faisoit prendre souvent à son malade de la crème d'orge avec un jaune d'œuf & du sucre ; quelquefois il y ajoutoit une cuillerée d'huile d'amandes douces. Il donnoit presque tous les soirs aux heures du sommeil , du bol d'Arménie , d'extrait de mille-feuille & de fleurs de camomille , en forme de pillules , à la dose d'un gros. Il fit ouvrir deux cauterés aux bras , & d'ailleurs il fit tirer un peu de sang du pied. L'usage de ces remèdes , continué pendant six semaines , rétablit totalement la santé de ce malade.

La troisième observation a été faite sur un homme de Geneve , âgé de 36 ans ; il fit supprimer un seton qu'il portoit à la nuque , il en survint une Phthisie pulmonaire qui le conduisit à son dernier moment. On ouvrit son corps , on trouva dans la capacité du thorax une sérosité très-âcre , & un abcès considérable dans les poumons ; ce viscère étoit durci , sec & corrompu dans toute sa substance.

Une femme de la campagne est le sujet de la quatrième observation ; on lui extirpa une tumeur énorme située dans la partie interne du talon du pied droit ; il lui survint une douleur à la poitrine avec difficulté de respirer ; ces symptômes firent des progrès très-rapides , la malade mourut enfin pulmonique dans de cruelles souffrances ; on ouvrit son corps ; l'histoire de cette dissection anatomique est à la suite de l'observation.

Un Officier de maison fournit la cinquième ob-

fervation ; il portoit une très-grosse loupe entre les omoplates, elle devint douloureuse au point qu'il ne pouvoit plus la supporter. On l'extirpa, la plaie se cicatrifa, il se croyoit guéri. A peine la suppuration avoit-elle cessé, qu'il se déclara un toux sèche qui fut suivie de tous les symptômes de Phthisie pulmonaire. On ne fit aucun remede propre à y remédier, le malade mourut en peu de tems.

La sixieme observation est prise de la Phthisie d'une demoiselle âgée de dix ans, affligée de tumeurs scrophuleuses aux jambes répercutées par des topiques appliqués par des charlatans qui en avoient promis aux parens de la malade une entiere guérison. On m'appela trop tard ; je mis en usage tous les moyens possibles pour établir une suppuration aux jambes, je ne l'obtins que très-imparfaitement ; la Phthisie parcourut tous ses degrés, & la malade s'éteignit dans le marasme.

Un Négociant âgé de 30 ans, scrophuleux depuis l'enfance, qui avoit le cou labouré de cicatrices, & qui avoit perdu de cette maladie un doigt de la main droite, & deux du pied du même côté, est le sujet de la septieme observation. Il m'appela dans le printems de l'année 1768 pour des tumeurs à une jambe ; je le trouvai à ma premiere visite, avec une toux sèche très-fréquente, une oppression & un serrement de poitrine insupportables. J'examinaï les tumeurs ; je découvris en deux une suppuration sourde, je les fis ouvrir dans le moment, & le lendemain la toux & l'oppression étoient considérable-

ment diminuées ; la matiere qu'elles rendirent étoit semblable à du suif à demi fondu. Les autres tumeurs suppurerent successivement ; il s'établit enfin des ulceres profonds dont le pus communiquoit des uns aux autres par le tissu cellulaire ; il s'en étoit formé des especes de clapier qui rendoient la suppuration générale dans cette extrémité : cette suppuration abondante fit cesser la toux , l'oppression & le serrement de poitrine ; on n'eut plus à craindre pour les visceres de cette capacité.

Le malade fit usage pendant près de quatre mois, d'une décoction d'esquine , de false-pareille , de sassafras , dans laquelle on ajoutoit un noïet d'antimoine cru exactement phorphirisé ; il en buvoit d'une livre & demie jusqu'à deux livres dans l'espace de vingt-quatre heures. Le matin immédiatement avant le premier verre de cette décoction , il prenoit un gros d'opiate composé d'une once de conserve d'aunée , de trois gros de savon d'Alicante , de deux gros d'extrait de chamœpitis & deux scrupules d'aloës soccotrin , avec le sirop de marrube blanc ; la tisane ordinaire étoit une infusion de scolopendre.

On employoit extérieurement des remedes propres à l'état des ulceres & à la qualité du pus. Le malade guérit parfaitement par ces usages. On lui ouvrit un cautere à l'un des bras , dont il a entretenu exactement la suppuration : il jouit encore aujourd'hui d'une bonne santé.

La huitieme observation qui termine ce cha-

pitre , consiste en l'histoire d'une métastase qui degagea tout-à-coup la poitrine d'un jeune homme âgé de vingt - six ans , d'une douleur & d'un étouffement si violens , qu'on fut obligé de faire cinq saignées dans l'espace de vingt - quatre heures , qui ne l'avoient point soulagé. Cette métastase fut excitée par l'application d'un emplâtre vésicatoire sur la partie de la poitrine qui répondoit à la douleur. Quatre jours après l'application du vésicatoire, il se forma tout-à-coup un' abscess au bras droit , qu'on fut obligé d'ouvrir le lendemain ; il étoit si considérable qu'il rendit deux livres de pus. Cet abscess a été suivi d'un nombre d'autres qui se sont formés successivement aux bras & aux jambes. Ils ont tous suppuré ; il s'en forma de nouveaux , ils suppurerent également ; rien jusqu'aujourd'hui n'a pu en tarir la source ; il paroît qu'ils ont pris un caractère serophuleux.

On prévient les métastases qui se font de l'extérieur du corps vers l'intérieur , par des diversions qui rompent la tendance des humeurs vers les visceres. On donne à cet effet des émétiques s'il y a des envies de vomir ; on applique des vésicatoires sur les parties où étoient les ulceres & les tumeurs ; on entretient une espee de diarrhée par des laxatifs & des purgatifs réitérés ; on fait faire une ample boisson d'eaux minérales diurétiques , d'infusions diaphorétiques , & même de sudorifiques si les malades n'ont pas de fièvre inflammatoire : si enfin la Phthisie s'établit malgré tous ces secours , on la

440 TRAITÉ DE LA PHTHISIE
traite selon son caractère, selon ses symptômes &
selon leurs différences (a).

C H A P I T R E V I I I .

Méthode préservative & curative de la Pulmonie , occasionnée par la Métafaste des éruptions cutanées dans les poumons.

LES éruptions cutanées répercutées & portées par métafaste dans la substance pulmonaire, y font ordinairement des plaies mortelles, d'autant plus dangereuses que la matiere de ces éruptions est toujours étrangere & souvent contagieuse aux substances animales (b).

Ces éruptions sont critiques ou symptomatiques, dans le premier cas elles sont salutaires ; tant qu'elles restent à la peau elles dissipent la cause de la maladie & concourent à sa guérison ; dans le second elles dépendent de la maladie, elles en font un symptôme & tiennent à son caractère. Cette matiere ne peut être que très-dangereuse lorsqu'elle est répercutée, portée & fixée dans les viscères. Si elle est critique, elle est devenue étrangere aux substances animales dès qu'elle a été séparée de leur concours ; si elle est répercutée & portée par métafaste dans les poumons, elle ne peut que former dans ce viscere délicat, des engorgemens, des tubercules, des érosions, des ulceres, des suppurations. Si ces éruptions sont symptomatiques, elles rendent plus

(a) Seconde Partie, Section 2. Chap. 2.

(b) Première Partie, Sect. 5. Ch. 7.

dangereuse , étant répercutées , la maladie dont elles sont le symptôme , & si elles se fixent dans quelque viscere elles causent des accidens souvent plus graves que ne l'étoit la maladie principale : si c'est dans les poumons qu'elles sont répercutées , elles portent dans ce viscere des principes d'engorgemens , de phlogoses , d'inflammations , & principalement de Phthisies d'autant plus dangereuses , qu'elles sont souvent la suite de maladies redoutables par leur caractère.

J'ai distingué en général , dans la premiere partie de cet ouvrage , trois différentes especes d'éruptions cutanées ; les unes sont uniquement dépuratoires , elles ne s'élevent pas ordinairement au-dessus du niveau de la peau ; celles-ci ne sont accompagnées ni suivies de mouvement fébrile , elles ne sont incommodes qu'autant qu'elles causent des démangeaisons insupportables.

La seconde espece est caractérisée par des exentèmes fébriles , différens entre eux selon les causes , le caractère & la violence des maladies dont ils sont le symptôme.

La troisieme espece dépend d'humeurs âcres déterminées à la peau par la nature ; ces éruptions sont quelquefois critiques , mais plus généralement symptomatiques en ce qu'elles dépendent du caractère de la masse des liquides. De quelque espece , de quelque nature que soit la matiere qui forme ces éruptions , quelques différentes qu'elles soient entre elles , elles conservent toujours les qualités de leur

principe : ne feroit - on pas fondé à distinguer les Phthifies qui en proviennent , par les dénominations qui les caractérisent ?

La premiere espece de ces éruptions exige des fecours de l'art , propres à les favoriser , à les accroître , à les multiplier , pour en prévenir les métastases , & pour concourir à purifier la masse du sang , de ces humeurs qui lui sont étrangères , & qui , si elles étoient retenues dans ses vaisseaux , occasionneroient des maladies de différens genres , selon leur nature.

A cet effet , on se sert utilement d'infusions de plantes délayantes & diaphorétiques , dans le petit lait ou dans l'eau commune. On vit sobrement , on ne s'expose pas au mauvais tems , on évite scrupuleusement de se livrer aux passions de l'ame & à des excès de quelque nature qu'ils soient. On se dispose par ces infusions & par des lavemens émolliens , à des purgatifs que l'on prend quand ces éruptions sont dissipées , on les réitere selon les circonstances ; on fait usage de lait. Si malgré ces attentions on a le malheur d'éprouver des symptômes de pulmonie ; on a recours aux remedes indiqués par cette maladie , qu'on allie avec ceux qui sont les plus propres au caractère des éruptions , soit qu'il en existe encore ou qu'il n'en existe plus à la peau.

Les éruptions de la seconde espece ne sont jamais sans fièvre , elles en sont ou la cause ou les effets ; elles en sont la cause quand leur principe confondu dans la masse des liquides , en trouble l'ordre & le

concours. La fièvre alors se développe, divise les principes qui lui ont donné lieu, & les porte à la peau où se forment les taches pourprées, celles de la rougeole, les boutons de la petite vérole, les inflammations éréthellateuses, les abcès, &c.

Les éruptions inflammatoires à la peau, sont des effets de la fièvre, lorsque celle-ci lès a précédées; leur développement est l'effet de l'agitation des fibres membraneuses, du trouble des sécrétions, de la chaleur qui provient de ce désordre, de l'effervescence du sang, & en général de l'irrégularité du concours entre les liquides & les solides.

Lorsque ces éruptions surviennent dans les premiers jours de la maladie, elles sont symptomatiques; elles le sont également lorsqu'elles paroissent plus tard, sans que les symptômes diminuent. Si elles ne s'élèvent à la peau que vers le cinquième ou le septième jour, elles peuvent être critiques; si elles le sont, les malades sont sensiblement foulagés, s'ils ne le sont pas, on doit encore considérer ces éruptions comme symptomatiques. Si dans ces maladies la crise est parfaite, elles guérissent sans retour, si elle est imparfaite, elle laisse après elle des matières étrangères à la masse des liquides, qui souvent se portent par métastase dans les poumons & établissent dans ce viscère tous les symptômes de la Phthisie. C'est l'effet ordinaire de ces maladies, principalement de la petite vérole, de la rougeole, des éréthelles, &c. quand elles ne sont pas parfaitement jugées.

On prévient les Phthisies de ce caractère en traitant méthodiquement la maladie primitive, en ne contrariant pas la nature par des remèdes donnés mal à propos, en observant un régime de vie convenable à l'état dangereux où sont les malades, même dans leur convalescence lorsque la crise n'a pas été parfaite.

Lorsqu'on a lieu de présumer que les maladies éruptives inflammatoires n'ont pas été parfaitement jugées, on doit s'occuper scrupuleusement du soin de détourner des viscères les matières étrangères qui ont resté isolées dans la masse des liquides. On fait usage à cet effet de vésicatoires, de cautères, de setons, pour en déterminer l'excrétion vers la superficie du corps, par la pente que leur présente la suppuration de ces ulcères artificiels. On en seconde l'effet par des infusions ou des décoctions de plantes apéritives, diurétiques, diaphorétiques; on peut & l'on doit même faire usage de sudorifiques végétaux, si les malades sont d'un tempérament pituiteux & s'ils ont la fibre lâche, pourvu qu'ils n'aient pas été trop débilités par la maladie primitive. On a recours en même tems à des laxatifs par les garde-robes, dont on soutient l'effet par de légers purgatifs, par un régime de vie sobre, exact & soutenu, propre à la situation des malades dans leur fausse convalescence.

Si malgré ces secours il se déclare des signes avant-coureurs de Phthisie, on prend des indications des symptômes qui se présentent d'abord, pour

mettre en usage des secours propres à la prévenir & à y remédier si elle fait des progrès ; j'en ai indiqué les moyens en plusieurs endroits de cet ouvrage & principalement dans le Chapitre second de la seconde Section de cette Partie.

Les métastases des éruptions de la troisième espèce, telles que les croûtes laiteuses des enfans, les dartres, la galle, &c. se portent ordinairement dans les poumons, & occasionnent des Phthysies qu'on ne guérit qu'en remédiant à leurs causes éloignées, & en suppléant par des suppurations artificielles à la peau à celles qui en ont été répercutées. On allie ces secours avec ceux qui sont propres à la Phthysie, que l'on varie selon les différens symptômes : j'en donne des exemples dans les Chapitres suivans.

CHAPITRE IX.

Méthode préservative & curative de la Pulmonie, occasionnée par la Métastase des croûtes laiteuses des enfans dans la substance des poumons.

LES croûtes laiteuses des enfans sont salutaires lorsqu'on doit les considérer comme des dépurations de la masse des liquides ; elles sont dangereuses lorsqu'elles proviennent de quelque vice contracté par le pere, la mere, ou par quelque défaut du lait des nourrices (a). Le fœtus est nourri d'une substance laiteuse qui est fournie par le sang & par le suc nourricier de sa mere ; cette substance en fait le dé-

(a) Voy. première Partie, Sect. 5. Chap. 9.

veloppement & la croissance, il ne peut que participer à ses qualités. Il en est de même du lait des nourrices ; le sang des premières mères a ourdi dans leur sein les linéamens des corps de leurs enfans ; les secondes mères, en les allaitant, les forment pour en faire des hommes. C'est à cette substance alimentaire qu'ils doivent leur tempérament, la force ou la débilité de leurs organes ; dirai-je encore leurs vertus & leurs vices ? J'ai traité cette matière avec assez d'étendue, dans le livre sur la conservation des enfans.

Les croûtes laiteuses des enfans qui ne proviennent que de leur voracité & du défaut de l'ordre qu'on observe dans leurs repas, que l'on accumule, pour ainsi dire, les uns sur les autres, doivent être regardées comme salutaires ou dépuratoires, tandis qu'elles ne reconnoissent que cette seule cause. Si elles sont des suites ou des effets de vices communiqués par le père, la mère, ou par le lait des nourrices, elles sont pernicieuses lorsque l'humeur qui les forme est retenue en partie, ou répercutée dans les viscères ; si c'est dans les poumons, il en survient des Phthifies le plus souvent funestes.

Les croûtes laiteuses qui ne sont qu'un effet de la voracité des enfans à la mamelle, ou d'une nourriture trop forte quand on leur donne à manger, ne sont pas ordinairement dangereuses, & n'exigent presque pas de remèdes ; il ne faut pour les guérir que régler leur nourriture quant à sa qualité, & mettre de l'ordre dans leurs repas qui doivent être

assez éloignés les uns des autres pour que la digestion du premier soit faite quand ils prennent le second. Si ce régime est exactement observé, les digestions se rétablissent dans l'ordre naturel, les croûtes se dissipent d'elles-mêmes, & il ne s'en forme plus de nouvelles. Les croûtes de cette nature ne se répandent que sur la partie chevelue de la tête & sur le visage; elles ne sont ni épaisses, ni dégoûtantes à la vue, & les glandes voisines n'en sont point tuméfiées. Des croûtes de cette espèce exigent rarement des remèdes, cependant comme elles proviennent du dérangement des digestions, il est toujours à propos de faire usage d'une infusion de rhubarbe, & de donner de tems en tems quelque cuillerée de sirop de chicorée composé, ou de celui de fleurs de pêcher.

Si les croûtes sont occasionnées par le lait altéré à l'occasion d'un régime de vie de la nourrice, à la suite de quelque abus commis dans l'usage des fix choses non naturelles, on y remédie aisément en la faisant renoncer à ces abus, & par le moyen de quelque secours de l'art, employé selon les indications prises de la nature & des effets du dérangement: les croûtes laiteuses des enfans qui proviennent de cette cause, guérissent ensuite d'elles-mêmes, & n'exigent tout au plus que quelque léger purgatif.

Si les nourrices sont sujettes à de vives passions de l'ame, ou affectées de quelque vice chronique, tel que le scorbutique, le dartreux, l'érétypellateux, le scrophuleux; si les regles ou des fleurs blanches

leur surviennent abondamment pendant qu'elles nourrissent les enfans, les croûtes laiteuses se forment ou font des progrès, principalement dans le tems de la dentition. Les croûtes de cette espece sont plus générales, plus épaisses, plus dégoûtantes que celles qui prennent leur principe d'une nourriture trop forte ; d'ailleurs elles ont une odeur fétide & désagréable, les glandes du cou s'engorgent, se tuméfient, & souvent elles deviennent scrophuleuses. Si les croûtes laiteuses de cette nature proviennent de vices particuliers aux parens des enfans qui en sont affligés, elles sont plus ou moins graves selon le caractère de leurs causes.

Dès qu'on a lieu de présumer que les croûtes laiteuses de ce caractère tiennent leur principe des nourrices, on ne sauroit trop tôt les congédier pour en prendre de plus saines ; il seroit peut-être alors plus prudent d'achever leur nourriture avec du lait de vache ou de chevre, qu'avec celui de femme ; j'en ai indiqué les moyens dans le traité de la conservation des enfans. On doit leur donner ensuite les secours propres à les garantir des effets des vices qu'ils ont contractés, selon la nature de ces vices.

Les enfans dans ces malheureuses circonstances sont ordinairement sujets à des vomissemens fréquens ; on leur fait prendre de l'ipécacuanha, à petites doses ; un grain suffit à ceux qui n'ont qu'un an, deux grains à l'âge de deux ans ; on augmente la dose de ce remede d'un grain par chaque année. On en donne ensuite tous les matins un quart ou un tiers

tiers de grain, dans la vue de diviser, sans faire vomir, les matieres grasses & glaireuses qui existent dans les premieres voies & qui en troublent les fonctions. Si les matieres fécales sont vertes, on leur fait prendre, une ou deux fois par jour, de dix-huit grains jusqu'à quinze, selon leurs âges, de magnésie blanche. On leur donne ensuite tous les matins une cuillerée à bouche de sirop de Calabre; on le rend purgatif de tems en tems, & toutes les fois que les indications l'exigent: on peut substituer au sirop de Calabre purgatif, des infusions de rhu-barbe, de fleurs de pêcher, le sirop de chicorée ou celui de pommes composés.

La lepre, qui est la suite des croûtes laiteuses de mauvais caractère, provient ordinairement d'une plus grande âcreté de la partie muqueuse de la lympe; on se sert utilement lorsqu'elle a lieu & même lorsque les croûtes sont de mauvaise nature, de boissons émollientes, délayantes, adoucissantes & laxatives, qu'on rend de tems en tems purgatives. On emploie extérieurement des bains tiedes, & plus utilement encore des bains & des lotions d'eaux savonneuses, telles que celles de Bareges, de Saint-Sauveur, de Cauterets, de Bagnères, de Luchon; des décoctions de plantes, telles que la camomille, le mélilot, les fleurs de sureau, &c. On tient sur les croûtes pour les ramollir & pour qu'elles deviennent moins dures, des feuilles de poirée ou de laitue. Il est d'ailleurs très-utile de faire tous les jours sur la tête & sur le corps des frictions seches,

450 T R A I T É D E L A P H T H I S I E
& d'ouvrir un cautere à l'un des bras , sur-tout dès
qu'on s'apperçoit que les croûtes diminuent.

Si malgré ces secours il survient quelque signe
qui indique que l'humeur qui forme les croûtes à
la peau , se porte dans les poumons par métastase ,
on doit mettre tout en usage pour la rappeler à la
peau. On donne des vomitifs , des infusions , des
décoctions de plantes sudorifiques ; on applique à
la nuque , aux bras & même à la tête , des vésica-
toires , des cauteres ; on excite & on entretient une
diarrhée ménagée de façon que les malades n'en
soient point trop affoiblis. Si enfin malgré ces pré-
cautions il s'établit une pulmonie , on a recours pour
y remédier , aux moyens indiqués dans le premier
& le second Chapitres de la seconde Section de
cette Partie.

C H A P I T R E X.

*Méthode préservative & curative de la Phthisie pulmo-
naire , occasionnée par des dartres répercutées.*

I L n'est pas de Phthisie pulmonaire plus fréquente
& plus dangereuse que celle qui provient de dartres
répercutées ; les dartres même qui les occasionnent
sont d'autant plus difficiles à guérir qu'elles sont
de différens caractères , & qu'elles reconnoissent
différentes causes , que souvent il n'est pas aisé de
distinguer (a). Les dartres sont héréditaires, elles

(a) Voy. premiere Partie, Sect. 5. Chap. 10.

conservent long-tems cette dangereuse qualité ; j'ai été en occasion de les reconnoître telles à la quatrième génération. Elles dégénèrent avec le tems ; on doit les considérer alors , non pas comme provenant d'une humeur isolée dans les vaisseaux , si ce n'est d'un sang , qui , dans toute sa masse , est d'un caractère dartreux.

L'application des topiques astringens sur les éruptions dartreuses est toujours dangereuse & souvent mortelle. On en voit tous les jours des exemples frappans , je n'en ai rapporté que trois pour ne pas donner trop d'étendue à cet Ouvrage (c).

Les dartres qui ne sont pas fixées dans les viscères , sont susceptibles de guérison , sur-tout quand elles ne sont pas trop invétérées.

Lorsque les éruptions dartreuses proviennent d'une simple âcreté de la lymphe , on les guérit , à la faveur d'un régime de vie doux & humectant , par le moyen de boissons délayantes & diaphorétiques ; par un long usage de petit lait , dans lequel on fait infuser de la fumeterre , par le lait coupé avec une infusion de la même plante ; avec des bouillons de grenouilles , d'écrevisses , de racines de patience sauvage & de garance , &c. La racine de garance est essentielle pour la guérison des dartres de ce caractère. On donne de tems en tems des purgatifs dosés selon l'âge & le tempérament des malades. On soutient cette méthode curative par des bains domestiques , & principalement par des bains sa-

(c) Voy. *ibid.*

vonneux ou sulfureux, & par la boisson d'eaux minérales de cette qualité. Lorsque les dartres proviennent d'un principe vérolique, scorbutique, scrophuleux, érépellateux, &c. On fait le traitement qui convient dans ces maladies.

Si les dartres répercutées se fixent dans les poulmons, on applique des vésicatoires, on ouvre des cauterés & on entretient la suppuration; on a recours aux remèdes convenables à leur cause, & on emploie du commencement des infusions, des décoctions délayantes, diaphorétiques, sudorifiques auxquelles on ajoute de l'antimoine cru grossièrement pulvérisé.

Le jeune homme qui avoit les jambes défigurées par des dartres héréditaires (a), fut préservé par ces usages de la Phthisie pulmonaire dont il étoit menacé par des symptômes non équivoques; il guérit radicalement des boutons & des croûtes dartreuses, en les continuant pendant près de quinze mois, & en les réitérant ensuite de loin en loin. Dès que les symptômes de pulmonie furent dissipés, il prit tous les matins, jusqu'à sa guérison, de seize à vingt grains de pillules composées d'un gros de feuilles de genest en poudre, d'un demi-gros de soufre lavé, d'un scrupule de poudre d'écrevisse, de vingt grains d'aloës soccotrin, de vingt grains de diogrede, de douze gouttes d'huile de succin, d'antimoine cru exactement porphirisé & de cam-

(a) Voy. *Ibid.*

phre, de chaque quinze grains, avec suffisante quantité de sirop d'érysimum.

Il buvoit par-dessus quatre onces d'une légère décoction de racines de garance, adoucie avec la reglisse en infusion; il prenoit le soir, hors le tems de la digestion, une pareille dose de cette décoction.

La dame de la quatrième observation, insérée dans le même Chapitre que la précédente, souffroit depuis quelques années d'affections nerveuses, d'une toux & de coliques qu'on ne pouvoit attribuer qu'à la même cause. Ses extrémités étoient couvertes de boutons éréthellateux qui dégénéroient en dartres vives rongeantes, & qui formoient des ulcères profonds. On ne cessoit d'appliquer sur les boutons, sur les ulcères, des drogues astringentes; la suppuration diminua par ce moyen perfide, la toux devint humide, & la malade éprouva bientôt tous les symptômes qui annoncent une Phthisie pulmonaire.

Je fus consulté lorsque la malade fut réduite à cet état; je m'occupai d'abord du soin de rétablir la suppuration des ulcères qui avoient un caractère scorbutique; je fis ouvrir un cautère à l'un des bras, & je prescrivis un régime de vie & une méthode curative indiqués par les symptômes de la maladie. Quelque tems après la malade vint à Paris, elle se trouvoit déjà foulagée, mais elle ne guérit totalement qu'après s'être soumise à un régime de vie & à l'usage de remèdes propres à sa situation.

Dès son arrivée , elle commença de prendre des bains domestiques , elle buvoit en sortant du bain deux verres d'un apofeme laxatif qui la purgeoit suffisamment ; il ne fut pas nécessaire de le continuer au-delà de quatre jours. La malade ne prit ensuite les bains que de deux jours l'un ; en sortant du bain elle buvoit cinq onces de suc épuré de parties égales de chicorée sauvage , de creffon de fontaine , de bécabunga & d'oseille , édulcoré avec le sirop d'écorce d'orange. Les jours qu'elle ne se baignoit pas elle prenoit ce suc le matin à son réveil : le soir on lui donnoit aux heures du sommeil , douze gouttes de la liqueur minérale anodine d'Offman , & six gouttes de laudanum liquide de Sydenham dans deux onces d'infusion de pariétaire qu'on édulcoroit avec le sirop d'érysimum ; on entretenoit la liberté du ventre par le moyen de lavemens émolliens.

Ces remedes continués pendant un mois , dissipèrent totalement la toux & les coliques ; le pus prenoit de jour en jour une meilleure qualité , mais les ulceres ne guérissoient pas. Pendant le second mois , madame prit des bains d'eaux minérales sulfureuses , & elle en buvoit tous les matins , trois demi setiers , qu'on coupoit avec un demi setier de petit lait ; elle prenoit tous les soirs , pendant ces usages , de bols composés de quatre grains de baume dur du Pérou , d'autant de nitre purifié , d deux grains de camphre , & d'un quart de grain d'opium lavé , le tout incorporé avec la conserve de roses ;

elle buvoit par dessus , un tasse d'infusion de menthe de jardin , adoucie par le sucre rosat ; on plaçoit de tems en tems , des purgatifs très-doux , que l'on rapprochoit ou éloignoit , selon les indications. Après un long usage de ces remedes , que l'on varioit , modéroit & suspendoit , selon les circonstances , tous les symptômes de la maladie se dissipèrent , l'embonpoint & toutes les fonctions se rétablirent parfaitement. Cependant , dix-huit mois après une guérison qui paroissoit parfaite , il s'éleva à la peau des extrémités inférieures des éruptions qui paroissent prendre un caractère dartreux ; elles se dissipèrent bientôt sans retour , par l'usage de deux verres de biere chaque matin ; dans laquelle on faisoit infuser à froid , pendant vingt-quatre heures des racines de raifort sauvage , de bardane , d'iris de Florence , de feuilles de treffle d'eau , de cresson de fontaine , de fumeterre & d'alléluya.

C H A P I T R E X I.

Méthode préservative & curative de la Phthisie , occasionnée par la Métafase de la gale dans les poumons.

LA qualité de la gale , ses causes , sa contagion , ses effets , rendent cette maladie redoutable ; lorsque les pustules qui la manifestent sont répercutées dans les poumons , elle conduit rapidement à une Phthisie mortelle (a). On voit peu d'exemples de

(a) Voy. premiere Partie, Sect 5. Chap. II.

guérison de Phthifies pforiques confirmées ; on en trouve cependant dans les auteurs , & j'en ai vu moi-même , qu'on a obtenues dans les commencemens de cette maladie , lorsqu'on a eu le bonheur de prévenir le délabrement de ce viscere , & les suites de la contagion dans sa substance (a).

La gale provient d'une humeur très - mobile & très-aisée à répercuter ; si l'on avoit attention dans ses métastases de la rappeler à la peau , dès qu'on s'apperoit de quelque signe qui indique qu'elle menace les poumons , on préviendroit les effets de sa contagion , dans la substance de ce viscere.

La gale reconnoît plusieurs causes différentes ; tantôt , c'est la mal-propreté , tantôt l'acreté de la sérosité du sang , quelquefois la qualité de l'air , d'autres fois la contagion ; souvent elle est l'effet des abus & des excès que l'on commet dans le régime de vie. Il n'est pas rare qu'elle ne soit qu'un symptôme de vices particuliers de la masse des liquides , tels que le scorbutique , le scrophuleux , le vénérien , &c. chacune de ces causes exige une méthode curative particuliere. On doit donc considérer la gale comme une maladie essentielle , ou symptomatique ; lorsqu'elle est de ce dernier caractère , sa guérison dépend de celle de la maladie principale , dont elle n'est que le symptôme.

Lorsque la gale provient de la mal-propreté , d'une simple acreté de la sérosité du sang , de la contagion , d'abus & d'excès , commis dans le ré-

(a) *Ibid.*

gime de vie , elle doit être regardée comme essentielle ; cependant sa méthode curative exige toujours quelque attention particuliere , différenciée selon les causes de la maladie.

Les moyens les plus propres & les plus en usage pour rappeler la gale à la superficie , lorsqu'elle est répercutée , sont de coucher dans des lits dans lesquels des galeux ont couché , de porter des linges dont ils se sont servis , de recevoir les exhalaisons , de leur transpiration , de toucher leurs mains , ou de se tenir pendant quelque tems dans leur atmosphère. De tels moyens sont presque toujours efficaces pour prévenir les effets de la métastase de la gale dans les viscères , & principalement dans ceux de la poitrine.

On prévient aussi les effets de la métastase de l'humeur qui forme les pustules , psoriques par l'usage de boissons diaphorétiques & sudorifiques par la saignée , par des purgatifs souvent réitérés , & par des évacuations ménagées & soutenues dans leurs intervalles , par des vomitifs toujours nécessaires , si les malades ont des nausées , ou des envies de vomir , & par l'application des vésicatoires , dont on entretient la suppuration pendant tout le tems de la maladie. On guérit la gale par ces mêmes moyens , & l'on fait usage de bains domestiques , de bains de boissons d'eaux minérales sulfureuses , de frictions seches sur tout le corps , de petit lait de boissons diaphorétiques ameres , composées de l'infusion de plantes de cette classe ; de

décoctions de racines de patience sauvage, de bardanne, de pissenlit, dans lesquelles on met infuser la fumeterre; on ajoute à ces décoctions, de l'antimoine cru en poudre grossière, qu'on enferme dans un nouet de linge, on a recours ensuite au lait, que l'on coupe avec une infusion de plantes sudorifiques, telles que la véronique mâle, la mélisse, la scabieuse, &c. Le lait coupé avec une décoction de fausse-pareille, m'a souvent paru préférable à celui que l'on coupe avec ces infusions.

Lorsque la gale est un effet d'abus & d'excès commis dans l'usage des six choses non-naturelles, elle s'est établie insensiblement, & la masse du sang en a pris le caractère. La guérison des éruptions psoriques dépend alors du rétablissement de la masse des liquides dans l'état naturel. On remplit cet objet en renonçant à des abus excessifs, ou d'habitude, en observant un régime de vie doux & humectant, en faisant usage de bouillons de tortues, de grenouilles, ou de poulet avec des écrevisses; on y ajoute des feuilles de chicorée sauvage & du cresson de fontaine; on les passe par un filtre couvert d'une couche de cerfeuil. On fait usage de lait coupé avec l'infusion de quelques plantes choisies dans la classe des diaphorétiques. On a recours aux bains domestiques, aux sulfureux, & à la boisson d'eaux minérales favorieuses; le tout sans préjudice des purgations réitérées, & d'autres secours employés selon le caractère de la maladie. La pulmonie qui provient d'une gale répercutée, qui tient son principe

de vices particuliers , ne peut guérir qu'après avoir remédié , ou qu'en remédiant à ces vices , en même-tems qu'on fait usage des remedes qui lui sont propres , & qui sont indiqués par ses différens symptômes.

F I N.

A P P R O B A T I O N.

J'AI lu, par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un Manuscrit intitulé ! *Traité de la Phthisie pulmonaire, avec la Méthode de la guérir, fondée sur l'Observation* ; par M. RAULIN, Docteur en Médecine, Médecin du Roi. On reconnoît dans cet Ouvrage l'ordre, la méthode & la clarté familières aux productions de son Auteur ; il est de plus rempli d'Observations utiles, dont les unes sont tirées des Praticiens les plus célèbres, & les autres sont propres à M. RAULIN. A Paris, ce 25 Juin 1782. Signé, M I S S A.

PRIVILÈGE GÉNÉRAL DU ROI.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE : A nos aînés & féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra : SALUT. Notre bien aimé le Sieur RAULIN, Docteur en Médecine, & notre Médecin ordinaire, servant par quartier : Nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public, un Ouvrage de sa composition, intitulé : *Traité de la Phthisie pulmonaire, avec la Méthode de la guérir, fondée sur l'Observation*, s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilège à ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant, nous lui avons permis & permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre par tout notre Royaume. Voulons qu'il jouisse de l'effet du présent Privilège, pour lui & ses hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocède à personne ; & si cependant il jugeoit à propos d'en faire une cession, l'Acte qui la contiendra sera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilège que de la cession ; & alors par le fait seul de la cession enregistrée, la durée du présent Privilège sera réduit à celle de la vie de l'Exposant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, si l'Exposant décède avant l'expiration desdites dix années. Le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Conseil du trente Août 1777, portant Règlement sur la durée des Privilèges en Librairie. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres Personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre

obéissance : comme aussi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposé, ou de celui qui le représentera, à peine de saisie & de confiscation des Exemplaires contrefaits, de six mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée pour la première fois; de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Conseil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du présent Privilège : qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit ouvrage sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur HUE DE MIROMESNIL, Commandeur de nos Ordres; qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMESNIL : le tout à peine de nullité des Présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposé & ses hoirs pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ni empêchement. VOULONS que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour dûment signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amis & féaux Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le huitième jour d'Août l'an de grace mil sept cent quarante-deux & de notre règne le neuvième. Par le Roi en son conseil.

Signé, LE BEGUE.

Registré sur le Registre XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N^o. 2708, fol. 743, conformément aux dispositions énoncées dans le présent Privilège, & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires prescrits par l'article 108 du Règlement de 1723. A Paris, ce 13 Août 1782.

Signé, LE CLERC, Syndic.









